



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

The image shows the front cover of an old book. The main part of the cover is decorated with a marbled paper pattern, specifically a 'stone' or 'shell' pattern in shades of brown, tan, and cream. The pattern consists of irregular, rounded shapes with darker brown outlines. To the left of the marbled area is a vertical strip of plain, light brown material, likely leather or cloth, which forms the spine of the book. In the bottom left corner, there is a small, rectangular, off-white paper label with a scalloped edge. It contains two lines of handwritten text in black ink.

18953

E. 67/4



600037769

899 N. 6




E. BIBL. RADCL.

6
5
4
3
2
1

X St. E. B.

C
18953 e. 67/4





ORDO I.
MALACOPTERYGII.

SYNGNATHUS, G. Pisc. I.

I. **S**YNGNATHUS corpore quadrangulo, pinna cauda carent.
Art. spec. 3.

ἵπποκάμπος. Ælian. l. 14. c. 14.

Hippocampus. Bellon.

Rondel. insect. c. 9. p. 114.

Gesner p. 114, (Germ.) part. 16. fol. 156. a,

Charlet. insect. p. 59.

Willugh. p. 157.

Raj. p. 45.

Hippocampus aculeatus. Raj. p. 45.

Zidrach. Auct. de nat. rer. ut videtur.

Cubæ. l. 3. c. 103. f. 93 & 94. a. ut videtur.

Ital. Cavallo marino.

II. SYNGNATHUS corpore medio hexagono, cauda pinnata.

Art. spec. 3.

Acus secunda species, sine Acus Aristotelis. Rondel. l. 8. c. 4.
p. 229.

Gesner. pag. 9. 11.

Gesner. (Germ.) f. 49.

Acus Aristotelis. Aldrov. l. 1. c. 22. p. 105.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 17. punct. 1. p. 52.

t. 15. f. 14.

Acus Aristotelis, seu Acus secunda species. Rond. Willugh. p. 158.

Raj. p. 45.

Acus. Rob. pisc. p. 13.

? Altera species sine Acus Aristotelis, Blennius aliquibus dicta,
vulgo Nerophidion. Schonev. p. 11?

Typhle marina. Bellon.

Gesner. p. 11.

Arredi Synonymia.

A

? Spon-

2 *Malacopterygii.*

Syngnathus.

? *Sphondylus*. Plin. l. 32. c. 11?

Serpens marinus. Gill. nom. c. 65.

Piscis septimus. Salv. f. 68. b. vide iconem fol. 68. a. f. 7.

Gallis. *Trompette*.

Massiliensibus. *Gagnola*.

III. *SYNGNATHUS corpore medio heptagono, cauda pinnata.*

Art. spec. 2.

Aeus Aristotelis, species altera major. Willugh. p. 159.

Raj. p. 46.

Typhle. Gefner. (Lat.-Francof.) p. 1025.

Obs. a capite ad anum septangularis, inde ad caudam quadrangularis tantum.

IV. *SYNGNATHUS teres, pinnis pectoralibus caudaque carens.*

Art. spec. 1.

Aeui Aristotelis congener pisciculus, pueris Carnubiensibus Sea ad der, id est Vipera marina dictus. Willugh. p. 160.

Aeus lumbriciformis aut septimus. Willugh. p. 160.

Aeus lumbriciformis seu Opbidion lumbriciforme. Raj. p. 47.

Suecis. *Hav-nål*.

Obs. numerus incisurarum in syngnathi genere omnino observandus est.

COBITIS, G. Pisc. 26.

I. *COBITIS tota glabra maculosa, corpore subtereti.* Art.

Cobitis barbatula. Rondel. part. 2. p. 204.

Gefner. (Germ.) f. 163.

Aldrov. l. 5. c. 31. p. 618.

Jonston. l. 3. tit. 1 c. 12. art. 3. t. 26. f. 22.

Charlet. p. 157.

Cobitis altera barbatula. Gefner. p. 404. & 480.

Cobitis fluviatilis barbatula. Gefner. p. 404.

Cobitis fluviatilis. Schonev. p. 31.

Cobitis fluviatilis barbatula. Willugh. p. 265.

Raj. p. 124.

Fundulus seu Grundulus. Figul. f. 1. b.

Germanis *Grundel, Gründling, Smerle & Smerling*.

Anglis *The Loch or Groundling*.

Gallis *Loche franche*.

II. *COBITIS aculeo bifurco infra utrumque oculum.* Art. spec. 4.

Cobitis secunda. Rondel. part. 2. p. 204.

Cobitis aculeata. Rond. part. 2. p. 204.

Aldrov. l. 5. c. 30. p. 617.

Gesner. p. 404. & 482.

Charlët. p. 157.

Cobitis aculeata. Jonston. l. 3. tit. 1. c. 12. a. 2. t. 26. f. 21.

Cobitis aculeata Docoliribus. Gesner. (Germ.) f. 163. b.

Cobitis barbatula aculeata. Willugh. p. 265.

Raj. p. 124.

Tania cornuta. Schonev. p. 74. & icon. t. 4. f. 1.

Willugh. p. 266.

Raj. p. 124.

Jonston. t. 46. f. 1.

? *Steinbiza.* Hildegard. l. 4. part. 1. c. 22. p. 92?

Suecis ad lacum Melerum Tånglake.

Germanis *Steinbeisser*, *Schmeerputte* vel *Steinpicker*.

III. *COBITIS cerulefcens, lineis utrinque nigris longitudinalibus.*

Art.

Misgurn seu Fisgurn, Piscis Lampetiformis Norimbergæ & Ratisbonæ. Willugh. p. 118.

Raj. p. 70.

Ad hanc sequentia videntur pertinere synonyma.

Mustela fossilis. *Beifsker* vel *Beifecker.* Gesner. p. 373.

Mustela fossilis Gesneri, germanis *Peifsker* seu *Beifsker.*

Willugh. p. 124.

Raj. p. 69.

Mustela fossilis. Aldrov. l. 5. c. 7. p. 579.

Pisces fossiles. Jonston. l. 3. tit. 2. c. 7. t. 28. f. 8.

Pacilia Schonev. p. 56. forte?

CYPRINUS, G. Pisc. 3.

I. *CYPRINUS cirris quatuor, offcuto tertio pinnarum dorsi, ac ani uncinulis armato.* Art. spec. 25.

Κυπρίνος & Κυπρίανος. Aristot. l. 4. c. 8. & l. 6. c. 14. & l. 8. c. 20. & l. 2. c. 13.

Κυπρίανος. Athen. l. 7. dipnos. p. 309.

Oppian. l. 1. & 4.

4 *Malacopterygii.*

Cyprinus.

?Κυπρίνος μίλας. Ælian. l. 14. c. 23. & 26? vide Ælian. l. 13. c. 73.

Carpō. Heldegard. l. 4. p. 1. c. 11. p. 90.

Carpa, *Carpō* & *Corpio*. Figul. f. 4. a.

Carpera. Aëtor.

Cubia. f. 79. b. & c. 38. l. 3.

Carpanus. Platin. l. 10.

Raynā siue *Burburns*. Jov. c. 38. p. 129.

Cyprinus. Plin. l. 32. c. 11.

Wotton. l. 8. c. 190. f. 169. b.

Rondel. p. 2. c. 4. p. 150.

Salvian. f. 91. a. 92. 93.

Bellon.

Gesner. p. 309. & 164. E. G. Foreri.

Aldrov. l. 5. c. 40. p. 637.

Jonston. l. 3. tit. 3. c. 6. t. 29. f. 3. 4. 6. & Thaumatoz. p. 411.

Charlet. p. 162.

Willugh. p. 245.

Raj. p. 115.

— *nobilis*, *Cyprianus*, *Carpa*. Schonev. p. 32.

Carperen. Albert. l. 24.

Suecis & Germanis. *Karp*.

Anglis. *A Carp*.

Gallis *Carpe*.

Venetiiis *Rayna*. Padi accolis *Carpena*. sec. Jovium.

II. *CYPRINUS pinnis omnibus nigrescentibus, pinna ani officulorum viginti septem.* Art. spec. 22.

Bresna. Heldegard. l. 4. p. 1. c. 12. p. 90. ut videtur.

Prasemus. Figul. f. 5. a.

Abramis. Bellon. secundum Schoneveldum.

Abramus, *Cyprinus latus*. Charlet. p. 162.

Cyprinus latus siue *Brama*. Rond. p. 2. lacustr. c. 6. p. 154.

Gesner. p. 316. 317. & 165. b. E. G.

Willugh. p. 248. t. 2. 10. n. 4. opt.

Raj. p. 116.

Cyprinus latus vel Brama. Schonev. p. 33.

Cyprinus latus. Aldrov. l. 5. c. 42. 641. 642.

Jonston. l. 3. tit. 3. c. 8. p. 165. t. 29. f. 5.

Suecis. *Brax*.

Germanis. *Brassem* & *Prasem*.

Anglis. *A Breanu*.

III. *CYPRINUS iride, pinnis omnibus, caudaque rubris.* Art. spec. 9.

Rootang

Röotaug i. e. ῥοταύγιος Germanis dictus, Bramis affinis.
Willugh. p. 249.
Raj. p. 116.

Suecis *Sarrv.*

Obs. Icon hujus nulla extat.

IV. *CYPRINUS oblongus figura rutili, pinna ani ossiculorum decem.* Art. spec. 12.

Grislagine Augusta dictus Gobii fluviatilis species: Germani enim gobium Gresling vocant. Willugh. p. 263.

Grislagine Augusta dictus, Gobii fluviatilis species. Raj. p. 123.
Angermannis *Strämm?*

Suecis Smolandis *Ruda?* Silienfibis *Idbarn?*

V. *CYPRINUS pinna dorfi ossiculorum viginti, linea laterali recta.* Art. spec. 29.

? *Χαεαζ.* Aelian. l. 12. c. 25. } ex imperfectis descriptionibus
? Oppian. l. 1. halieut. } definiri non potest.

Charax Dubrav.

Bellon.

Gesner. p. 222. & 166. b. E. G.

Piscis simpliciter Karass dictus. Gesn. paralip. p. 16.

Carass tertium genus. Gesn. ibid. p. 17. (edit. Franc. 1604.)

Carassus simpliciter dictus siue Carassi tertium genus.

Gesner. paralip. p. 1275.

Willugh. p. 249.

Raj. p. 116.

Cyprinus latus alius Gorais Ratisbonæ. Willugh. p. 249.

Cyprinus latus alius. Aldrov. l. 5. c. 43. p. 644.

Jonst. l. 3. tit. 3. c. 9. p. 165. t. 27. f. 12.

Suecis *Ruda.*

Germanis *Karass* & *Karassche.*

VI. *CYPRINUS vrom-fisch dictus.*

Vrom-fisch Ratisbonæ dictus. Willugh. p. 253.

Raj. p. 118.

VII. *CYPRINUS mucosus totus nigrescens, extremitate caudæ equali.* Art. spec. 27.

? *Ψύλλων* Aristot. l. 6. c. 14.

? *Fullo.* Gaz. in Aristot. l. c.

Γναφεύς Durionis. Athen. l. 7. c. 297.

Teucha. Actor.

Cuba. l. 3. c. 91. f. 91. b.

Tinca, Aufon. v. 125.

Platin. l. 10.

6 *Malacopterygii.*

Cyprinus.

Jov. p. 124.

Figul. f. 3. b.

Watton. l. 8. c. 190. f. 169. b.

Rondel. part. 2. lacustr. c. 10. p. 157.

Salvian. f. 89. a. 90.

Gesner. p. 984. Germ. 167. b.

Aldrov. l. 5. c. 45. p. 646.

Jonston. l. 3. tit. 3. c. 10. p. 146. t. 29. f. 7.

Charlet. p. 162.

Willugh. p. 251.

Raj. p. 117.

Schonev. p. 76.

Phycis vel Merula fluviatilis. Schonev. p. 76.

Merula fluviatilis. Scalig.

Succis. Linnare, *Sutare* & *Skomakare.*

Danis *Sydere.*

Germanis *Schley* & *Schleyen*, Belgis & Saxonibus *Schomaker.*

Italics *Tenca.* Anglis *A Tench.*

Obf. Ad angulos oris utrinque appendicem brevissimum & rotundum jam adnotavit, *H. Salvianus* p. 90.

VIII. *CYPRINUS Orfus dictus.*

Capito fluviatilis subruber quem Germani Orfum appellant.

Gesner. paralip. p. 10.

Orfus. Gesner. (Germ.) f. 166. b. & 167. a.

Capito fluviatilis subruber. Orfus Germanorum. Aldrov. l. 5. c. 21. p. 605.

Orfus germanorum seu Capito ruber Gesneri Charlet. p. 156.

Orphus germanorum seu Capito subruber Gesneri. Jonston. l. 3. tit. 1. c. 6. a. 4. t. 2. f. 7. & t. 26. f. 9.

Rutilus latior vel Rubellio fluviatilis. Willugh. p. 252.

Raj. p. 118.

Rotele. Baltner. Mff.

Anglis *A Rudd*, quibusdam in locis *a Finscale.*

Germanis *Orff*, *Urff*, *Oerve*, *Nerfling*, *Wyrfling* & *Elft.* sec. Gesnerum.

IX. *CYPRINUS rostro nasiformi prominente, pinna ani officulorum quatuordecim. Art.*

Nasus. Albert.

Gesner. (Germ.) f. 170. b.

Aldrov. l. 5. c. 26. p. 611.

Nasus piscis fluviatilis. Gesner. (Latin.) p. 620.

Nasus, Naso. Schonev. p. 52.

Nasus Alberti Magni. Aldrov. l. 5. c. 26. p. 610.

Char-

Malacopterygii.

Cyprinus. 7

Charlet. p. 156.

Jonston. l. 3. tit. 1. c. 9. t. 26. f. 15.

Nasus Alverti. Willugh. p. 254.

Raj. p. 119.

Italis Savetta. Ferraricenfibus *Sueta.* Bellon.

Germanis *Nafe* & *Nafen.*

X. *CYPRINUS oblongus macrolepidotus, pinna ani officulorum undecim.* Art.

Squalus. Varro. rust. 3. c. 3.

Columell. l. 8. c. 16.

Salvian. f. 84. a. b.

Squalus Plinii Valeriani medici de re medica. l. 5. c. 43.

Capito. Aufon. v. 85.

Figul. f. 1. b.

Wotton. l. 8. c. 190. f. 169. b.

Cephalus fluviatilis Rondel. part 2. fluviat. c. 15. p. 190.

Capito seu Cephalus fluviatilis. Gefner. p. 182.

Capito, Cephalus, Squalus. Gefn. (Germ.) 169. a.

Capito Aufonii, Squalus veterum. Aldrov. l. 5. c. 17. p. 600.

Jonston l. 3. tit. 1. c. 6. a. 1.

Capito fluviatilis simpliciter dictus. Gefner. Patalip. (Lat.

Franc.) p. 8.

Aldrov. p. 601.

Capito fluviatilis. Charlet. p. 156.

Capito siue Cephalus. Willugh. p. 255.

Raj. p. 119.

Dobula Balsaharis Trochi. Gefn. paralip. p. 8.

Romanis *Squoglio.*

Anglis *A Chab* or *Chevin.*

Gallis *Munier, Vilain,* & interdum ut Lutetiz *Teflard.* sec. Rondelet.

Germanis *Alet* & *Alat.* secundum Gefnerum.

Ein Keuling ex sententia Car. Figuli.

Misenis *Elte, Alte.* Diebel Kentmanni.

Coloniensibus *Munne* vid Gefn. paralip.

Obf. *Salvianus* hunc cum *Alburno Aufonii* specie convenire erronee existimat; hunc & esse *Leuciscum Galeni* putat.

XI. *CYPRINUS cubitalis, pinna ani officulorum quatuordecim.* Art.

Capito fluviatilis ille, quem Iesen appellant Germani quidam: nos differentia causa cœruleum cognominemus licet. Gefn, paralip. p. 9. Ed. Franc. 1604.

Capito fluviatilis cœruleus. Gefner. (Germ.) p. 169. a.

Gefneri, Aldrov. l. 5. c. 19. p. 603.

Capito

Capito cæruleus Gefneri. Willugh. p. 256.

Raj. p. 120.

Germanis quibusdam *Scheert* & *Koppen* secundum Willoughby.

Saxonibus & Misenis *Jesen*, Dantiscanis *Jesus*; aliis *Jese*. Gefn.

Viennæ *Jentling*; ad Viadrum *Jesitz*.

XII. *CYPRINUS magnus crassus argenteus: longitudine ad latitudinem quintupla.* Art.

Capito fluviatilis, quem Corvum Miseni nominant, ein Rappen, nos Rapacem cognominabimus. Gefner. paral. p. 9. Ed. Franc. & 1267.

Capito fluviatilis rapax. Gefn. f. 169. b. & (Germ.) 170.

Gefn. Aldrov. l. 5. c. 20. p. 604.

Jonston. l. 3. tit. 1. c. 6. a. 3.
t. 26. f. 8.

Willugh. p. 256.

Raj. p. 120.

Rapax. Schonev. p. 30.

Capito & *Cephalus fluviatilis.* Schonev. p. 30.

Germanis *Rappe*, *Rape*, *Raubalet*.

Obs. Vide Iconem in Paralip. Gefneri. p. 9.

XIII. *CYPRINUS Capito anadromus dictus.*

Capito anadromus ille, quem Miseni Zerte vel Blicke nominant. Gefner. p. 11. & 1269.

Capito anadromus. Gefner. (Germ.) f. 180.

Gefneri Aldrov. l. 4 c. 7. p. 513.

Jonston. l. 2. tit. 1. c. 5. t. 23. f. 6.

Charlet. p. 151.

Capito anadromus, quem Miseni Zerte vel Blicke nominant. Gefneri. Willugh. p. 257.

Raj. p. 120.

OBS. Icon. vid. in Gefneri paralip. p. 11.

Forte idem cum Naso superius §. 9. descripto ex sententia Willoughby.

XIV. *CYPRINUS oblongus, maxilla superiore longiore, cirris quatuor, pinna ani ossiculorum septem.* Art.

Barbulus Platin. l. 10.

Barbus. Auson. v. 94.

Figul. f. 2. a.

Wotton. l. 8. c. 190. f. 169. b.

Rondel. part. 2. p. 194.

Salvian.

- Salvian. f. 85. b. 86.
 Gefner p. 123.
 Aldrov. l. 5. c. 16. p. 598.
 Jonston. l. 3. tit. 1. c. 5. t. 86. f. 6. & Thaum.
 p. 411.
 Charlet. p. 156.
 Willugh. p. 259.
 Raj. p. 121.
Barbus, *Barbo*, *Barbulus*. Gefn. (Germ.) f. 171.
Barbus, *Barbo*, *Barbatulus*, *Mugil barbatus*, *Mullus fluviatilis*
nonnullis. Schonev. p. 29.
Mustus fluviatilis. Bellon.
 Germanis *Barbe* & *Barble*.
 Anglis *A Barbell*.
 Gallis *Barbeau*, *Barblau*, *Barbel* & *Barbiau*.
 Italis sec. Salvianum & Schonev. *Barbio* & *Barbo*.

XV. *CYPRINUS Sargus dictus.*

- Gardus*. Aëtior.
 Cub. l. 3. c. 39. f. 85. a.
Sargus & *Sargo* & *Cephalus* & *Cardo*. Bellon.
 Gefner. p. 26.
Leuciscus. Rondel. part. 2. fluviat. c. 16. p. 191.
 Aldrov. l. 5. c. 23. p. 609.
 Gefner. p. 25.
Leuciscus primus Rondeletii. Jonston. l. 3. tit. 1. c. 8. t. 26.
 f. 11.
Leucisci seu Mugilis fluviatilis species prima. Gefn. (Germ.)
 f. 61.
Vn Schwal. Gefner paralip. p. 33.
Leuciscus prior Rondeletii, qui a Gallis Gardon vocatur.
 Willugh. p. 260.
 Raj. p. 121.
 ? *Leuciscus seu Alburnus, Mugilis fluviatilis prima species.*
 Schonev. p. 42.
 Germanis *Schwal*, *Furn*, *Rotang*. Alandt.
 Gallis *Gardon*.
 Italis *Lascha*.

XVI. *CYPRINUS novem digitorum, rutilo longior & angustior, pinna ani radiorum decem.* Art.

- Leuciscus*. Bellon.
 Charlet. p. 156.
 Jonst. l. 3. tit. 1. c. 7. & t. 26. f. 12.
 Willugh. p. 260.
 Raj. p. 121.

Artedi Synonymia.

B

Leu.

Leucisci secunda species. Rondel. part. 2. fluviat. c. 17. p. 192.
Gefner. (Germ.) f. 162.

Leucisci fluviatilis secunda species. Gefner (Lat.) p. 26.

Leuciscus Bellonii, qui Albicilla vel Albiculu latine dici potest.
Gefner. (Lat.) p. 27.

Leuciscus secundus Rondeletii. Aldrov. l. 5. c. 22. p. 607.

Germanis *Lauck, Laengele, Digunen &c.*

Anglis à Duce vr Dare.

Gallis *Vandoise, Dard & Suisse.*

OBS. Icon videatur in Gefneri paralip. p. 37.

XVII. CYPRINUS *pedalis gracilis oblongus crassiusculus, dorso crasso, pinna ani officulorum novem.* Art.

Mugilis vel Cephalis fluviatilis genus minus. Gefn. (Lat.) p. 28.

Capito vel Squalus fluviatilis minor. Gefner. (Germ.) f. 170. a.

Capito fluviatilis siue Squalus minor. Aldrov. l. 5. c. 18. p. 603.

Jonston. l. 3. tit. 1. c. 6. a. 2.

Capito minor. Schonev. p. 30.

Mugilis vel Cephalis fluviatilis species minor. Willugh. p. 261.
Raj. p. 122.

Tigurinis *Hassle, Hasler, Hasela*; aliis *Hessling. Vysfisch.*
Argentinenfibus *Schnot & Schnotfisch; Meisfisch.*

XVIII. CYPRINUS *iride pinnis ventralibus ac ani plerumque rubentibus.* Art. spec. 10.

Rubiculus Figul. f. 5. a.

Vne *Rosse.* Bellon.

? *Phoxinus* Rose. Rondel. part. 2. p. 205?

Rutilus siue Rubellus fluviatilis. Gefn. p. 820. 821.

Willugh. p. 262.

Raj. p. 122.

Rutilus seu Rubellus fluviatilis Charlet. p. 158.

Rutilus siue Rubellus. Gefn. (Germ.) f. 167. a.

Rutilus Gefneri. Aldrov. l. 5. c. 32. p. 621.

Rutilus fluviatilis Gefneri. Jonston. l. 3. tit. 1. c. 14. p. 130. t. 26.

Rutilus, Rubellio & Rubiculus. Schonev. p. 63.

Succis *Mörs.* Danis *Rudschallig.*

Germanis *Roräng, Roroge & Rorel.*

Anglis *A Roche.*

XIX. CYPRINUS *quincuncialis, pinna anni officulorum viginti.*
Art. spec. 17,

Albur.

Malacopterygii.

Cyprinus. II

Alburnus Aufon. v. 126.

Figul. f. 3. b.

Wotton. l. 8. c. 190. f. 169. b.

Rondel. part. 2. p. 208.

Aufonii Gefner. p. 23. & (Germ.) f. 159. a.

Aldrov. l. 5. c. 37. p. 628. & 629.

Jonston. l. 3. tit. 3. c. 4. p. 146. t. 29. f. 13.

Merrett.

Charlet. p. 161.

Willugh. p. 263.

Raj p. 123.

Ablet. Bellon.

Albula minor. Schonev. p. 11.

Albula. Jonston. Ich. t. 46. f. 2.

Suecis *Löja* & *Benlöja*. Danis *Lüyer*.

Anglis *A Bleak*. Gallis *Ablette*.

Germanis *Weisfisch*, *Zumbelfischlein* & *Bliegg*.

Francofurt. *Alblen*. Hamburgens. & Slesvicensibus *Witinek*,
Witeke & *Blicke*.

XX. CYPRINUS quincuncialis maculosus, maxilla superiore longiore, cirris duobus ad os. Art. spec. 13.

Gobio. Aufon. v. 132.

Aët.

Cub. l. 3. c. 40. f. 80. a.

Gobius Figul. f. 4. a.

Fluviatilis Gobio. Salvian. f. 214. a.

Gobio fluviatilis. Rond. part. 2. p. 206.

Gefner. p. 399. ed. Fr. & 474. & f. 159.
E. G.

Gobio fluviatilis, *Fundulus*. Charlet. p. 157.

Gobius fluviatilis. Aldrov. l. 5. c. 27. p. 612.

Gefneri. Willugh. p. 264.

Raj. p. 123.

Gobius non capitatus. Jonston. l. 3. tit. 1. c. 10. a. 1. t. 26.
f. 16.

Gobio non capitatus. Charlet. p. 157.

Fundulus. Schonev. p. 35.

Danis *Grämpel* & *Sandbest*.

Germanis *Gressling*, *Gründling*, *Gründele* & ein *Göbe*.

Anglis *A Gudgeon*.

Gallis *Gonion* & *Vairon*. Lugdunensibus *Goifon*.

XXI. CYPRINUS quadriuncialis, maxilla superiore productiore, ano medio inter pinnas ventrales & ani. Art.

Gobius fluviatilis minor, germanice *Wapper*. Willugh. p. 264.

Raj. p. 123.

XXII. *CYPRINUS quadriuncialis, iride crocea, macula atra ad initium caudæ.* Art.*Phoxinus squamosus major.* Gefner. p. 158. b.*Bambele Tigurinorum.* Gefner. paral. p. 8.

Willugh. p. 267.

Raj. p. 125.

Phoxinus squamosus. Jonston. l. 3. tit. 1. c. 13.XXIII. *CYPRINUS tridactylus varius oblongus teretiusculus, pinna ani officulorum octo.* Art.

Ὁ Φοξινός. Aristot. l. 6. c. 13. & 14?

Phoxinus. Wotton. l. 8. c. 190. f. 169. b.

Gaz.

Bellon.

Aldrov. l. 5. c. 10. p. 582.

Phoxinus qui vulgo Veronus (quasi varius) dicitur, Bellonii.

Gefner. p. 715.

Phoxinus lavis seu varius. Charlet. p. 160.*Phoxinus lavis.* Schonev. p. 57?*Varius seu Phoxinus lavis.* Aldrov. l. 5. c. 10. p. 582.

Jonston. l. 3. tit. 2. c. 8. t. 28.

f. 1. 3.

Willugh. p. 268.

Raj. p. 125.

Pisciculus varius. Rondel. part. 2. fluvi. c. 29. p. 205.(ex *Phoxinorum* genere); Gefner. p. 715.

& 843. (Germ.) p. 158. b.

Germanis *Elritz, Elderitze.*Anglis *A. Pink* or *Minim*, or *Minow.*Gallis *Veron.*Ital. & Insulribus *Sanguinerola.* Romanis *Morelle.*XXIV. *CYPRINUS admodum latus & tenuis, pinna ani officulorum quadraginta.* Art. spec. 23.

Ὁ Βάλερος. Aristot. l. 8. c. 20?

Ballerus. Rondel. part. 2. lacust. c. 8. p. 154.

Schonev. p. 28.

Aldrov. l. 5. c. 44. p. 645.

Jonston. l. 3. tit. 3. c. 9. p. 165. t. 27. f. 7.

Raj. p. 117. n. 8.

Pallerus Aristotelis. Charlet. p. 162.*Piscis Blicca germanorum, qui Alburnus lacustris dici potest.*

Gefner. p. 24.

Blicca, Ballerus, Plesya. Gefner. (Germ.) p. 167.*Plesya.* Bellon.

Gefner. (Lat.) p. 25.

Succis. *Blicca*, *Braxenpanka*, *Braxnaſlicka*.
Germanis *Höuerke* ſec. Schonev. aliis *Blick*.
Gallis *Bordeliere*.

XXV. CYPRINUS *Piclo Pigo & Pigus dictus.*

Picbo & Pigo Salvian. f. 82. a. icon. 17.

Pigus. Salvian. f. 83.

- OBS. 1. Cauda bifurca. Squamæ magnæ, e quarum medio albi & pyramidati aculei, in fine veris & ineunte æſtatis, enaſcuntur, quos 40 circiter dies habet, reliquo anni tempore abſunt.
2. Venter ex albo languide rubet, dorſum ex cæruleo nigricat. Pondus maximus 5 ad 6 librarum.
3. Parit menſe majo ad littora; caro ſapidiffima.
4. Locus Larius & Verbanus lacus.

XXVI. CYPRINUS *Albo italis dictus.*

Albus piſcis. Salvian. f. 88.

Alburnus. Salvian. f. 78. b. ad icon. 20. incuria calcogr.

Italis Albo quibusdam.

- OBS. 1. Vide Gillium de nomin. piſc. c. 69.
2. Latitudinis ratione Squalo paulo longior eſt.
3. Roſtrum acutius, oculi majores, & dorſum magis repandum quam in Squalo, nam dorſum Albi capite repente multo magis extuberat, quam in Squalo.
4. Pinnæ ſubnigræ (dum contra ſubrubræ in Squalo).
5. Squamæ ampliores in Albo, quam in Squalo.
6. Magnitudo pedalis, raro bipedalis, perinde ac in Squalo.
7. Caro admodum vilis & inſipida.
8. Locus: Lacus Tryſamenus.
9. *Alburnus Auſonii* non eſt. *Salvianus*.

XXVII. CYPRINUS *quincuncialis, pinna ani offcutorum viginti quinque.* Art. ſpec. 20.

Succis *Biörka*, *Biörkna*, *Biörkfisk*.

Reperitur in lacu Melerø & in Uplandia Succiz.

XXVIII. CYPRINUS *iride ſlava, pinna ani offcutorum viginti ſeptem.* Art. ſpec. 23.

Succis *Furen*.

Reperitur ad lacum Melerum, præſertim ad pontem öre-fundsbro.

XXIX. CYPRINUS *biuncialis, iridibus rubris, pinna ani offcutorum novem.* Art. ſpec. 30.

B 3

? *Aphyæ*.

14 *Malacopterygii.*

Cyprinus.

? *Aphyia*. Schonev.

Succis Mudd, Budd, Skittspigg.

Reperitur ubique per Sueciam in rivulis.

XXX. *CYPRINUS iride sublutea, pinnis ventralibus anique rubris.*

Art. spec. 6.

Succis *Id.*

Reperitur sat frequens in Suecia; piscis laudatissimus.

XXXI. *CYPRINUS maxilla inferiore longiore, cum apice elevato, pinna ani officulorum quindecim.* Art. spec. 14.

Succis *Asp.*

Reperitur juxta Upsaliam, inter omnes sui generis facile primus.

XXXII. *CYPRINUS rostro nasiformi, dorso acuminato, pinna ani officulorum viginti quatuor.* Art. spec. 18.

Succis *Wimba.*

XXXIII. *CYPRINUS triuncialis, corpore lato orbiculari, squamis magnis.* Art.

Bubulca Bellonii. Gesner. (Franc. lat.) p. 23.

Willugh. p. 267.

Raj. p. 125.

CLUPEA, G. Pisc. 4.

I. *CLUPEA maxilla inferiore longiore, maculis nigris carens.*
Art. spec. 31.

α. *Χαλκίς*. Aristot. l. 4. c. 9. & l. 6. c. 14. & l. 8. c. 20.
& l. 9. c. 37.

Ælian. l. 10. c. 11. p. 582.

Athen. l. 7. p. 328.

Oppian. hal. l. 1. p. 10.

? *Chalcis*. Plin. l. 32. c. 11?

Wotton. l. 8. c. 183. fol. 162. b.

Chalcidis species Bellon.

Erica vel Ærica. Gaz. Arist. l. c.

Allec. Hildegard. l. 4. part. 1. c. 20. p. 91.

Halec. Isidor. orig. l. 12. c. 6.

Albert.

Auctor.

Astor.

Astor.

Cub. l. 3. c. 42. fol. 80. b.

Charlet. p. 122.

Aringa cinbricorum litorum. Jov. p. 143.

Harengus, Rondel. l. 7. c. 15. p. 222.

Gefner. (Francf.) p. 408. & 486. & (Germ.) f. 5.

Schonev. p. 36. 37.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 1. a. 3. t. 1. f. 6.

——— thaumat. p. 416.

Willugh. p. 219.

Raj. p. 103.

Harengus flandricus, Aldrov. l. 3. c. 10. p. 294.

Suecis *Sill*.

Germanis *Hering* & *Häring*.

Anglis *A Herring*.

β. Ἡ ἀρεῖα. Aristot. l. 6. c. 15.

Chalcis i. e. Celerinus gallorum, Bellon.

Membras, Rondel. l. 7. c. 13. p. 220.

Aldrov. l. 2. c. 31. p. 212.

Gefner. p. 74. & 85. & (Germ.) fol. 2. b.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 17. t. 19. f. 14.

Charlet. p. 143.

Strömlingus, Roberg. pisc. p. 4. 18. & 25.

Strömingus, Reberg. gräf. p. 9. 12. & 14.

Suecis *Strömming*.

OBS. β. eadem est species cum α, & nil nisi magnitudine differunt, qua β. minor existit.

II. *CLUPEA apice maxillæ superioris bifido, maculis nigris utrinque.* Art. spec. 34.

α. Ἡ Θερσα. Aristot. l. 9. c. 32.

Ælian. l. 6. c. 32. p. 357.

Athen. l. 4. p. 131. & l. 7. p. 328.

Oppian. hal. l. 1. p. 10.

Strab.

Triffa, Wotton. l. 8. c. 183. fol. 162. a.

Rondel. l. 7. c. 14. p. 220.

Aldrov. l. 4. c. 4. p. 500.

Trichis, gallis *Pulchella*, *Alausa minor*, Bellon.

Gefn. (Francf.) p. 20.

Alosa, Gaz. arist. l. c.

Salvian. f. 104.

Jonston. l. 2. tit. 1. c. 3. t. 27. f. 3. 4.

Alosa major, Charlet p. 150. 151.

Alosa

- Alofa fluviatilis seu Clupea.* Charlet. p. 160.
Alofa vel Alaufa aut Triffa. Schonev. p. 13. 14.
Alaufa, Clupea vel Triffa piscis. Gefn. p. 19. 21.
Alaufa, Clupea vel Triffa. Gefner. (Germ.) 179.
Alaufa. Aulon. v. 127.
 Figul. (corol.) fol. 5. a.
Clupea. Plin. l. 9. c. 15.
 Salvian. f. 103. b. ad iconem.
 Willugh. p. 227.
 Raj. p. 105.
Clupea tyberina. Aldrov. l. 4. c. 4. p. 501.
Clupea. Jofton. Thaum. p. 411.
Aristorus. Albert.
 Murmelli.
Laccia. Jov. paul. p. 79.
Verith alius Verich. Ifidor.
 Cub. l. 3. c. 99. fol. 93. a.
Venetis & Etruscis Clupea. Romanis, *Laccia.*
 Gallis & Campanis *Alofe.*
 Hispanis *Saccolos.*
 Anglis *A Shad, The Mother of the Herrings.*
 Germanis *Bafilix & Colonix Alfen,* aliis *Meyfifch.*
 β . *Agone.* Salvian. fol. 105. b.
Acone Salvian. f. 106.
 Jov. (Bened.)
 Jov. (Paul.) c. 17.
 γ . *Sarachus, Sarachinus.* Charlet. p. 165.
 δ . *Alofa minor.* Charlet. onom. p. 151. lin. 2.
Harengus minor sue Pilchardus. Willugh. p. 223.
 Raj. p. 104.
 Anglis *The Pilchard.*
 ϵ . *Sardina.* Columell. l. 8. c. 17.
 Rondel. l. 7. c. 12. p. 217. 218.
 Gefner. p. 822. pro 842. & 890. & (Germ.) 2. b. 3. a.
 Willugh. p. 224.
 Raj. p. 104.
Sarda vel Sardinia. Schonev. p. 66.
Sarda seu Sardinia. Jofton. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 20. t. 20. f. 3.
Sarda flandrica minor. Aldrov. l. 2. c. 38. p. 221.
 Anglis *A Small Pilchard.*
 OBS. *Agonus & Sarachinus* authorum (γ) videntur tantum
 esse *Clupeæ* nondum adultæ, ergo synonyma supersedeo.
Piscis (δ) huc forte pertinet.
 At *Agonus* (β) prædictus & reliquorum recentiorum ad hanc
 speciem omnino pertinere videtur.

Malacopterygi.

Clupea. 17

Et (♂) videtur tantum magnitudine a Pilchardo (♂) differre.

III. *CLUPEA maxilla superiore longiore.*

Ὁ Ἐγκραυλος. Aristot. l. 6. c. 15.

Athen. l. 4. p. 148. l. 7. p. 285. 300.

Ἐγγράυλεις vel Ἐγκραβιχόλοι. Ælian. l. 8. c. 18. p. 497.

Λυκόσομοι. Ælian. l. 8. c. 18. p. 497.

Halecula. Bellon.

Engraulis. Wotton. l. 3. c. 182. fol. 161. b.

Encrasicboli. Rondel. l. 7. c. 4. p. 211.

Encrasicboli, quos alii *Engraulis* alii *Lycostomas* appellant, Gefn.
(Francof.) p. 68. & 78.

Encrasicbolus Gefner. (Germ.) fol. 1. b.

Aldrov. l. 2. c. 33. p. 214.

Jonston l. 1. tit. 3. c. 1. a. 18. t. 19. f. 13.

Charlet. p. 144.

Willugh. p. 225.

Raj. p. 107.

Anglis, Gallis, Suecis &c. *Anchovies.*

IV. *CLUPEA quadriuncialis, maxilla inferiore longiore, ventre acutissimo.* Art. spec. 33.

Spratti. Raj. syn. 105.

Suecis *Hwasshuk.*

ARGENTINA, G. Pisc. 5.

I. *ARGENTINA.* Art.

Sphyræna parva, siue Sphyræna secunda species. Rondel. l. 8. c. 2.
p. 227.

Gefn. p. 883. &
1261.

Sphyræna parva, seu secunda species. Gefner. (Germ.) fol. 39. a.

Pisciculus romæ Argentina dictus, Sphyræna parva siue Sphyræna secunda species. Rond. Willugh. p. 229.

Pisciculus romæ Argentina dictus. Raj. p. 108.

Gallis *Hautin.* Bellon.

EXOCOETUS, G. Pisc. 6.

I. *EXOCOETUS* Art. spec. 35.

α. Ἀδωνίς καὶ Ἐξώκοιτος. Ælian. l. 9. c. 36. p. 544.
Oppian. l. 1. p. 7.

Ἐξώκοιτος. Athen. l. 1. p. 325.

Exocætus, aliquibus Adonis. Plin. l. 9. c. 19.

Exocætus seu Adonis. Jonston. l. 1. tit. 1. c. 1. a. 12. t. 15.
n. 8.

Exocætus sine Adonis Rondeletii. Willugh. p. 135.

Raj. p. 13.

Exocætus Rondel. l. 6. c. 15. p. 193.

Charlet. on. p. 135.

? *Exochinus.* Cub. l. 3. c. 27. fol. 77. a. ex Alberto.

Adonis seu Exocætus. Gefner. p. 13. 15. & (Germ.) fol. 14.

Adones, sine Exocætus. Rondel. Aldrov. l. . c. 16. p. 77.

β. Mugil alatus. Rondel. l. 9. c. 6. p. 267.

Gefner. p. 553. & (Germ.) fol. 37. a. b.]

Willugh. p. 233.

Hirundo. Salvian. fol. 185. 186.

Plinii l. 9. c. 26. 51. & l. 32. c. 11?

Hirundo Plinii. Aldrov. l. 2. c. 6. p. 144.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 3. t. 18. f. 5.

Charlet. p. 139.

Anglis Flying fish.

Italics Pesce Rondine.

Obi, Hunc Piscem *Χελιδων* veterum esse contendit Salvianus.

COREGONUS, G. Pisc. 7.

I. *COREGONUS edentulus, maxilla inferiore longiore.* Art.
spec. 40.

Allula minima. Gefner. p. 34. & (Germ.) fol. 188. b. 189. a.

Aldrov. l. 5. c. 54. p. 660.

Jonston. l. 3. tit. 4. c. 5. p. 173. t. 30.
f. 7.

Charlet. p. 164.

Willugh. p. 186.

Raj. p. 61.

Succis Sik-läja, Stint. Silienſibus *Blifſa*. Fennon. Moiku, Räpis.

II. *COREGONUS* *maxilla superiore longiore plana, pinna dorsi*
officulorum quatuordecim. Art. spec. 37.

α. *Lavaretus*, Bellon.

Gefner. (Francf.) p. 30.

Rondelet. part. 2. p. 162.

Gefner. (Germ.) fol. 187. a.

Lavaretus allobrogum. Aldrov. l. 5. c. 51. p. 657.

Jonſton. l. 3. tit. 4. c. 4. p. 171. t. 30. f. 4.

Charlet. p. 163.

Willugh. p. 183.

Raj. p. 61.

Lavaretus piscis lacustris apud allobroges. Gefner. p. 29.

Germanis *Gangfiſch*, ad locum Ammersee in Bavaria *Rhingau*.

Cumberlandis *Sebetley*. Raj.

Allobrogibus *d Lavaret*.

β. *Albula nobilis* Gefner. p. 33.

Schonev. p. 12.

Jonſton. t. 46. f. 1.

Raj. p. 60.

Albula major & nobilis. Schonev. p. 12.

Albula nobilis vel lautus. Schonev. p. 12.

Abbula. Roberg piſc. p. 23.

Sicus. Roberg. piſc. p. 24.

Succis Sik. Danis *Snehbel & Helte*.

Conſtantiae *Adelfiſch* oder ein *weiſſer Blawling*.

Tigurinis *Wyſſfiſch*, ad Albem *Snepel*.

γ. *Piscis lemani lacus Bezola vulgo nuncupatus*. Rondel. part. 2.

p. 163.

Gefn. p. 31.

Bezola ex Gefnero. Aldrov. l. 5. c. 52. p. 658.

Bezola. Jonſton. l. 3. tit. 4. c. 4. p. 171.

Charlet. 164.

Albula caerulea, *Bezola*. Gefner. (Germ.) fol. 187. b.

Albula caerulea Gefneri. Willugh. p. 185.

Raj. p. 61.

Tigurinis *Blawling & Felchen*.

Sabaudis *Bezola*.

δ. *Albula parva vel simpliciter dicta in Tigurino lacu*. Gefn. p. 34.

Albula parva vel simpliciter dicta Gefneri. Aldrov. l. 5. c. 53.

p. 659.

Albula parva. Gefner. (Germ.) fol. 188. b.

Jonst. l. 3. tit. 4. c. 5. pag. 173. t. 30.
f. 8.

Charlet. p. 164.

Raj. p. 61.

Albelen Tiguri dictus, Locus tigurini piscis. Willugh. p. 184.

Tigurinis Albelen & Weisgangfisch.

e. Alius piscis proprius lemani lacus. Rondel. part. 2. p. 164.

Gefner. p. 31. & 35.

Allula lacustris species alia; Farra vel Ferra. Gefner. (Germ.)

f. 188

Farra vel Ferra vel Pala. Aldrov. l. 5. c. 56. p. 663.

Farra, Fora vel Pala quoque dicta. Charlet. p. 64.

Farra. Jonston. l. 3. tit. 4. c. 7. p. 174. t. 30. f. 11.

Ferra, lacus lemani piscis Genevæ descriptus. Rond.

Willugh. p. 185.

Raj. p. 62.

? *Curimata brasiliensium* Marcgr.?

Guinind wallis, Piscis lacus halensis, Ferra ut puto idem. Willugh. p. 183.

OBS. α . ad eandem speciem cum β . pertinet.

β . est propriissime synonymon nominis Authoris.

γ . Hujus quoque synonyma videntur esse ejusdem cum β .

δ . Huc quoque pertinere videtur.

ϵ . Quæritur an hic diversus sit ab α . β . γ . δ ?

Rajus putat *Albetum* δ , potius ad ϵ , quam ad α pertinere.

III. *COREGONUS* maxilla superiore longiore, pinna dorfi offcolorum viginti trium. Art. spec. 41.

α . *Θύμαλλος*. Ælian. l. 14. c. 22. p. 831.

Θυμός. Ælian. l. 12. c. 49.

Thymalus. Salvian. fol. 81. a.

Wotton. l. 8. c. 190. fol. 170.

Thymalus seu Thymus. Gefner. p. 978. 979. & 1171.

Tymallus. Ambros. hexam. l. 5. c. 23. f. H.

Thymallus. Aldrov. l. 5. c. 14. p. 594.

Jonston. l. 3. tit. 1. c. 3. t. 26. f. 3. 4. 5. & t. 31. f. 6.

Charlet. p. 155.

Willugh. p. 187.

Raj. p. 62.

Titbymallus. Isidor.

Cub. l. 3. c. 91. fol. 91. b.

Thymus. Salvian. fol. 80. b. ad iconem.

Gilli. nomin. c. 112.

Bellon.

Rondel. part. 2. p. 187.

Tunal.

Malacopterygii.

Coregonus. 21

Tunallus. Albert. anim. l. 24.

Efcb. Hildegard. l. 4. part. 1. c. 19. p. 91.

Succis Harr.

Germanis Afch.

Anglis. A Grayling & an Umber.

Italis Temelo.

β. Umbra. Aufon. v. 90.

Umbra fluviatilis. Wotton. l. 8. c. 173. fol. 156.

Bellon.

Rondel. part. 2. p. 172.

Gesner. p. 1032. 1033. & (Germ.)
fol. 175.

Aldrov. l. 5. c. 15. p. 596.

Jonston. l. 3. tit. 1. c. 4.

Willugh. p. 188.

Raj. p. 602.

OBS. Ambrosius hunc piscem multum laudat, dum dicit: Quid
specie tua gratius? Quid suavitate tua jucundius?

Icon. Salviani accurata ut in Willoughbyo.

IV. *COREGONUS maxilla superiore longiore conica.* Art.

Oxyrhynchus. Gesner. p. 771. & (Francof.) p. 655.

Willugh. p. 187.

Raj. p. 62.

Oxyrinchus. Rondel.

Aldrov. l. 5. c. 24. p. 609.

Jonston. l. 3. tit. 1. c. 9. t. 26. f. 13.

Oxyrinchus Rondeletii. Charlet. p. 156.

? *Sphyræna fluviatilis.* Gesner. (Germ.) fol. 177. a.

Antwerp. Hautin.

Flandris Hautin & Outin.

V. *COREGONUS amboinensis.* Art spec. 45.

O S M E R U S, G. Pisc. 8.

OSMERUS radiis pinnae ani septendecim.

Osmerus. Art. spec. 45.

Eperlanus. Rondel. part. 2. p. 196.

Gesner. p. 362. 430. & (Germ.) fol. 180. b.

Rond. Aldrov. l. 4. c. 12. p. 536.

Jonston. l. 2. tit. 2. c. 2. t. 24. f. 3.

Charlet. p. 153.

Willugh. p. 202.

Raj p. 66.

Spirinchus & *Stincus* ut vulgo germani nominant, Gefner. p. 30.*Spirinchus*. Jonston. t. 47. f. 6.

Schonev. p. 70.

Roberg. pisc. p. 21.

Suecis *Närs*. Danis *Smelte*.Germanis Rostockiensibus aliisque *Steint*, *Stinkfisch*.Belgis *Spiring*. Frisus *Spirinch*, *Spiring*. Antwerp. *Eperlan*.Anglis *d Smelt*.Rothamagis in Normandia *Eperlan*.II. *OSMERUS* radiis pinnae ani undecim;? *Zæugos*. Aristot. l. 2. c. 2?? *Ælian*. l. 12. c. 25. p. 718?? *Sauris Spensippi* Athen. l. 7. fol. 161. 14.? *Lacertus peregrinus*. Rondel. l. 15. c. 9. p. 428.*Lacertus peregrinus seu muris rubri*. Gefner. p. 468. & (Germ.) fol. 45. b.*Saurus* Salviani. fol. 239. 242. b. 243. a.

Aldrov. l. 2. c. 56. p. 277.

Tarantola roma, Willugh. app. p. 29.

Raj. p. 66.

Saurus. Jonston. l. 1. tit. 3. a. 1. punct. 8. t. 21. f. infima.
Romanis *Tarantola*.

S A L M O, G. Pisc. 9.

I. *SALMO* rostro ultra inferiorem maxillam saepe prominente.

Art. spec. 48.

Salmo. Plin. l. 9. c. 18. ex Aquitania.

Aufon. v. 97.

Hildegard. l. 4. p. 1. c. 6. p. 89.

Albert. anim. l. 24.

Astor.

Cub. l. 3. c. 78. f. 88. b.

Jov. p. 143.

Wotton. l. 8. c. 190. f. 169. a.

Rondel. part. 2. p. 167.

Salvian. f. 100. a. b.

Gefner.

Gefner. p. 824. 825. (Germ.) 181. b. 182. a.
Jonston. l. 2. tit. 1. c. 1. p. 106. t. 23. f. 1.
thaumat. p. 427.

Charlet. p. 150.

Willugh. p. 189. 190. 191. 192. &c.

Raj. p. 63.

Roßberg. pisc. p. 17.

Salmo nobilis. Schonev. p. 64.

Salmo vulgaris. Aldrov. l. 4. c. 1. p. 483.

Salmo vel Salmo. Bellon.

Anchorago. Cassiodor. l. 12. epist. 4.

Eriox vel Erox. Albert.

Cub. l. 3. c. 33. f. 78. a.

Suecis Lax. Fennonibus *Lobi.*

Germanis Lacbs.

Anglis Salmon.

OBS. in Mari Mediterraneo non reperitur. Salvia.

II. *SALMO maculis cinereis, cauda extremo aequali.* Art.

Salmo cinereus aut griseus Johnsoni. Raj. p. 63.

The Grey i. e. Cinereus aut Griseus. Willugh. p. 193.

Suecis Grålax.

Anglis The Grey.

III. *SALMO maxilla inferiore paulo longiore, maculis rubris.* Art.

spec. 51.

Trutta. Aëtior.

Cub. l. 3. c. 94. f. 91. b.

Trutta. Ambros. (mediolani) Hex. 5. c. 3.

Gill. nom. 32.

Isidor. or. l. 12. c. 6.

Salvian. f. 97. a. b.

Tritta. Albert.

Varius. Isidor. or. l. 12. c. 6.

Thedo, Truta, Forella. Figul. f. 2. b.

Trutta fluviatilis. Bellon.

Rondel. part. 2. p. 169.

Gefn. p. 1002. 1006. 1007.

Aldrov. l. 5. c. 12. p. 589.

Jonston. l. 3. tit. 1. c. 1. t. 26. f. 1.

Willugh. p. 199.

Raj. p. 85.

Trutta fluviatilis vulgaris. Charlet p. 155.

Trutta, Fario. Gefn. (Germ) f. 173. a.

Truta vel Trutta vulgo, Forina & Fario. Schonov. p. 77.

? Fornâ. Hildegard. l. 4. part. 1. c. 16. p. 91.

Salar & Varius. Salvian. f. 96. b.

Trutti?

Truti? Plinii. Valerian. l. 5. c. 43.
 Suecis. *Forell*, *Srenbis* & *Bäckrö*.
 Anglis *A Trout*.
 Italis *Trotta*.

IV. *SALMO pede minor, quinque dentium ordinibus in palato.*
 Art.

Carpio Benacinus. Jov. p. 122.
Carpio ex Benaco lacu. Jov. p. 144.
Carpio lacus Benaci. Bellon.
 Willugh. p. 197.
 Raj. p. 66.

Carpio. Salvian. f. 99. a. b.
 Rondelet. part. 2. p. 158.
 Jonston l. 3. t. 4. c. 3. p. 171. t. 30. f. 13.
 Charlet. p. 164.

Salmo vel Trutta Benaci lacus, Gesn. p. 184. & 217. (Germ.)
 189.

Carpio diversus ab aliis. Aldrov. l. 5. c. 50. p. 656.
Carpione. Salvian. f. 98. a. ad iconem.
Chare. Camdeni in descriptione agri Lancastriensis.
 Charlet. p. 163.

Anglis Westmorlandorum *Gilt charre*.

V. *SALMO latus, maculis rubris nigrisque, cauda equali.* Art.
 spec. 51.

Trutta taurina. Charlet. p. 155.
Trutta salmonata. Johnsonii Willugh. p. 193.
 Raj. p. 63.

Suecis *Laxöring* & *Börting*.
 Northumbris angliz *The Scurf* - - Bull Trout.

VI. *SALMO dorso fulvo: maculis luteis, cauda bifurcata.*

Salmarinus. Salvian. f. 102. & 101. b. f. 27.

Tridentinis. *Sulmarino* & *Salumandrino*.

OBS. Caput rotundum. Rostrum breve & retusum. Os mediocre,
 admodum denticulatum. Oculi orbiculati.

Cauda lata & bifurca.

Squamæ mediocres, non facile deciduz.

Pinnæ & Cauda rubræ sunt. Venter & latera ex albo rubescunt;
 Dorsum vero ex rubro flavescit, ac luteis quibusdam maculis,
 carpinonis instar, notatur.

Figura corporis rotunda & oblongiuscula.

Pondus maximorum ad 2 librarum, crebro 1 libræ.

Locus frigida & saxosa flumina non 20000 passuum a Tridento
 & alio ad Brissanam 40000 passuum a Tridento.

Parit æstate in initio.

Care

Caro lapidissima & tenera, ex Salviano fol. 102.

VII. *SALMO lineis lateralibus sursum recurvis, cauda bifurca.*
Art.

Salmo Lemani lacus siue *Umbla*, Rondel. part. 2. p. 160.

Gesn. p. 1004. & 1201.

Umbla major siue *Salmo Lemani lacus*. Gesner. (Germ.) f. 190. b.

Umbla vulgaris & *Rondeletii*. Jonston. p. 168.

Umbla minor prior. Aldrov. l. 5. c. 47. p. 650.

Jonston. t. 30. n. 2.

Charlet. p. 163. (conferatur.)

Umbla prior. Willugh. p. 195.

Raj. p. 64.

VIII. *SALMO oblongus, duabus dentium lineis in palato, maculis tantummodo nigris.* Art.

Alia species Trutta fluvialis, quam Germani Hüb vel Hüb appellant. Gesner. p. 1075. 1213.

Trutta piscinaria. Gesner. (Germ.) f. 174. a.

Trutta fluvialis altera, Hunc Germanorum. Aldrov. l. 5. c. 13. p. 572.

Trutta fluvialis altera. Jonston. l. 3. tit. 1. c. 2.

Trutta fluvialis Hüb Germanis dicta. Willugh. p. 199.

Raj. p. 65.

IX. *SALMO cauda bifurca, maculis solum nigris, sulco longitudinali in ventre.* Art.

? *Trutta salmonata*. Rondel. part. 2. p. 161.

? *Trutta Lemani lacus* vel *Salmo lacustris*. Rondel. part. 2. p. 161.

Trutta magna vel *lacustris, quam aliqui Salmonatam cognominant.* Gesner. p. 1003. & 1210.

Trutta magna vel *lacustris. Trutta Salmonata*. Gesner. (Germ.) f. 189. b.

Trutta lacustris vel *Trutta lacus Benaci*. Aldrov. l. 5. c. 49. p. 653.

Trutta lacustris. Jonston. l. 3. tit. 4. c. 2. p. 170.

Willugh. p. 198.

Raj. p. 64. n. 4.

Trutta salmonata, parvus salmo. Charlet. p. 155.

X. *SALMO vix pedalis, pinnis ventris rubris, maxilla inferiore paulo longiore.* Art. spec. 52.

Umbla minor. Gesner. p. 1201. (Germ.) f. 190.

Charlet. p. 163. n. 1.

Willugh. p. 196.

Raj. p. 65.

Arredi *Synonymia.*

D

Umbla

Umbla minor alia. Aldrov. l. 5. c. 47. p. 650.

Suecis Röötele, Rööding.

Lapponibus Raud. sec. Linnæum.

OBS. Conf. Bellon. de aqu. l. 2.

XI. *SALMO pedalis maxilla superiore longiore.* Art.

Salvelin Germanis. Raj. p. 64.

An Umbla altera Rondeletii? Willugh. p. 195.

Synonyma *Umb læ alteræ* Rond. sunt:

Alter Salmo lemani lacus siue Umbla altera. Rondel. part. 2.

p. 160.

Gesner. p. 1004.

1201.

Umbla marina vel Salmo alter Lemani lacus. Gesner. (Germ.)

f. 190. b.

Umbla altera. Rond. Aldrov. l. 5. c. 41. p. 651.

Willugh. p. 195.

Raj. p. 64.

OBS. Confer Charlet. p. 163.

XII. *SALMO minor vulgari (1) similis.* Art. spec. 50.

E S O X, G. Pisc. 10.

I. *ESOX rostro plagioplateo.* Art. spec. 52.

Esox. Plin. l. 9. c. 15. ut videtur.

? *Ὠξυγυγος Nili.* Ælian. l. 10. c. 46. p. 623?

? *Ὠξυγυγος.* Ælian. l. 11. c. 24. p. 669? in mari rubro;

? *Ὠξυγυγος.* Ælian. l. 17. c. 32? in lacu Caspiæ.

? *Ὠξυγυγος Nili.* Athen. l. 7. c. 312?

? *Σφύραϊνα altera.* Oppian. l. 1. p. 7?

Lucius. Auson. v. 122.

Hildegard. l. 4. part. 1. c. 9. p. 90.

Auctor.

Auctor.

Cub. l. 3. c. 52. fol. 82. b.

Figul. f. 4. b.

Wotton. l. 8. c. 190. fol. 169.

Bellon.

Rondel. part. 2. p. 188.

Salvian. fol. 94. b. 95.

Gesner. p. 500. 501. & (Germ.) 175. b.

Schonev. p. 44.

Aldrov.

Aldrov. l. 5. c. 39. p. 630. 635.
 Jonston. l. 3. tit. 3. c. 5. t. 29. f. I. thaum. p. 417.
 Charlet. p. 162.
 Willugh. p. 236.
 Raj. p. 112.

Lutius. Jov. c. 37 p. 127.
Suecis Giädda. Danis *Gedde*.
Germanis Hecht. Belgis *Snoock*.
Anglis The Pike or Pickerell.
Gallis Brochet.
Italiis Luzzo & Lucio.

II. *ESOX rostro cuspidato gracili subtereti & spirhamali*. Art.

Ἡ βελόνη. Aristot. l. 2. c. 15. & l. 5. c. 11. & l. 6. c. 13. 17.
 & l. 9. c. 14.

Durionis, apud Athenæum.

Βελόνη πλάττια. Ælian. l. 9. c. 60. p. 565.

Ραφίς. Oppian. l. 1. halieut. p. 7.

Athen. l. 7. p. 315.

Belone, qui *Aculenti* vocantur. Plin. l. 32. c. 11.

Abaniger. Albert. l. 24. de animal.

Cub. l. 3. c. 8. fol. 72. a.

Acus sue *Belone*. Plin. 9. c. 51.

Wotton. l. 8. c. 166. p. 166. f. 148. b.

Acus. Gaz. Aristot. l. c.

Jov. c. 32. p. 106.

Salvian. fol. 68. a. ad iconem.

Charlet. p. 136.

Acus piscis. *Salvian*. fol. 68. b.

Acus prima species. *Rondel*. l. 8. c. 3. p. 227.

Gefner. p. 9. & 10. & (Germ.) fol. 48.

Schonev. p. 11.

Acus vulgaris sue *Oppiani*. *Aldrov*. l. 1. c. 23. p. 106.

Willugh. p. 231.

Raj. p. 109.

Acus Oppiani. *Aldrov*. l. 1. c. 23. p. 107.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. art. 17. punct. 2. t. 15. f. 16.

Suecis Näbgiädda.

Hamburgensibus Hornfiske.

Anglis Garfish or Hornfish.

Gallis Equille.

Romanis Acucella. *Venetis Angusticula*. *Salv*.

III. *ESOX maxilla superiore longiore, cauda quadrata.*

Acus maxima squamosa. *List*. app. *Willugh*. p. 22.

Raj. p. 109.

E C H E N E I S, G. Pisc. II.

I. ECHENEIS.

- Ἡ Εχένησις. Aristot. l. 2. c. 14.
 Ἄλιαν. l. 2. c. 17. p. 95.
 ? Oppian. hal. l. 1. p. 9.
Echeneis. Ovid. v. 99.
 Plin. l. 9. c. 25. & l. 32. c. 1.
 Ambros. lex. l. 5. c. 10. p. 59.
 Wotton. l. 8. c. 166. fol. 149. a.
Echineis. Cub. l. 3. c. 34.
Echeneis vel Remora. Gefn. p. 345.
Remora. Gaz. arist. l. 2. c. 14.
 Imperat. hist.
 Aldrov. l. 3. c. 22. p. 336.
 Raj. p. 71.
 Rondel. l. 15. c. 18. p. 436.
 Jonston. l. 1. tit. 1. c. 2. a. 4. t. 4. f. 3.
Remora, Echineis, Remeligo, Neurates. Charlet. p. 125.
Iperuquiba & Piraquiba brasiliensibus. Marcgr. l. 4. c. 18.
 Willugh. p. 119.
Achandes. Cub. l. 3. c. 1. fol. 71. a.
 Anglis. *A Suckingfish*.
 Belgis *Suyger*.
 Lusitanis *Piexe Pogador & Piexo piolho*.

CORYPHÆNA, G. Pisc. 12.

I. CORYPHÆNA cauda bifurca.

- Ἰππύργος. Aristot. l. 9. c. 15.
 Oppian. l. 1. p. 8.
 Ἰππύργος. Athen. l. 7. p. 304.
Hippurus. Ovid. v. 95.
 Plin. l. 9. c. 16. & l. 32. c. 11.
 Rondel. l. 8. c. 19. p. 255.
 Gefner. p. 501. & 423.
 Aldrov. l. 3. c. 17. p. 306.
 Jonston. l. 1. tit. 1. c. 1. a. 6. t. 1. f. 12.
 Charlet. p. 124.

Willugh.

Willugh. p. 213.

Raj. p. 100.

Hippurus, *Lampugo*. Gefn. (Germ.) fol. 44. a.

Equisele & *Equiselis*. Gaz. arist. l. 4. c. 10. & l. 8. c. 15.

? *Guaracapema Brasiliensibus*. Marcgr.

Willugh. p. 214.

Raj. p. 100.

Dorado i. e. Aurantius piscis. Nieerembergii.

Anglis à Dolphin.

II. *CORYPHÆNA palmaris pulchre varia, dorso acuto.*

Novacula piscis. Plin. l. 32. c. 2?

Rondel. l. 5. c. 17. p. 146.

Gefner. p. 628. 629. & 721.

Willugh. p. 214.

Raj. p. 101.

Novacula. Gefner. (Germ.) fol. 32. a.

Pecten romæ, *Novacula Rond.* Aldrov. l. 2. c. 27. p. 205.

Pecten romanorum. Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 15.

Pesce pectine. Salv. fol. 217.

Pesce pectine Salviani, *Novacula. Rond.* Gefner. parali. p. 24.

III. *CORYPHÆNA cauda equali, linea laterali curva.* Art.

Πόμπιλος. Ælian. l. 2. c. 15. & l. 15. c. 23.

Athen. l. 7. p. 282. 283. 284.

Oppian. hal. l. 1. p. 8.

Pompilus. Ovid. vers. 101.

Plin. l. 32. c. 11.

Rondel. l. 8. c. 14. p. 250.

Gefner. p. 881. 753. & (Germ.) fol. 60. a. b.

Aldrov. l. 3. c. 19. p. 325.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 2. a. 2. t. 3. f. 5.

Charlet. p. 124.

Willugh. p. 215.

Raj. p. 101.

AMMODYTES, G. Pisc. 13.

I. *AMMODYTES*. Art. spec 55.

Piscis Sandilz dictus Salvian. fol. 70. b.

Sandilz. Salvian fol. 69. b. ad iconem.

Sandilz angulorum, Aldrov. l. 2. c. 49. p. 252. 254.

D 3

Jonston.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 3. a. 1. punct. 1.
t. 21. f. 1.

Tobianus. Schonev. p. 76.

Ammodytes, *Exocetus marinus*, *Ammodytes*, Gefner, (Germ.)
fol. 39.

Ammodytes piscis. Gefner. paralip. p. 3.

Ammodytes Gefneri. Willugh. p. 113.

Raj. p. 38.

Ammodytes anglorum verus. Jago (in Raj. syn.) p. 165.

Anguilla de arena. Charlet, p. 146.

? *Cicirellus messanensis*. Bocc.

Suecis Tobis?

Anglis Sand-Eels or Launces, minores vero *Grigs*.

OBS. Salvianus hunc piscem primus descripsit, sed icon non
accurata est, cum duos pro una in dorso pinnas pingat.

PLEURONECTES, G. Pisc. 14.

I. *PLEURONECTES oculis & tuberculis sex a dextra capitis,* *lateribus glabris, spina ad anum.*

Pleuronectes utrinque glaber, tuberculis sex a dextra capitis.

Art. spec. 57.

Ψῆτται. Athen. l. 7. p. 329.

Plais. Actor.

Cub. l. 3. c. 69. f. 86. b.

Plâteffa. Bellon.

Rondel. l. 11. c. 7. p. 316.

Gefner. p. 664. & 670. & (Germ.) fol. 52. a.

Schonev. p. 61.

Willough. p. 96.

Raj. p. 31.

Passer laevis. Aldrov. l. 2. c. 47. p. 243.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 3. a. 2. punct. 1. t. 22.

Charlet. p. 149.

Alia Passeris species. Rondel. l. 11. c. 8. p. 318.

Quadrarulus. Rondel. l. 11. c. 8. p. 318.

Quadrarulus alia passeris species. Gefner. p. 665.

De Quadrarulo. Gefner. (Germ.) f. 52. b.

Danis Schickpleder.

Germanis Scholle. Pladise.

Anglis A Plaise.

II. *PLEU-*

II. *PLEURONECTES oculis a dextris, linea laterali aspera, spinulis supine ad radices pinnarum, dentibus obtusis.*

Pleuronectes linea laterali aspera, spinulis ad radicem pinnarum in latere oculato. Art. Spec. 59.

Passer fluviatilis, vulgo Flesus. Bellon.

Willugh. p. 98.

Raj. p. 32.

Passeris tertia species. Rondel. l. 11. c. 10. p. 319.

Gefn. p. 666. 782. 788.

Passer niger. Charlet. p. 145.

Flesus & Fleteletus. Gefner. (Germ.) f. 52. 53. a.

Anglis à Flounder, or Bul, or Fluke.

III. *PLEURONECTES oculis a dextris, totus glaber.*

Hippoglossus. Rondel. l. 11. c. 16. p. 325.

Raj. p. 33.

Hippoglossus (id est Buglossus maximus in oceano.)

Gefner. p. 669. 787.

Willugh. p. 59.

Hippoglossus sine Buglossus maximus. Gefner. (Germ.) f. 54. b.

Hippoglossus ab Aldrovando observatus. Aldrov. l. 2. c. 34. p. 238.

Passer Britannicus. Charlet. p. 146.

Passerum genus majus. Schon. p. 62.

Succis Hålgstundra.

Anglis meridionalibus Holibut, septentrionalibus Turbot.

IV. *PLEURONECTES oculis a dextra, ano ad latus sinistrum, dentibus acutis.*

Pola. Bellon.

Linguatula Roma, Pola Bellonio. Willugh. p. 101.

Raj. p. 33.

Sequentia synonyma huc forte spectant.

Cynoglossus. Rondel. l. 11. c. 13. p. 323.

Gefner. p. 668. 785. (Germ.) f. 54. a.

Cynoglossus Rondeletii forte. Aldrov. l. 2. c. 43. p. 237.

V. *PLEURONECTES oculis a sinistris, corpore glabro,*

Rhombus non aculeatus squamosus. Willugh. p. 95.

Raj. p. 31.

Huc forte referri debent sequentia.

Ρόμβος. Ælian. l. 14. c. 3.

Rhombus. Ovid. v. 125.

Plin.

Cub. l. 3. c. 76. fol. 88.

Rhombus lavis. Rondel. l. 11. c. 3. p. 312.

Gefner. p. 662. 779. (Germ.) f. 51. a.

Schonev. p. 60.

Wil-

Willugh. p. 96.

Raj. p. 32.

Rhombus levis. Aldrov l. 2. c. 48. p. 249.*Rhombus alter gallicus.* Bellon.

Gesner. p. 670.

Anglis Londinensibus *The Peard.* Cornubiensibus, *Lug-aleaf.*Venetis *Scatto* seu *Songius.*VI. *PLEURONECTES oculis a sinistra, linea laterali utrinque aculeata.*

Ἡ ψήττα. Aristot. l. 4. c. 11. & l. 5. c. 9. & l. 9. c. 37.

Alian. l. 14. c. 3.

Oppian. l. 1. p. 5.

Passer. Ovid. v. 125. albus est.

Plin. l. 9. c. 20.

? Jov. c. 25. p. 95. 96. figura oblongior quam Rhombi,

Wotton. l. 8. c. 167. fol. 150.

Gaz aristot. l. c.

? *Rhombus.* Jov. c. 25. p. 95.*Rhombus Bellonii.* Gesner. p. 670.*Rhombus aculeatus,* Rondel. l. 11. c. 2. p. 310.

Gesner. p. 661. 778. & (Germ.) f. 50. b.

Schonev. p. 60.

Aldrov. l. 2. c. 48. p. 248.

Charlet. p. 149.

Willugh. p. 93.

Raj. p. 32.

Venetis *Rhombo.*

OBS. Postquam nomen imposuit, subjicit Author.

1. linea lateralis in sinistro latere tantum aculeata.

VII. *PLEURONECTES oculis a sinistra, corpore aspero.*? *Rhombus squamosus.* Charlet p. 145.*Rhombus maximus asper non squamosus.* Willugh. p. 94.

Raj. p. 31.

VIII. *PLEURONECTES oculis a sinistra, corpore oblongo, maxilla superiore longiore, squamis utrinque asperis.**Pleuronectes oblongus, maxilla superiore longiore, squamis utrinque asperis.* Art spec. 60.

Βέγλωστος. Athen. l. 7. p. 288.

? Βέγλωσση. Oppian. l. 1. p. 5.

Solea. Ovid. v. 124.

Plin. l. 9. c. 16. 20.

Astor.

Cub. l. 3. c. 84. f. 90. a.

Jov.

Jov. c. 26. p. 58.

Bellon.

Gefner. p. 671.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 2. a. 2. punct. 1. p. 82.

Charlet. p. 145.

Buglossus. Wotton. l. 8. c. 167. fol. 150.

Rondel. l. 11. c. 11. p. 320.

Buglossus vel Solea. Gefner. p. 666. 785.

Buglossus siue Solea. Raj. p. 33.

Buglossus seu Solea. Willugh. p. 100.

Buglossa vel Solea. Aldrov. l. 2. c. 43. p. 235.

Solea vel Buglossus. Schonev. p. 63.

Solea siue Buglossus. Gefn. (Germ.) fol. 53. b.

Lingulaca. Varro.

Plaut.

Succis Tungu.

Danis Tungpieder.

Anglis & Gallis à Sole & Soul.

IX. PLEURONECTES *oculis a dextra, squamis asperis, spina ad anum, dentibus obtusis.*

Pleuronectes squamis asperis, spina ad anum. Art. spec. 58.

Passer asper siue squamosus. Rondel. l. 11. c. 9. p. 319.

Schonev. p. 61.

Aldrov. l. 1. c. 46. p. 242.

Willugh. p. 97.

Raj. p. 32.

Limanda. Bellon.

Gefner.

Limanda; Passer asper siue squamosus. Gefner. p. 665. & 781.

Limanda, tertio Passeris species. Gefner. (Germ.) f. 52. a.

Cirbarus. Charlet. p. 145.

Anglis à Dab.

Gallis Limande.

X. PLEURONECTES *oculis a dextra, corpore aspero canescente, pinnis lateralibus vix conspicuis.*

Pleuronectes asper canescens, pinnis lateralibus vix conspicuis.

Art. spec. 60.

OBS. Locus Amboina est.

STROMATEUS, G. Pisc. 15.

I. STROMATEUS.

Stromateus. Athen. l. 7. p. 322. (Salpæ similis, lineis aureis variegatus.)

Artedi Synonymia.

E

Stro-

Stromateus. Rondel. l. 5. c. 24. p. 157.

Gesner. p. 925. & 1109. & (Germ.) fol. 31. a.

Rondel. Aldrov. l. 2. c. 22. p. 192.

Willugh. p. 156.

Raj. p. 50.

Stromatheus. Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 12. t. 19. n. 7.

Charlet. onom. p. 142.

Calliethys. Bellon.

Gesner. p. 134.

Aldrov. l. 2. c. 23. p. 195.

α. *Fiatola.* Bellon.

Gesner. p. 925.

Rondel. l. 8. c. 21. p. 257.

Fiatola Romæ dicta. Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 13. t. 19. n. 8.

Fratola. Gesner. (Germ.) fol. 31. a.

Stromatei species altera. Gesner. (Germ.) 31. a. b.

Fiatola Romæ dicta (quæ Stromatei species, eive cognata existimatur) Rondel. Gesner. p. 925.

Venetis *Licette.*

Romanis *Lampuga.*

OBS. Inquirendum cujus generis sit hic piscis, *Pleuronectis*, *Scombri*, *Xiphiæ* vel proprii?

G A D U S, G. Pisc. 16.

I. *GADUS dorso tripterygio, ore imberbi, corpore albo, maxilla superiore longiore.* Art. spec. 62.

?*Secunda Asellorum species.* Rondel. l. 9. c. 10. p. 276.

Secunda Asellorum species, Merlanus. Gesner. p. 85. 99.

Asellorum secunda species, Merlangus. Gesner. (Germ.) f. 40. a.

Asellus candidus primus. Schonev. p. 17.

Asellus minor alter. Aldrov. l. 3. c. 3. p. 287.

Asellus minor & mollis. Charlet. p. 121.

Asellus mollis. Jonston. t. 2. f. 3.

Asellus mollis major seu albus. Willugh. p. 170.

Raj. p. 55.

Merlangus Bellon?

Suecis *Hwistling.*

Anglis *A Whiting.*

II. *GADUS dorso tripterygio, ore imberbi, maxilla inferiore longiore & linea laterali recta,*

Piscis

Piscis Colfish Anglorum. Bellon.

Gesner. p. 89.

Colfish Anglorum. Gesner. (Germ.) f. 41. a.

Afellus niger Carbonarius. Schonev. p. 19.

Afellus niger siue mollis nigricans. Charlet. p. 121.

Afellus niger. Aldrov. l. 3. c. 7. p. 289.

Willugh. p. 168.

Raj. p. 54.

Anglis septentrionalibus Colefish. Cornubiensibus Ram-Pollack.

III. *GADUS dorso tripterygio, ore imberbi, maxilla inferiore longiore, linea laterali curva.*

Afellus Huisingo. Pollachius. Willugh. p. 167.

Raj. p. 53.

Huc forte referatur.

Afellus virescens. Schonev. p. 20.

Willugh. p. 173.

Raj. p. 53.

Anglis A Whiting Pollack.

IV. *GADUS dorso tripterygio, ore cirrato, colore vario, maxilla superiore longiore, cauda aequali.* Art. spec. 63.

Afellus varius vel striatus. Schonev. p. 19.

Willugh. p. 172.

Raj. p. 54.

Afellus varius. Jonston. t. 46. f. 4.

Roberg. pisc. p. 14.

Suecis Små Torsk.

Anglis Cod & Cod-fish,

V. *GADUS dorso tripterygio, ore cirrato, officulo pinnarum ventralium primo in longam setam producto.*

Afellus luscus. Raj. p. 54.

Bib & Blinds Cornubiensibus, Afellus luscus. Willugh. p. 169.

Anglis Cornubiensibus Bib or Blinds.

VI. *GADUS dorso tripterygio, ore cirrato, cauda aequali fere cum radio primo spinoso.*

Morbua vulgaris (maxima Afellorum species.) Bellon.

Morbua siue Molva altera. Aldrov. l. 3. c. 6. p. 289.

Molva, Morbua. Jonston. l. 1. tit. 1. c. 1. art. 2. t. 2. f. 1.

Molva vel Morbua (altera minor.) Gesner. p. 88. 102.

Molva. Rondel. d. 9. c. 14. p. 280.

Molvus seu Morbua altera minor. Gesner. (Germ.) f. 40. b.

Afellus major. Schonev. p. 18.

Charlet. p. 121.

Afellus major vulgaris, Belgis Cabiliau. Willugh. p. 165.

Afellus major vulgaris. Raj. p. 53.
Suecis Cabbliä. Danis Kablag.

VII. *GADUS dorso tripterygio, ore cirrato, corpore albicante, maxilla superiore longiore, caudæ parum bifurca.*

Gadus cirratus albicans, maxilla superiore longiore, caudæ parum bifurca Art. spec. 64.

? *Calluris.* Plin. l. 9. c. 17?

Callaris, Galerida, & Galaxia, piscis capitosus. Charlet. p. 121.

Æglefinus & Egrefinus. Bellon.

Tertia Afellorum species. Rondel l. 9. c. 11. p. 277.

Tertia Afellorum species, Eglesinus. Gefner. p. 86. 100.

Afellorum tertia species, Eglesinus. Gefner. (Germ.) f. 40. a.

Tertia Afellorum species Rondeletii, Afellus major. Aldrov. l. 3. c. 1. p. 282.

Afellus minor. Schonev. p. 18.

Onos siue Asinus antiquorum. Turner. epist. ad Gefner.

Turneri Willugh. p. 170.

Raj. p. 55.

Suecis Källior. Danis Koll.

Anglis The Hadcock.

OBS. Vide Jonston. t. 1. f. 1. iconem.

VIII. *GADUS dorso tripterygio, ore cirrato, corpore fescunciali, ano in medio corporis.*

Anthia secunda species. Rondel. l. 6. c. 12. p. 191.

Gefner. p. 56. 64. (Germ.) f. 13.

Afellus mollis minor seu Afellus omnium minimus. Willugh. p. 171.

Raj. p. 56.

Afellus mollis minimus. G. Fago. Raj. p. 163.

Anglis cornubiensibus Poor & Power.

Venetis Mollo, Massiliensibus Capelan.

IX. *GADUS dorso dipterygio, ore cirrato, maxilla superiore longiore.*

Molva major. Charlet. p. 121.

Afellus longus. Schonev. p. 18.

Willugh. p. 175.

Raj. p. 56.

Suecis Länga.

Germanis Eine Lenge.

Anglis Ling.

X. *GADUS dorso dipterygio, maxilla inferiore longiore.*

Ὀ Ὄνος. Aristot. l. 8. c. 15. & l. 9. c. 37.

Ὀ Ὄνος. Athen. l. 7. c. 315.

Ælian. l. 9. c. 38.

Oppian:

- Oppian. hal. l. 1. p. 5. & l. 2. p. 59.
 Θαλάττιος. Ælian. l. 5. c. 20. p. 276.
 Γάδος Dorionis apud Athen. l. 7. p. 315.
Buccbus. Plin. l. 9. c. 17. ?
Merluccius. Bellon.
 Gefner. p. 84. 97.
Asellus. Ovid. v. 131.
 Varro l. 4. de lingua latina.
 Plin. l. 9. c. 16. 17.
 Jov. c. 20. p. 87.
 Rondel. l. 9. c. 9. p. 272.
 Salvian. f. 73. ad iconem.
Asellus minor. Salvian. f. 73. b.
Asellus & primum de *Merlucio*. Gefner. (Germ.) f. 39. b.
Asellus alter, siue *Merlucius ab Aldrovando observatus*. Aldrov.
 l. 3. c. 2. p. 286.
Asellus fuscus. Charlet. 122.
Asellus primus, siue *Merlucius*. Raj. p. 56.
Asellus primus Rondeletii siue Merlucius. Willugh. p. 174.
 (vide) Jonston. t. 1. f. 3.
 Anglis *The Hake*.
 Gallis *Merlus*.
 Italis *Merluzo*.
 OBS. Icon Salviani accurata non est, nam vice versa unam
 dorsū & duas ani pinnas pingit.

XI. *GADUS dorso dipterygio, sulco magno ad pinnam dorsī primam, ore cirrato.*

Galea venetorum seu Asellorum altera species. Bellon.
 Gefner. p. 90.

- Mustella vulgaris*. Rondel. l. 9. c. 15. p. 281.
Mustela vulgaris. Gefner. p. 89. 103. (Germ.) f. 41. b.
 Aldrov. l. 3. c. 8. p. 290.
 Willugh. p. 121.
 Raj. p. 67.
Mustela. Jonston. l. 1. tit. 1. c. 1. a. 2. t. 1. f. 4.
Mustela altera. Schonev. p. 49.
Mustela marina tertia. Gefner. (Germ.) f. 41. b. & 42. a.
 Anglis cornubiensibus *Wistle-fish*.
 Venetis *Donzellina* & *Sorge marina*.

XII. *GADUS dorso tripterygio, ore cirrato, longitudine ad latitudinem tripla, pinna ani prima officulorum tringinta.* Art. spec. 65.

Asellus mollis latus. Lister apud Willugh. p. 22.
 Raj. p. 55.

Asellus barbatus. Charlet. p. 121.

Anglis *Pouting*, *Pout* & *Whiting-Pout*.

OBS. Vertebras 49 habet.

Species 5ta ad hanc speciem omnino pertinere videtur.

XIII. *GADUS dorso tripterygio, ore cirrato, maxillis aequalibus.*

Lota. Rondel. part. 2. p. 164.

Aldrov. l. 5. c. 46. p. 648.

Willugh. p. 125.

Raj. p. 68.

Lota gallis dicta. Gefner. p. 599.

Lota gallorum. Jonston. l. 3. tit. 3. c. 11. p. 168. t. 29. f. 10.

Ssrinfia sive Botatriffa. Bellon.

Gefn. p. 599.

Borbotha. Ifidor.

Cub. l. 3. c. 12. f. 72. b.

Borbocha. Magni (Olai) l. 20. c. 20.

Botatrria. Salvian. f. 213. a. ad iconem.

Trifeus. Salvian. f. 213. b.

Bened. Jovii in disticis. vide P. Jov. c. 22.

Alropa. Hildegard. l. 1. part. 4. c. 25. p. 92. (ut videtur.)

Musfela fluviatilis. Jonston. thauinat. p. 422.

Gefner. (Germ.) f. 171. b.

Kentmanni. Gefner. paralip. p. 27.

Schonev. p. 49.

Willugh. p. 125.

Raj. p. 67.

Robert. pisc. p. 9.

Charlet. p. 159.

Musfela fluviatilis & *lacustris*. Gefn. Aldrov. l. 5. c. 7. p. 577.

Jonston. l. 3. tit. 2. c. 6. p. 146.
t. 28. f. 6.

Suecis *Lake*.

Germanis *Alraupe*, *Olruppe*, *Trüsch*, *Treischen*, *Rütten*.

Belgis *Putael*.

Anglis *Eelpout*,

ANARHICHAS, G. Pisc. 17.

I. ANARHICHAS.

Lupus marinus nostras. Schonev. p. 45.

Lupus marinus Schoneveldii. Jonston. t. 47. f. 2.

Lupus

Lupus marinus nostras & *Schoneveldii*. Willugh. p. 130.

Raj. p. 40.

Anarrhichas, *Scanfor*. Gefner. (Germ.) fol. 63. a.

? *Rheinisch*. Gefner. (Germ.) fol. 41. a.

Anglis Sea wolf.

MURÆNA, G. Pisc. 18.

I. *MURÆNA unicolor*, *maxilla inferiore longiore*. Art. spec. 66.

Ἡ ΕΥΧΕΛΟΣ. Homer. Iliad l. 21.

Aristot. l. 5. c. 5. & l. 2. c. 13. 15. 17. & l. 4. c. 8. 11. & l. 6. c. 13. 16. & l. 8. c. 2. part. l. 4. c. 12.

Athen. l. 7. p. 297. 298. 299.

Ælian. l. 14. c. 8. p. 809.

Oppian. hal. lib. 1. p. 6. 19.

Anguilla. Plaut. pseud.

Varro l. 4. ling. latin.

Juvenalis.

Plinil l. 9. c. 20. 21. 22. 51. & l. 32. c. 2.

Ambros. hexam. l. 5. c. 2. p. 52.

Macrob. satur. l. 3. c. 15.

Isidor.

Auctor.

Hildegard. l. 4. part. 1. c. 24. p. 92.

Cuba. l. 3. c. 2. f. 71. a.

P. Jov. c. 33. p. 106.

C. Figul. fol. 6. a.

Wotton. l. 8. c. 166. f. 148. a.

Belkon.

Rondel. part. 2. p. 198.

Salvian. fol. 64. a. 66. &c.

Gefner. p. 40. & (Germ.) fol. 177. b.

Schonev. p. 14.

Aldrov. l. 4. c. 14. p. 544.

Jonston. l. 2. tit. 2. c. 4. p. 114. t. 24. f. 7. thaum.
p. 409.

Charlet. p. 153.

Willugh. p. 109.

Raj. p. 37.

Roberg. pisc. p. 4.

Suecis *Al.*
 Germanis *Abl.*
 Anglis *Eel.*

II. *MURÆNA* *supremo margine pinnae dorsalis nigra.*

Ο *Κόγγος*. Aristot. l. 1. c. 5. & l. 2. c. 13. 15. 17. & l. 3. c. 10. & l. 6. c. 17. & l. 8. c. 12. 13. 15. & l. 9. c. 2.

Γόγγος. Aristot. l. 7. p. 288.

Oppian. hal. l. 1. p. 5. & 20.

Conger. Plaut. aulul. act. 2. scen. 6.

Terent. adelph. act. 3. scen. 4.

Ovid. v. 115.

Plin. l. 9. c. 16. 20.

Isidor. orig. l. 12. c. 9.

Albert.

Actor.

Cub. l. 3. c. 22. f. 75. b.

P. Jov. c. 30. p. 102.

Bellon.

Wotton. l. 8. c. 166. fol. 148. b.

Rondel. l. 14. c. 1. p. 394.

Salvian. fol. 66. b. 67. a. b.

Gesner. p. 290. & (Germ.) fol. 47. a.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 2. art. 6. t. 4. f. 7. thaum.

p. 411.

Charlet. p. 125.

Willugh. p. 111.

Raj. p. 37.

Congrus. Aldrov. l. 3. c. 25. p. 349.

Gonger. Cub. l. 3. c. 41. fol. 80. b.

Gryllus. Rittershufii ad Oppian. halieut. l. 1.

Anglis *A Conger Eel*,

Romanis *Bronco*.

III. *MURÆNA*. *rostro acuto lituris albidis vario, margine pinnae dorsalis nigro.*

α. *Serpens marinus alter, cauda compressa*. Willugh. p. 108.

Raj. p. 36.

β. Ο *Μύρος*. Aristot. l. 5. c. 10.

Ælian. l. 14. c. 15. p. 820.

Athen. l. 7. p. 312.

Smyrus. Plin. l. 32. c. 11.

Myrus. Plin. l. 9. c. 23.

Rondel. l. 14. c. 6. p. 407.

Gesner. p. 577. 680.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 2. a. 8.

Charlet.

Charlet. p. 126.
Willugh. p. 109.
Raj. p. 37.

Myrus, *Muraena mas.* Gesner. (Germ.) fol. 46.

Murus, Gaz. Arist. l. c.

OBS. α certissima sunt synonyma hujus speciei, sequentia β vero huc pertinere videntur.

IV. *MURÆNA exakte teres, cauda acuta apterygia.*

Ὀφίς θαλάσσιος. Aristot. l. 2. c. 14. & l. 9. c. 37.

Serpens marinus. Salvian. fol. 57. a ad iconem.

Serpens marinus. Salvian. fol. 58. a.

Bellon.

Rondel. l. 14. c. 7. p. 409.

Gesner. p. 862. 864. 1037. & (Germ.) fol. 47. b.

Serpent. l. 5. fol. 69. a.

Aldrov. l. 3. c. 24. p. 346.

Serpent. l. 1. c. 20. p. 298.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 2. a. 5. p. 16. t. 4. f. 5.

Serpent. l. 1. tit. 2. c. 2. a. 2. t. 8.

Charlet. onom. p. 125.

Willugh. p. 107.

Raj. p. 36.

V. *MURÆNA teres gracilis maculosa, cauda tereti cuspidata apterygia.*

Serpens marinus maculosus. (Lister.) Willugh. app. p. 19.

Raj. p. 37.

VI. *MURÆNA pinnis pectoralibus carens.*

Ἡ Μύραινα. Aristot. l. 1. c. 5. & l. 2. c. 13. 15. & l. 3. c. 10.

& l. 5. c. 10. & l. 8. c. 2. 13. 15. & l. 9. c. 2.

Ælian. l. 1. c. 32. 50. & l. 9. c. 40. 66.

Athen. l. 7. p. 312.

Oppian. l. 1. p. 21. & l. 8. p. 39.

Muraena. Plaut. amph. act. 1. scen. 3.

Pseud. act. 1. scen. 3.

Aulul. act. 2. scen. 6.

Columell. l. 8. c. 16.

Ciceron. fam. l. 7. epist. 27.

M. Varro rustic. l. 2. c. 6.

Ovid. v. 26. 42. 114.

Plin. l. 9. c. 16. 19. 20. 23. 54. 55. & l. 32. c. 2.

5. 7. 8.

Ambros. hexam. l. 5. c. 2. 7. p. 52.

Macrob. saturnal. l. 3. c. 15.

C. Figul. fol. 6. a.

Artedi Synonymia.

F

Bellon.

Bellon.

Rondel. l. 14. c. 5. p. 402.

Salvian. fol. 59. 60.

Gefner. p. 575. & (Germ.) fol. 46. a.

Jonston. l. 1. tit. 2. a. 7. t. 5. f. 3. 4. thaum. p. 422.

Charlet. p. 126.

Willugh. p. 103.

Raj. p. 34.

Murena. Isidor.

Auctor.

Cub. l. 3. c. 58. fol. 84. a.

P. Jov. c. 31. p. 103.

Wotton. l. 8. c. 166. fol. 147. b.

Murena mus. Aldrov. l. 3. c. 27. p. 357.*Murena femina*. Aldrov. l. 3. c. 27. p. 356.*Fluta*. Columell.*Italio Mourene* vel *Morena* Salv.

OPHIDION, G. Pisc. 19.

I. *OPHIDION cirris quatuor in maxilla inferiore.**Ophidium*. Plin. l. 32. c. 9.*Ophidion*. Rondel. l. 14. c. 2. p. 357.*Ophidion plinii*. Gefner. p. 91. 104.

Aldrov. l. 3. c. 26. p. 353.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 2. a. 6. t. 5. f. 2.

Rondeletio. Willugh. p. 112.*Ophidion rondeletii*, *Ophidium plinii*. Raj. p. 38.*Gryllus vulgaris*; *Aselli species*. Bellon.

Gefner. p. 92.

Pisciculus Congro similis. Plin.II. *OPHIDION cirris cavenis.**Ophidion flavum* vel *Ophidion imberbe*. Rondel. l. 14. c. 2.
p. 398.*Ophidion alterum flavum* vel *imberbe*, *Rondeletio*. Willugh. p. 113.
Raj. p. 39.*Ophidion flavum* & *imberbe*. Schonev. p. 53.*Ophidion*. Schelham. anat. Xiph. p. 23. 24.*Hilliglandis Nagnogen*.

ANABLEPS, G. Pisc. 20.

I. *ANABLEPS*. Art. Seb. thes. 3.

OBS. Est piscis antea non descriptus; ejus accuratam delineationem in opere D. Sebz dedimus,

GYMNOTUS, G. Pisc. 21.

I. *GYMNOTUS*.

Carapo bras. Marcgr.

Raj. p. 41.

O R D O II.

A C A N T H O P T E R Y G I I.

B L E N N I U S , G. Pisc. 22.

I. *BLENNIUS fulco inter oculos, macula magna in pinna dorsi,*

?*Bélenos*. Athen. l. 7. p. 288? gobio similis est.

Blénvos. Oppian. l. 1. fol. 108. 35. ed. lippii.

Blennius. Plin. l. 32. c. 9.

Blennus. Salvian. f. 218.

Bellon.

Gefner. (Germ.) fol. 3. a.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 15. t. 19. f. 5.

Blennus bellonii. Gefner. p. 126. 147.

Blennus bellonii melius depictus. Aldrov. l. 2. c. 28. (pro 26.)
p. 203.

Blennus Salviani & fortasse etiam *bellonii*. Willugh. p. 131.
Raj p. 72.

Meforo. Salvian. fol. 217. ad iconem.

Romanis. *Meforo*.

Anglis *The Butterfly-fish*.

OBS. *Belennus* Rondeletii alius piscis videtur.

II. *BLENNIUS pinnulis duabus ad oculos, pinna ani officulorum viginti trium*

Gattorugine venetiis; Raj. p. 72.

Gattorugine venetiis; *Alandis* Rondeletio dictis affinis: *Exocoeto* primo *Belloni*, similis si non idem; an *Piscis gutturosus* *gefneri*. Willugh. p. 132.

III. *BLENNIUS crista capitis transversa entacea,*

Galerita. Rondel. l. 6. c. 21. p. 204.

Alanda cristata. Rondel.

Aldrov. l. 1. c. 25. p. 114.

Jonston. t. 17. f. 3.

Charlet.

Charlet. p. 137.

Raj. p. 73.

Alauda cristata siue galerita. Gefner. p. 17. 20.

Willugh. p. 134.

Alauda cristata siue galerita prima. Gefner. (Germ.) fol. 4. a.

IV. BLENNIUS *maxilla superiore longiore, capite summo acuminato.*

Alauda non cristata. Rondel. l. 6. c. 22. p. 205.

Gefner. p. 18. & (Germ.) fol. 4. a.

Aldrov. l. 1. c. 25. p. 114.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 2. a. 1. t. 18. f. 2.

Charlet. p. 137.

Willugh. p. 133.

Raj. p. 73.

Alauda marina. Gefner. (Germ.) fol. 4. a.

Livornis Galeotto.

Anglis cornubiensibus Mulgranoc and Bulcard.

V. BLENNIUS *maculis circiter decem nigris limbo albicante utrinque ad pinnam dorsalem.*

Gunnellus cornubiensium, nonnullis Butterfish. q. d. Liparis.

Willugh. p. 115.

Raj. p. 144.

VI. BLENNIUS *cirris sub gula pinniformibus quasi bifidis, areolis dorsi transversis.*

Lumpen antverpiæ dicta, Mustela species. Willugh. p. 120.

Mustela Lumpen antverpiæ dicta. Raj. p. 40.

Mustela alia vulgaris siue Galea piscis. Gefner. p. 90. 105.

Mustela vulgaris altera, Galea piscis. Gefner. (Germ.) fol. 41. b.

VII. BLENNIUS *capite dorsoque fusco-flavescente lituris nigris, pinna uni flava*

Tertia Mustelarum species vivipara & marina. Schonev. p. 49. 50.

Mustela marina vivipara. Schonev. t. 4. f. 2.

Jonston. t. 46. f. 8.

Mustela vivipara. Schoneveldii. Willugh. p. 122.

Raj. p. 69.

ORDO II. ACANTHOPTERYGII.

BLENNIUS, G. Pisc. 22.

- I. *BLENNIUS fulco inter oculos, macula magna in pinna dorsi,*
?Béleunos. Athen. l. 7. p. 288? gobio similis est.
Bléunos. Oppian. l. 1. fol. 108. 35. ed. lippii.
Blennius. Plin. l. 32. c. 9.
Blennus. Salvian. f. 218.
 Bellon.
 Gesner. (Gerin.) fol. 3. a.
 Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 15. t. 19. f. 5.
Blennus bellonii. Gesner. p. 126. 147.
Blennus bellonii melius depictus. Aldrov. l. 2. c. 28. (pro 26.)
 p. 203.
Blennus Salviani & fortasse etiam bellonii. Willugh. p. 131.
 Raj p. 72.
Mesoro. Salvian. fol. 217. ad iconem.
 Romanis. *Mesoro.*
 Anglis *The Butterfly-fish.*
 OBS. *Belennus Rondeletii* alius piscis videtur.
- II. *BLENNIUS pinnulis duabus ad oculos, pinna ani ossiculorum*
viginti trium.
Gastorugine venetiis; Raj. p. 72.
Gastorugine venetiis; *Alandis Rondeletio dictis affinis; Exocæto*
primo Belloni, similis si non idem; an Piscis gutturosus
gesneri. Willugh. p. 132.
- III. *BLENNIUS cristâ capitis transversa entacea,*
Galerita. Rondel. l. 6. c. 21. p. 204.
Alanda cristata. Rondel.
 Aldrov. l. 1. c. 25. p. 114.
 Jonston. t. 17. f. 3.

Charlet.

Charlet. p. 137.

Raj. p. 73.

Alauda cristata siue *galerita*. Gefner. p. 17. 20.

Willugh. p. 134.

Alauda cristata siue *galerita prima*. Gefner, (Germ.) fol. 4. a.

IV. *BLENNIUS* maxilla superiore longiore, capite summo acuminato.

Alauda non cristata. Rondel. l. 6. c. 22. p. 205.

Gefner. p. 18. & (Germ.) fol. 4. a.

Aldrov. l. 1. c. 25. p. 114.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 2. a. 1. t. 18. f. 2.

Charlet. p. 137.

Willugh. p. 133.

Raj. p. 73.

Alauda marina. Gefner. (Germ.) fol. 4. a.

Livornis Galeotto.

Anglis cornubiensibus *Mulgranoc* and *Bulcard*.

V. *BLENNIUS* maculis circiter decem nigris limbo albicante utrinque ad pinnam dorsalem.

Gunnellus cornubiensium, nonnullis *Butterfish*. q. d. *Liparis*.

Willugh. p. 115.

Raj. p. 144.

VI. *BLENNIUS* cirris sub gula pinniformibus quasi bifidis, areolis dorsi transversis.

Lumpen antverpiæ dicta, *Mustela species*. Willugh. p. 120.

Mustela Lumpen antverpiæ dicta. Raj. p. 40.

α. *Mustella alia vulgaris siue Galea piscis*. Gefner. p. 90. 105.

Mustela vulgaris altera, *Galea piscis*. Gefner. (Germ.) fol. 41. b.

VII. *BLENNIUS* capite dorsoque fusco-flavescente lituris nigris, pinna uni flava

Tertia Mustelarum species vivipara & *marina*. Schonev. p. 49. 50.

Mustela marina vivipara. Schonev. t. 4. f. 2.

Jonston. t. 46. f. 8.

Mustela vivipara. Schoneveldii. Willugh. p. 122.

Raj. p. 69.

G O B I U S, G. Pisc. 23.

I. *G O B I U S* ex nigricante varius, pinna dorsi secunda officulorum quatuordecim.

Ὁ Κοβίος. Aristot. l. 2. c. 17. & l. 6. c. 13. & l. 8. c. 2. 13. 19. & l. 9. c. 2. 37.

Κοβίος. Alian. l. 2. c. 50.

Athen. l. 7. p. 309.

Oppian. l. 1. p. 7. & l. 2. p. 46.

Gobio. Plin. l. 9. c. 57.

Columell. l. 8. c. 17.

Juvenal. satyr. 11. 4.

Gobio vel Gobius. P. Jov. c. 22. p. 90.

Gobio marinus. Salvian. fol. 214. b.

Gobio marinus niger. Bellon.

Gefner. p. 393.

Gobio niger. Rondel. l. 6. c. 17. p. 200.

Gefner p. 395. 469.

Gobius niger. Gefner. (Germ.) fol. 6. b.

Aldrov. l. 1. c. 20. p. 97.

Willugh. p. 206.

Gobius marinus niger. Raj. p. 76.

Gobius vel Gobio niger. Schonev. p. 36.

Gobius, *Golio* & *Cobio marinus*. Charlet. p. 135.

Venetis *Go vel Goger*. Ligurinis *Zolero*.

Gallis *Boulerot*.

Anglis *Sea-Gudgeon*. Pensantiz in anglia *Rock-fish*.

OBS. *Athenæus* dicit *Gobios* & *nigros* & *candidiores* & *flavescentes* esse.

Patrianus f. 214. utraque dorsi pinna aculeis caret,

Salviani icon mala est, cum tribus in dorso pinnis.

II. *G O B I U S* linea lutea transversa in summo pinnae dorsalis prima.

Gobio. Rondel. l. 6. c. 16. p. 195.

Gobius albus. Bellon.

Gefner. p. 393.

Gobius marinus maximus flavesceus. Gefner. (Germ.) fol. 6. b.

Gobius marinus Rond. Aldrov. l. 1. c. 20. p. 96.

Gobius secundus; *Paganellus venetorum*. Willugh. p. 207.

Gobius secundus seu *Paganellus venetorum*. Raj. p. 75.

Paganellus id est *Gobius major* & *subflavus*. Gefner. p. 397.

Paga-

Paganellus seu Gobius major ex Gesnero. Aldrov. l. 1. c. 20.

p. 95.

Venetis *Paganello.*

OBS. Vide Jonston. tab. 15. f. 11.

III. *G O B I U S. pinna ventrali cœrulea, officulis pinnae dorsalis primæ supra membranam assurgentibus.*

Κωβίος λευκός. Aristot. l. 9. c. 37.

Κωβίος λευκότερος. Athen. l. 7. p. 309.

Gobio albus. Rondelet. l. 6. c. 18. p. 200.

Gesner. p. 396.

Gobius albus. Gesner. (Germ.) fol. 6. b.

Rond. Aldrov. l. 1. c. 20. p. 97.

Gobius tertius, Jozo roma Salviani: forte Gobius albus rondeletii. Willugh. p. 207.

Raj. p. 76.

Joza. Salvian. fol. 213. a. ad iconem, descriptio deficit.

IV. *G O B I U S aphyæ & Marfio dictus.*

Ἡ Κωβίτης. Aristot. l. 6. c. 15.

ἈΨυα Κωβίτης. Athen. l. 7. p. 284. 285.

Aphyæ cobitis. Aldrov. l. 2. c. 29. p. 211.

Aphyæ cobites. Rondel. l. 7. c. 3. p. 210.

Aphyæ cobites. Willugh. p. 207.

Aphyæ cobites. Bellon.

Gesner. p. 67.

Aphyæ cobitis. Gesner. (Germ.) fol. 1. a.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 17.

Aphyæ gobites, Gobionaria. Charlet. p. 143.

Gobionaria. Gaz. arist. l. c.

Marfio. Gesner. (Germ.) fol. 1. b.

Marfio veterorum. Aldrov. l. 2. c. 38. p. 213.

Raj. p. 76.

Venetis *Pignoletti vel Marfione.*

X I P H I A S, G. Pisc. 24.

I. *X I P H I A S.*

Ὁ Ξιφίας. Aristot. l. 2. c. 13. 15. & l. 8. c. 19.

Athen. l. 7. p. 314.

Ξιφίας. Ælian. l. 9. c. 40. p. 548. & l. 14. c. 23.

Oppian. l. 1. p. 8. & l. 2. p. 48.

Xiphias.

Xiphias Cuv. v. 10.

Plin. l. 9. c. 2. 12.

Aristot. l. 3. c. 33. fol. 187. h.

Linnæus l. 3. c. 15. p. 351.

Gönn. Germ. fol. 50. h.

Joubert. Germ. p. 423.

Cuvier p. 124.

Xiphias Linnæus.

Cat. l. 3. c. 103. fol. 94. a.

Xiphias Albert.

Cat. l. 3. c. 105. fol. 94. a.

Xiphias ut est Götting. p. 1049.*Xiphias* fex Götting. Joubert. l. 1. c. 1. c. 2. a. 3. c. 4. a.*Xiphias* p. 1049. Götting. Willing. p. 161.

Raj. p. 52.

Götting fex *Xiphias* p. 1049. Götting. (Frankf.) p. 379.*Götting* ut *Xiphias*. Schöner. p. 35.*Götting*. Plin. l. 9. c. 15.

Aristot. Lex. l. 15. c. 12. p. 59.

Linnæus.

Cat. l. 3. c. 39. fol. 92. a.

Salvian. fol. 125. ad iconem d. 127.

Albert. l. 3. c. 31. p. 352.

Sarcis Sordani.*Angus* The Sordani.*Italis* Fex Spada. Lignibus Esperian.Obs. *Götting* Brachycephalus Martegani ad hanc speciem quoque pertinet.

SCOMBER, G. Pfc. 25.

1. SCOMBER pinnalis quinque in extremo dorso, polypterygia, aures brevis ad os. Art. spec. 69.

O *Σκῆμ* 240. Aristot. l. 6. c. 17. & l. 8. c. 12. 13. & l. 9. c. 2.

Elian. l. 14. c. 1. p. 798.

Aristot. l. 3. p. 121. & l. 7. p. 311.

Oppian. l. 1. halicut. fol. 108. 109. & l. 3.

Sordani. Ovid. hal. v. 54.

Columell. l. 8. c. 17.

Plin. l. 9. c. 15. & l. 32. c. 11. & l. 31. c. 8.

Martial. l. 13. c. 102.

Bellon.

Ren.

Rondel. l. 8. c. 7. p. 234.
 Gefner. 841. (pro 861.) 1012.
 Schonev. p. 66.
 Aldrov. l. 2. c. 53. p. 270.
 Jonston. l. 1. tit. 3. c. 3. a. 1. punct. 6. p. 92. t. 21. f. 9. 11
 Willugh. p. 181.
 Raj. p. 58.

Scomber vel Scombrus. Gefner. (Germ.) fol. 57.

Scomber, *Scombrus*. Charlet. p. 147.

Scombrus. P. Jov. c. 19. p. 86. 87.

Wotton. l. 8. c. 188. p. 166. b.

Salvian. f. 239. b. 241. 242.

Succis, Danis *Makrill*.

Germanis *Makrel*. Anglis *Macarell*.

Romanis *Macarello*. Venetis *Scombro*.

Neapolitanis *Lacerto*. Massiliensibus *Auriol*.

Hispanis *Carallo* Salvian.

I. *SCOMBER* pinnulis octo vel novem in extremo dorso ex fulco
 ad pinna ventrales.

Ὁ Θύννος. Aristot. l. 2. c. 13. & l. 4. c. 10. & l. 5. c. 9. 10. 11.
 & l. 6. c. 17. & l. 8. c. 2. 12. 13. 15. 19. 30.
 & l. 9. c. 2.

Ælian. l. 9. c. 42. p. 549. & l. 15. c. 13. 16. 27.
 & l. 15. c. 3. 5. 6.

Athen. l. 7. p. 301. 302. 303. 319. & l. 1. p. 5.

Oppian. l. 2. hal. p. 43.

Thunnus. Ovid hal. v. 98.

Gaz. arist.

Aldrov. l. 3. c. 18. p. 313.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 2. a. 1. t. 3. f. 2. thaum. p. 428.

Charlet. p. 124.

Thunnus siue Thynnus. Bellon.

Gefner. p. 957. 967. 1148.

Raj. p. 57.

Thunnus vel Orcymus. Schonev. p. 75.

Thynnus. Plin l. 9. c. 15.

Solin. polyhist. c. 18. 11.

Auctor.

Cub. l. 3. c. 96. f. 92. b.

P. Jov. c. 6. p. 52.

Wotton. l. 8. c. 186. fol. 163. b.

Thynnus siue Thunnus bellonii. Willugh. p. 176.

Thinnus. Gefner. (Germ.) fol. 58. b.

α. Ὁρκύνος. Ælian. l. 1. c. 40.

Oppian. l. 1. p. 8. & l. 2. p. 59.

Irædi *Synonymia*.

G

Ὁρκυν-

Ὀγκρῆς. Athen. l. 7. p. 301. 315.

Oncurus. Plin. l. 32. c. 11.

Gefner. p. 952. & (Germ.) fol. 59. 2.

Aldrov. l. 2. c. 18. p. 314.

Jonston. t. 3. f. 4.

Limosa. Salvian. fol. 123. ad iconem.

β. Ἡ Πηλαγίς. Aristot. l. 5. c. 9. 10. & l. 8. c. 13. & l. 9. c. 2.

Oppian. l. 1. p. 5.

Athen. l. 7. p. 319.

Πηλαγίς. Ælian. l. 15. c. 10. p. 177.

Pelamis. Plin. l. 9. c. 15.

Bellon.

Pelamis & *Thynnus.* Salvian. fol. 123. b. 124. 125.

Pelamis caerulea. Aldrov. l. 3. c. 18. p. 315.

Jonston. t. 3. f. 3.

Pelamys bellonii. Willugh. p. 180.

Raj. p. 58. n. 2.

Pelamys cetera seu *Thunnus aristotelis.* Rondelet. l. 8. c. 11. p. 245.

Gefner. p. 960. 1148. &

(Germ.) fol. 58. 2.

Limaria. Gaz. arist.

γ. ? Χέρδουλς. Aristot. l. 8. c. 2.

Athen. l. 7. p. 306.

Cordyla. Plin. l. 9. c. 15.

Gaz. arist.

Anglis *Tunny*-fish or *Spanish Mackerell*.

Obs. est β. tantum Junior piscis.

III. SCOMBER *linea laterali aculeata, pinna ani officulorum tri-* *ginta.* Art.

?Σαυρῆς. Aristot. l. 9. c. 2?

?Τραχίρῆς. Ælian. l. 13. c. 27. p. 795. ? & l. 11. c. 50.

Τραχίρῆς. Athen. l. 7. p. 326. ex Diocle & Numenio. *Piscis*
siccus & *varius*

Oppian. l. 1. hal. p. 5.

Galen. class. 2. fol. 30. b.

Saurus. P. Jov. c. 19. p. 86.

Salvian. fol. 79. a. b. ad iconem.

Lacertus sine *Trachurus.* Bellon.

Lacertorum genus, quod *Trachurus* greci vocant *bellon.* Gefn.
p. 467. 552.

Trachurus. Rondelet. l. 8. c. 6. p. 233.

Schonev. p. 75.

Aldrov. l. 2. c. 52. p. 268.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 3, art. 1. punct. 5. t. 21. f. 8.

Charlet. p. 143.

Willugh.

Willugh. p. 290.

Raj p. 92.

Salvian. fol. 79. a. b.

Trachurus aut Lacertus privatim. Gefn. (Germ.) fol. 56. b.

Romanis *Sauro.*

Anglis *The Horse Mackerel.* Cornubiensibus *a Scad.*

Germanis *Mäfsken.* Ekrefordiz *Stöcker.*

IV. *SCOMBER dorso dipterygio, officulo ultimo pinnae secundae dorsalis praelongo.*

Ἡ ἄμια. Aristot. l. 2. c. 15. & l. 4. c. 17. & l. 8. c. 2. 13. 19.
& l. 9. c. 37.

Ælian. l. 16. c. 12.

Oppian. l. 1. p. 5. & l. 2. p. 59.

Athen. l. 4. p. 135. & l. 7. p. 277. ex Aristot.

Τρεῖς. Ælian. l. 1. c. 5. p. 9.

Γλαυκος. Aristot. l. 2. c. 17. & l. 8. c. 13. 15. 30.

Oppian. l. 1. p. 7.

Athen. l. 7. p. 295. 296?

Amia. Plin. l. 9. c. 15. ?

Röndel. l. 8. c. 9. p. 238.

Gesner. p. 37. & (Germ.) fol. 59. b. 60.

Aldrov. l. 3. c. 20. p. 327.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 2. a. 2. t. 3. f. 6.

Salvian. fol. 121. 122.

Amia Salviano. Willugh. p. 296.

Hamin. Isidor.

Cub. l. 3. c. 43. fol. 80. b.

Gaz. arist. l. c.

Lechia. P. Jov. c. 7. p. 57.

Glacus. Ovid. hal. v. 117.

Plin. l. 9. c. 16.

Isidor.

Auctor.

Cub. l. 3. c. 38. 39. fol. 79. 80.

Rondelet. l. 8. c. 16. p. 252.

Aldrov. l. 3. c. 16. p. 303.

Raj p. 93.

Glaucus veterum. Jonston. l. 1. tit. 1. c. 1. a. 5. t. 1. f. 11.

Glacus major. Charlet. p. 123.

Glacus (major hexacentrus.) Gesner. p. 388.

Glaucus major seu prima species. Gesner. (Germ.) fol. 62. a.

Romanis & Livornis *Leccia.*

OBS. *Glaucos Æliani* est *Squali species.*

V. *SCOMBER dorso dipterygio, officulo secundo pinnae dorsalis secundae altissimo.*

Glaucus primus. Raj. p. 94.*Glaucus primus, an secundus.* Rondel. l. 8. c. 16. p. 252?
Willugh. p. 297.

MUGIL, G. Pisc. 26.

I. MUGIL. Art. spec. 71.

Κέφαλος. Aristot. l. 5. c. 11. & l. 6. c. 17. & l. 8. c. 2. 13.*Ælian.* l. 1. c. 3. p. 7. & l. 13. c. 19.*Oppian.* l. 1. p. 5.*Κεσρέος & Κεσρέα.* *Ælian.* l. 7. c. 19. & l. 13. c. 15.*Ὁ Κεσρέος.* Aristot. l. 2. c. 17. & l. 4. c. 8. 10. & l. 5. c. 5. 9.
10. 11. & l. 6. c. 13. 15. 17. & l. 8. c. 2.
13. 19. 30.*Athen.* l. 7. p. 306. & l. 1. p. 4. & l. 3. p. 86.*Κεσρέα.* *Oppian.* l. 1. p. 5. & l. 2. p. 53.*Capiro.* *Gaz. arist.* l. c.*Cephalus.* *P. Jov.* c. 10. p. 65.*Ambros.* *Lex.* l. 5. c. 10. p. 57.*Rondelet.* l. 9. c. 2. p. 260.*Gefner.* p. 549. 684. ♦*Cephalus, Mugil.* *Gefner.* (Germ.) fol. 35.*Cephalus seu Mugil.* *Bellon.**Cestreus, Mugil.* *Gefner.* fol. 36. a.*Mugil.* *Ovid.* v. 37.*Plin.* l. 9. c. 15. 17.*Isidor.**Jorath.* *Auctoris obscuri.**Gaz. arist.**Cub.* l. 3. c. 55. fol. 83. b.*Wotton.* l. 8. c. 179. f. 159. a.*Jonston.* l. 1. tit. 1. c. 4. t. 23. f. 5. thaum. p. 421.*Mugil ab aldovando observatus.* *Aldrov.* l. 4. c. 6. p. 508.*Mugil, Cephalus.* *Willugh.* p. 274.*Raj.* p. 84.*Mugil imberbis.* *Charlet.* p. 151.*Mugil & Mugilis.* *Salvian.* f. 75. a. ad 78. a.*Mugilis.* *Salvian.* f. 75. b. ad iconem.*Romanis Cefalo.**Anglis Muller.*OBS. *Salviani icon satis accurata est.*

L A B R U S, G. Pisc. 27.

I. *LABRUS palmaris varius, dentibus duobus majoribus maxilla superioris.*

Ἡ ἰουλὺς. Aristot. l. 9. c. 2.

Athen. l. 7. p. 304.

Ἰούλις. Ælian. l. 2. c. 44. p. 123.

Oppian. l. 1. p. 6. & l. 2. fol. 127. 36.

Galen. class. 2. f. 29. D. E.

Julia. Gaz. arist. l. c.

Salvian. fol. 217. ad iconem

Julis. Plin. l. 32. c. 9.

Bellon.

Rondel. l. 6. c. 7. p. 180.

Salvian. f. 219.

Gesner. p. 464. & 549. & (Germ.) fol. 14. a.

Aldrov. l. 1. c. 7. p. 39.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 5. t. 14. n. 3.

Charlet. p. 133.

Willugh. p. 324.

Raj. p. 138.

Italix *Donzellina* & *Zigarella*.

Venetix *Donzella*. Massiliensibus *Dovella*.

Liguribus *Zigorella*. Cretensibus. *Afdelles*.

Romanis & Neapolitanis *Menchina di re*. Rhodis *Zillo*. Salv.

II. *LABRUS maxilla inferiore longiore, cauda bifurca, lineis utrinque transversis nigris.*

α. *Sacchettus venetorum, an Channadella Belloni & Rondelstii.*

Willugh. p. 326.

Sacchettus venetorum. Raj. p. 139.

Saccheto venetorum. Gesner. (Germ.) f. 24. a.

Hepatus piscis. Bellon.

Gesner. p. 411.

Aldrov. l. 1. c. 42. p. 58.

Jonston. t. 14. n. 13.

Channadella. *Sacchetus venetis*. Aldrov. l. 1. c. 11. p. 57.

β. Huc forte sequentia synonyma pertinent.

Channadella Bellon.

Chanadella vel Channadella potius a similitudine channæ. Gesner.

p. 220. & 261.

Canadella. Gefner. (Germ.) fol. 15. b.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 8. t. 14. n. 11.

Canadella, seu potius *Cbannadella* vel *Canadella* vulgo, *Gefneri.*

Aldrov. l. 1. c. 11. p. 56.

γ. *Channa* Recentiorum; idem forte piscis cum priore, & sequentia habet synonyma.

Ἡ Χάυνη. Aristot. l. 4. c. 11. & l. 6. c. 13. & l. 8. c. 2. & 13.

Χάυνη. Athen. l. 7. p. 327.

Χάυνος. Oppian. l. 1. p. 6.

Channe. Ovid. v. 108.

3 *Cbanus.* Plin. l. 9. c. 16.

Cbana. Plin. l. 9. c. 52.

Hiarula. Salv. f. 227. a. ad iconem.

Hiarula sine, *Channa.* Salvian. f. 229.

Channa. Bellon.

Gefner. p. 219. & 260.

Rondel. l. 6. c. 9. p. 183.

Willugh. p. 327.

Raj. p. 140.

Channus vel *Channa.* Gefner. (Germ.) fol. 15. b.

Cbanne *Salviani.* Aldrov. l. 1. c. 10. p. 53.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 8. t. 14. n. 10.

Channe, Hiarula. Charlet. p. 134.

Romanis *Sopraciolo.*

Hispanis & Januensibus *Serrau.*

III. *LABRUS* totus rubescens, cauda bifurca.

Ο Ἀνθίας. Aristot. l. 6. c. 17. & l. 9. c. 2. & 37.

Ælian. l. 1. c. 4. & l. 8. c. 28. & l. 12. c. 47.

Oppian. l. 1. p. 10.

Athen. l. 7. p. 282.

Sacer. Gaz. aristot. l. c.

Antbias. Ovid. v. 45.

Plin. l. 9. c. 58.

œ. Huc forte pertinent.

Antbie prima species. Rondel. l. 6. c. 17. p. 188.

Gefner. p. 55. 62 & (Germ.) 13.

? *Antbias aldrovandi prior.* Aldrov. l. 1. c. 19. p. 88.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 14. t. 16. n. 1. 2. 3. 4. 5. &c.

Antbias primus. Rondel. Willugh. p. 325.

Raj. p. 138.

IV. *LABRUS* qui *Scarus* auctorum.

Ο σκαῖος. Aristot. l. 2. c. 17. & l. 8. c. 2. & l. 9. c. 37.

Ælian. l. 1. c. 2. p. 5. & l. 2. c. 54.

Oppian. l. 1. p. 5. 6. & l. 2. p. 53.

Athen.

- Athen. l. 7. p. 319.
Scarus, Ovid. v. 9. & 119.
 Plin. l. 9. c. 17.
 Ambros. l. 5. c. 5.
 Isidor.
 Gaz. arist. l. c.
 Cub. l. 3. c. 31. f. 77. 78. a.
 Bellon,
 Aldrov. l. 1. c. 2 p. 7.
 Willugh. p. 306.
 Raj. p. 129.
 Rondel. l. 6. c. 2.
 Gesner. p. 830. vel r. 850. & (Germ.) f. 7. b.
 Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1 a. 1. t. 13.
Scarus pifcis. Jov. c. 1. p. 7.
Cerebrum Jovis. Ennii poetæ apud Jovium.

V. *LABRUS ex purpureo viridi cæruleo & nigro varius.*

- Scarus varius*. Rondel. l. 6. c. 3. p. 169.
 Gesner. p. 832. pro 852. ed. Franc. & (Germ.)
 f. 7. b.
 Aldrov. l. 1. c. 2. p. 6.
 Jonston. t. 13. n. 4.
 Willugh. p. 306.
 Raj. p. 129.
 OBS. Confer Charlet. O. Z. p. 132.

VI. *LABRUS pulchre varius, pinnis pectoralibus in extremo rotundis.* Art.

- Pavo*. Salvian. f. 233. a. ad iconem & 94. & 234.
 Aldrov. l. 1. c. 4. p. 29.
 Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 3. t. 13. n. 12.
 Charlet. p. 132.

Isidor.

- Turdus II. Pavo colore ex viridi cæruleo*. Gesner. p. 1016.
Turdus (simpliciter dictus secundum Aldrov.) Bellon. lat.
Turdus perbella pictus, an Pavo Salviani. Willugh. p. 322.
 Raj. p. 137.

Romanis *Papagallo*.

OBS. Color viridi, cæruleo, nigricante, rubro &c. admodum varius.

VII. *LABRUS cæruleo nigricans.*

- Ὁ Κόττυρος. Aristot. l. 8. c. 15. & 30.
 Athen. l. 7. f. 152. 35.
 Oppian. l. 1. p. 19. & l. 4.
 Κοσσύρος θαλάττιος. Ælian. l. 1. c. 14.

Merula.

Merula, Columell. l. 8. c. 16.

Ovid. v. 114.

Plin. l. 9. c. 15. & l. 32. c. 11.

Ambros. l. 5. c. 2. p. 52.

Gaz. arist. l. c.

Jov. c. 20. p. 87. 88.

Bellon.

Rondel. l. 6. c. 5 p. 172.

Salvian. f. 220. b. ad iconem. 87. & 223. b. 224. a.

Gesner. p. 543. & (Germ.) fol. 8. b.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 4. t. 14. n. 2.

Charlet. p. 133.

Merula Aldrovandi & *Ovidii*. Aldrov. l. 1. c. 6. p. 35.

Merulus, Isidor. l. 12. c. 6.

Turdus niger, *Merula Salviani* & *Rondel*. Willugh. p. 320.

Raj. p. 137.

OBS. Non rubra. Color totius ex cœruleo-nigricans. *Salv.*

VIII. *LABRUS luteus, dorso purpureo, pinna a capite ad caudam continua.*

ΑΛΦΗΣΑΙ. Athen. l. 7. c. 281.

Cynadus, Plin.

Bellon.

Rondel. l. 6. c. 4. p. 170.

Cinadus Rondel. Bell. Aldrov l. 1. c. 14. p. 67.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 10. t. 15. n. 1.

? *Cinadus* Bell. Raj. p. 138.

Alpbestes vel *Cynadus*. Gesner. p. 36. 40.

Alpbestes Cynadus. Gesner. (Germ.) f. 15.

Alpbestes. Charlet. p. 135.

Alpbestes sine Cynadus. Willugh. p. 323.

Raj. p. 137.

IX. *LABRUS rostrum sursum reflexo, cauda in extremo circulari.*
Art.

Turdus 12mus Vielle. Rondel. l. 6. c. 6. p. 179.

Turdus duodecimus in provincia vulgo Vielle. Gesner. p. 1019.

Turdus duodecimus. Gesner. (Germ.) f. 12. a.

Aldrov. l. 1. c. 3. p. 25.

? *Turdus* Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 2. t. 13. fig. infimæ.

Turdus vulgarissimus; *Tinea marina venetis*. Willugh. p. 319.

Raj. p. 136.

Anglis Cornubiensibus *The Wrasse* or *Old-wife*.

OBS. 1. Κίχλαι. Athen. l. 7. p. 305. est Turdi species.

2. Κόσσυφαι. Athen. l. 7. p. 305. est Merulæ species.

X. *LABRUS ex flavo & ceruleo varius, dentibus anterioribus majoribus.*

Turdus major varius precedenti similis. Willugh. p. 322.

Raj. p. 137.

Obs. An distincta species a 6ta.

XI. *LABRUS oblongus viridis, iride lutea.*

Turdus viridis major. Willugh. p. 322.

Turdus viridis major, corpore oblongo. Raj. p. 137.

α. *Turdus oblongus fuscus maculosus.* Willugh. p. 323.
Raj. p. 137.

XII. *LABRUS terraodon virescens, cauda bifurca.*

Scarus cretensis. Aldrov.

Raj. p. 129.

Turdus viridis indicus. List. app. Willugh. p. 23.

SPARUS, G. Pisc. 28.

I. *SPARUS unicolor flavescens, macula nigra annulari ad caudam.*

Πυαῖς. Aristot. l. 4. c. 8. & l. 5. c. 11.

Ælian. l. 9. c. 46.

Σπάρκος. Athen. l. 7. c. 320.

Oppian. l. 1. f. 108. 34.

Eustath. f. 1720. 41.

Sparus. Plin. l. 32. c. 11.

Albert.

Cubæ l. 3. c. 79. fol. 88. b.

Bellon.

Rondel. l. 5. c. 3. p. 118.

Salvian. f. 176. b. & 177.

Aldrov. l. 2. c. 18. p. 182.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 10. & t. 18. n. 11.

Charlet. p. 141.

Willugh. p. 308.

Raj. p. 129.

Marinus. Gessner. p. 880. & 1056. & f. 23. b. ed.

Germ.

Sparulus. Ovid. vers. 111.

Artesi Synonymia.

H

Fluta

Fluta & Spargus. Gaz.

Caspargus. Ælian. l. 11. c. 32. secundum Salvianum.
Romanis *Sparo*.

II. *SPARUS lineis transversis variis, macula nigra insigni ad caudam.*

Ὁ σάργος. Aristot. l. 5. c. 9. 11. & l. 6. c. 17. & l. 7. c. 2.
Ælian. l. 1. c. 23. p. 29. & l. 11. c. 19. & l. 13.
c. 2.

Oppian. l. 1. p. 19. l. 4. f. 147. 34 & 148. 47.
Athen. l. 7. p. 321.

Sargus. Ennii apolog.

Ovid. hal. v. 105.

Plin. l. 9. c. 17. 51. 59.

Jov. p. 74.

Bellon.

Rondel. l. 5. c. 5. p. 122.

Salvian. f. 178. b. & 179. & 180.

Gesner. p. 825. E. F. & 993. & f. 24. b. E. G.

Aldrov. l. 2. c. 16. p. 176.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 9. t. 19.

Charlet. p. 141.

Willugh. p. 309.

Raj. p. 130.

Italica & Venetia *Sargo*.

III. *SPARUS lineis utrinque luteis longitudinalibus parallelis, iride argentea.*

Κάινδαρος. Aristot. l. 8. c. 13.

Oppian. l. 1. p. 19.

Θαλάττιος. Ælian. l. 1. c. 26. p. 34.

Cantbarus. Ovid. hal. v. 103.

Plin.

Bellon.

Rondel. l. 5. c. 4. p. 120.

Gesner. p. 178. 211. & f. 22. b. E. G.

Aldrov. l. 2. c. 20. p. 186.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 11. t. 19; n. 5.

Charlet. p. 141.

Willugh. p. 309.

Raj. p. 130.

Scarabeus. Gaz.

IV. *SPARUS lineis longitudinalibus variis, macula nigra utrinque ad caudam.*

Μελάργος. Aristot. l. 8. c. 2.

Ælian. l. 1. c. 41. p. 48. & l. 12. c. 17.

Oppian.

- Oppian. l. 1. p. 5. & l. 3. f. 139. 37. 39.
 Athen. l. 7. p. 313. & l. 8.
Melanurus. Ovid. hal. v. 113.
 Columell. l. 8. c. 16.
 Plin. l. 32. c. 11. & 2.
 Jov. c. 24. p. 94.
 Bellon.
 Rondel. l. 5. c. 6. p. 126.
 Salvian. f. 181. 182.
 Gefner. p. 540. 638. & fol. b. E. G.
 Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 10. t. 14. n. 15,
 Charlet. p. 134.
 Willugh. p. 310.
 Raj. p. 131.
Melanuros. Aldrov. l. 1. c. 13. p. 64.
Oculata. Gaz. in Aristot. l. c.
Romanorum Occhiata.
Massiliensium Obluda.
V. SPARUS totus rubens, iride argentea.
 Ὁ ἔρυθρὸς & ἔρυθρὸς. Aristot. l. 4. c. 11. & l. 6. c. 13 &
 l. 8. c. 13.
 ἔρυθρὸς. Athen. l. 7. c. 300.
 ἔρυθρὸς. Oppian. l. 1. f. 108. 21.
Erythrinus. Ovid. hal. v. 104.
 Plin. l. 9. c. 16. 52. & l. 32. c. 9. 10.
 Bellon.
Erythrinus. Rondel. l. 5. c. 16. p. 144.
 Gefner. p. 365.
 Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 4.
 Willugh. p. 311.
 Raj. p. 134.
Rubellio. Gefn. f. 25. a. E. G.
sive Rubellio. Salvian. f. 239.
sive Rubellio. Aldrov. l. 2. c. 9. p. 154.
Erythrynus. Rubellio. Charlet. p. 140.
Rubellio. Salvian. f. 238. b. ad. Ic.
 Gaz. l. 32. c. 9.
Ζαῖδος. Oppian. l. 1. f. 108. 23.
Fragolinus. Jov. c. 13. p. 71.
Pagrus sive Phagrus. Jov. p. 71.
Venetis Alboro & Arbore.
Ligurinis Pagro.
Romanis Frangolino & Fragolino.
Hispanis & Narbonensibus Pagel. sec. Rondeletium.

VI, SPARUS varius, dorso acuto, dentibus quatuor majoribus.

Ἡ συνάργεις. Aristot. l. 2. c. 13. 15. & l. 8. c. 2. 13. & l. 9. c. 2.

Σύνοδον. Ælian. l. 1. c. 44. p. 52.

Συνόδον καὶ συνάργεις. Athen. l. 7. p. 322.

? Synodon. Ovid. hal. v. 107.

Charlet. p. 140.

Dentrix, *Dentix*, *vel Pagrus*. Cub. l. 3. c. 26. f. 77. a.

Dentex. Gaz. arist. l. c.

Jov. c. 12. p. 70.

Salvian. f. 110. b. 111.

Gefner. (Germ.) f. 26. a.

Aldrov. l. 2. c. 12. p. 161.

Gill. c. 111.

Synagris. Rondel. l. 5. c. 19. p. 150.

? Charlet. p. 140.

vel Synodon, quæ *Synagris* *adultior Rondeletio* *videtur*. Gefner. p. 933.

Dentalis seu Dentex (Synodon) Bellonii. Gefn. p. 934. & 1119.

Synagris Bellonii. Gefn. p. 934.

Dentex alter ab Aldrovando observatus. Aldrov. l. 2. c. 12. p. 163.

α. Huc etiam videtur pertinere.

Synodon siue Dentex. Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 6. t. 18. n. 9.

Dentex siue Synodon Aldrov. Willugh. p. 312.

Raj. p. 134.

Dentalis siue Dentex. Bellon.

Italix Dentale

VII. *SPARUS* lineis utrinque undecim aureis parallelis longitudinalibus.

Ἡ σάλπη Aristot. l. 4. c. 8. & l. 5. c. 9. 10. & l. 6. c. 17. & l. 8. c. 2. 13. & l. 9. c. 37.

Ælian. l. 9. c. 7. p. 516.

Oppian. l. 1. p. 6.

Athen. l. 7. p. 320.

Salpa. Ovid hal. v. 121.

Plin. l. 9. c. 57.

Astor.

Cubæ. l. 3. c. 78. f. 88. 6.

Jov. c. 14. p. 73.

Bellon.

Rondel. l. 5. c. 23. p. 154.

Salvian. f. 119. a. ad Icon. & 120.

Gefner. p. 832. & 979. & fol. 34. b. E. G.

Aldrov. l. 2. c. 21. p. 189.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 12. t. 2. n. 10. & t. 19. a. 6.

Charlet.

Charlet. p. 141.
Willugh. p. 316.
Raj. p. 134.

Genuensibus Sarpa.

VIII. *SPARUS lineis utrinque quatuor antrsis ac argenteis longitudinalibus parallelis.*

? Ἡ Βώκη. Aristot. l. 9. c. 2. ?

? Βωζ. Oppian. l. 1. p. 5.
Athen. l. 7. p. 286.

Box & Boca. Plin.

Boca. P. Jov. c. 21. p. 89.

Voca. Gaz.

Box prima. Bellon.

Boops. Rondel. l. 5. c. 11. p. 136.

Gefner. p. 127. & 147

Charlet. p. 144.

Boopis prima species. Gefner. fol. 33. b. E. G.

Boops Bellonii. Aldrov. l. 2. c. 41. p. 231.

Boca species venetiis picta. Aldr. l. 2. c. 41. p. 231.

Boops seu Box. Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 23. t. 20. n. 8.

Boops Rondeletii primus. Willugh. p. 317.

Boops primus. Raj. p. 135.

Venetis, Romanis, Massiliensibus Boga.

IX. *SPARUS varius, macula nigricante in medio latere, dentibus quatuor majoribus.* Art.

Ἡ Μάσσις. Aristot. l. 6. c. 15. 17. & l. 8. c. 30. & l. 9. c. 2.

Oppiani. l. 1. c. 5.

Athen. l. 7. c. 313.

? *Menerela.* Ovid. hal. v. 120?

Mana. Plin. l. 9. c. 26.

Gill.

Bellon.

Rondel. l. 5. c. 13. p. 138.

Gefner. p. 519. & 612. & fol. 33. a. E. G.

Aldrov. l. 2. c. 39. p. 224.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 21. t. 20. n. 4.

Charlet. p. 144.

Willugh. p. 318.

Manas Rondeletii. Raj. p. 135.

Alec. Gaz. in aristot. l. c.

Venetis Menelo.

Romanis Menola.

Massiliensibus Mendole.

Narbonensibus (sec. Rondelet.) Fusile.

H 3

X. SPA-

X. *SPARUS macula nigra in utroque latere medio, pinnis pectoralibus caudaque rubris.*

Ἡ σμαρίς. Aristot. l. 8. c. 30.

Oppian. l. 1. p. 5.

Smaris, Ovid. hal. v. 120.

Bellon.

Rondelet. l. 5. c. 14. p. 140.

Gefner. f. 33. b. E. G.

Aldrov. l. 2. c. 40. p. 228.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 22. t. 20. n. 5.

Willugh. p. 319.

Raj. p. 136.

Ἐ Μαρῖς, *Leucomænides*, Charlet. p. 144.*(Mæna candida seu) Smaris*, Gefn. p. 522, & 616.*Cerrus*, Plin. l. 32. c. 11.

Martial.

*Venetis Girolì & Gerruli.**Massiliensibus* (sec Rondel.) *Gerres*.XI. *SPARUS maxilla superiore longiore, lineis utrinque duodecim nigris transversis parallelis.* Art.

Ὁ μόρμυρος. Aristot. l. 6. c. 17.

Athen. l. 7. p. 313.

Eustath. f. 1150. 33.

Μορμύλος, Oppian. l. 1. p. 5. & l. 2. p. 58. t. 3. f. 134. 3.*Mormylus*, Salvian. f. 183. a. ad icon.*Mormyr*, Ovid. hal. v. 110.

Plin. l. 32. c. 11.

Mormur, Gaz. in aristot. l. c.*Mormyrus*, Bellon.

Rondel. l. 5. c. 22. p. 153.

Salvian. f. 184.

Gefner. p. 547.

Aldrov. l. 2. c. 19. p. 184.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 11. t. 19. n. 3.

Charlet. p. 141.

Willugh. p. 329.

Raj. p. 134.

vel *Mormylus*, Gefn. fol. 22. a. E. G.*Romanis Mormillo.**Venetis Mormiro.**Massiliensibus & Liguris Mormo.**Narbonensibus Morme.* sec. Rondel.XII. *SPARUS officulo secundo pinnarum ventralium in longam setam quasi producto.* Art.

Ὁ χρεμψ, χρεμῖς καὶ χρεωμῖς. Aristot. l. 4. c. 8. 9. & l. 5. c. 9.

c. 9. & l. 8. c. 19.

Xéomus. Ælian. l. 9. c. 7. p. 516. & l. 10. c. 11. p. 582.

Athen. l. 7. p. 328.

Chromis. Ovid. hal. v. 121.

Plin. l. 9. c. 16.

Gaz. in aristot. l. c.

Rondel. l. 5. c. 21. p. 152.

Gefner. p. 223. & 264. & fol. 26. b. E. G.

Aldrov. l. 2. c. 14. p. 168.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 7. t. 17. n. 14.

Willugh. p. 330.

Raj. p. 141.

Et *Cremis*. Charlet. p. 140.

Tuscis & Ligurinis Castagnole.

Siculis Monachelle.

XIII. SPARUS varius, macula nigra ad caudam in extremo aequalem.

Ο *Ορφος*. Aristot. l. 5. c. 10. & l. 8. c. 13. 15.

Ælian. l. 5. c. 18. p. 275. & l. 12. c. 1.

Oppian. l. 1. p. 6.

Ορφος. Athen. l. 7. p. 315.

Orphus. Ovid. hal. v. 104.

Plin. l. 9. c. 16.

Rondel. l. 5. c. 25. p. 157.

Aldr. l. 2. c. 11. p. 158.

Gefner. fol. 27. a. E. G.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1 a. 5. t. 18. n. 8.

Charlet. p. 140.

(*alius*) *veterum*. Gefn. p. 638. & 752.

Orpheus veterum. Willugh. p. 314.

Rond. Raj. p. 133.

Cernua. Gaz. in aristot. l. c.

α. *Orphus græcorum*. Bellon.

Gefn. fol. 27. b. E. G.

— *græcis (hodie sic dictus)* Gefn. 937. & 751.

Bellonii. Aldrov. l. 2. c. 11. p. 158.

Queritur an α sit cum præcedenti ejusdem speciei, vel an diversæ?

IV. SPARUS dorso acutissimo, linea arcuata aurea inter oculos.

Ο *Χρυσόφρεν*. Aristot. l. 1. c. 5. & l. 2. c. 17. & l. 4. c. 10.
& l. 5. c. 10. & l. 6. c. 17. & l. 8. c. 2. 13. 15. 19.

Χρυσόφρεν. Ælian. l. 13. c. 28. p. 796. & l. 11. c. 33. &
l. 16. c. 12. p. 920.

Athen. l. 7. p. 328. & l. 8.

Oppian.

- Oppian. l. 1. p. 7. & l. 3. fol. 135. b.
Chrysophrys. Ovid. v. 111.
 Varro. rust. l. 3. c. 3.
Aurata. Columell. l. 8. c. 16.
 Martial. ep. l. 13. 90.
 Plin. l. 9. c. 16. & l. 32. c. 541.
 Cub. l. 3. c. 4. fol. 71. b.
 P. Jov. c. 11. p. 68.
 Wotton. l. 8. c. 174. fol. 156.
 Bellon.
 Rondel. l. 5. c. 2. p. 115.
 Salvian. fol. 174. b. 175.
 Gefner. p. 112. 128. & (Germ.) fol. 23. c.
 Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 8. t. 19. f. 2.
 Charlet. p. 140.
 Willugh. p. 307.
 Raj. p. 131.
Aurata vulgaris. Aldrov. l. 2. c. 15. p. 171.
Italica Orata. Venetis *Ora*.
Hispanica Dorade. Salv.
Anglica a Gilt head or *Gilt-poll*.

XV. *SPARUS rubescens*, *cute ad radicem pinnarum dorfi & ani in finem producta*. Art.

- Ὁ Φάργος. Aristot. l. 8. c. 13.
 Ælian. l. 9. c. 7. p. 517. & l. 10. c. 19.
 Athen. l. 4. p. 327.
Pagrus. Plin. l. 9. c. 16. & l. 32. c. 10.
 Isidor.
 Acton.
 Cub. l. 3. c. 66. fol. 86. a.
 Bellon.
 Rondel. l. 5. c. 15. p. 142.
 Gefner. p. 656.
 Aldrov. l. 2. c. 8. p. 151.
 Willugh. p. 312.
 Raj. p. 131.
Phagrus. Jonston. l. 1. tit. 4. c. 1. a. 4. t. 17. f. 13.
Phagrus seu Pagrus. Gefner. (Germ.) fol. 25. b.
 Charlet. p. 139.
Genuensibus Pagro.
Narbonensibus Pagre.
Anglica a Sea-Bream.

SCIÆNA, G. Pisc. 29.

I. *SCIÆNA maxilla superiore longiore, cirrosa in inferiore.* Art.

Ἡ Σκίανα. Aristot. l. 8. c. 19.

Σκίανα. Elian. l. 9. c. 7. p. 517?

Athen. l. 7. p. 322.

Oppian. hal. p. 6. l. 4.

Cchromis. Bellon.

Umbra. Varron.

Columell.

Ennii poetæ.

Apulej.

Isidor?

Cub. l. 3. c. 99. f. 93. a.?

Wotton. l. 8. c. 173. fol. 156.

Rondel. l. 5. c. 9. p. 132.

Gesner. (Germ.) fol. 28. a.

Willugh. p. 299.

Raj. p. 95.

Umbra marina. Bellon.

Gesner. p. 1029. 1230.

Aldrov. l. 1. c. 17. p. 81.

Umbrina. Jov. c. 5. p. 48.?

Coracinus. Salviat. fol. 116. b. 117. b. 118. α. (appendicum
in mento habet.)Sciæna sive Umbra. Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 13. t. 15.
f. 9.

Sciæna, Umbra. Charlet. p. 135.

Sciæna. Plin. l. 9. c. 16.

Venetis Corvo.

Obs. Synonyma hujus generis mihi adhuc aliquanto dubia
sunt.II. *SCIÆNA ex nigro varia, pinnis ventralibus nigerrimis.* Art.Κορακίνος. Aristot. l. 5. c. 10. & l. 6. c. 17. & l. 8. c. 15. 19. 30.
& l. 9. c. 2.

Elian. l. 14. c. 23. p. 833.

Athen. l. 7. p. 308.

Oppian. hal. l. 1. p. 6.

Coracinus. Plin. l. 9. c. 16. 18. & l. 5. c. 9. & l. 32. c. 5. 7.
Cæli Rhodigini. l. 7. c. 15.

Artedi Synonymia.

I

Gesner.

Gefner. (Germ.) fol. 29. a.

Aldrov. l. 1. c. 15. p. 74.

Salviani. Aldrov. l. 1. c. 15. p. 74.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 11. t. 15. f. 4. 5.

Charlet. p. 155.

Willugh. p. 300.

Raj. p. 95.

Coracinus fulviger & *Coracinus albus*. Rondel. l. 5. c. 8. p. 128.

Gefner. p. 294.

Umbr. Salvian. fol. 115. a.

? *Σκιαρα*, *Umbr.* Salvian. secundum Willughbyum.

α. OBS. An cum hac specie conveniat sequens.

Umbrino Romæ dictus. Willugh. p. 300.

Raj. p. 95.

β. Pro diversa specie a 1 & 2 statuitur.

Coracinus niger. Salvian. fol. 118. b.

Aldrov. l. 1. c. 15. p. 73.

Corvo de fortiera. Salvian. fol. 117. a. ad iconem, qui pedalis tantum, totus nigrescens, & aculeum maximum ad pinnam ani habens.

PERCA, G. Pifc. 30.

I. *PERCA* lineis utrinque sex transversis nigris, pinnis ventralibus rubris. Art. spec. 74.

Ἡ Πέσκη. Aristot. l. 6. c. 14.

? Πέσκη. Ælian. l. 14. c. 23. & 26.

? Athen. l. 7. p. 319.

Plin. l. 32. c. 9. 10.

Perca. Auson. v. 115.

Hildegard. l. 4. part. 1. c. 18 p. 91.

Actor.

Alexandi cujusdam, quem citat Cuba.

Cub. l. 3. c. 66. f. 86. a.

Figul. f. 3. b.

Rondel. part. 2. p. 196.

Jonston thauemat. p. 423.

Perca fluviatilis. Wotton. l. 8. f. 157.

Bellon.

Rondel. part. 2. p. 196. 197.

Salvian. f. 224. b. & 226.

Gefner.

- Gefner. p. 698. & (Germ.) f. 168. b.
 Willugh. p. 291.
 Raj. p. 97.
Perca fluviatilis major. Aldrov. l. 5. c. 33. p. 622.
Perca major. Schonev. p. 55.
 Jonston. l. 3. tit. 3. c. 1. p. 146. t. 28. fig. in infima parte & t. 29. f. 8.
 Charlet. p. 161.
Suecis Abbor.
Daniis Aborn.
Germanis Barß & Bersich.
Anglis d Peark.
Italis Persega.
Gallis Percbe.
Italis Persego.
Insularibus Pesce Parfico. Salv.

II. *PERCA pallide maculosa, dentibus duobus utrinque majoribus.*
 Art. spec. 76.

- Piscis quem Schilus Germani vocant, alii Nagemulum.* Gefn. paralip. p. 28. vel 1288. D.
Lucio-perca. Gefner. paralip. p. 28. vel 1288. & (Germ.) f. 176. b.
 Schonev. p. 43.
 Willugh. p. 293.
 Raj. p. 98.

Schilus sive Nagemulus Germanorum. Aldrov. l. 5. c. 59. p. 667. 668.

- Schilus.* Jonston. l. 3. tit. 4. c. 7. p. 174. t. 30. f. 15.
Schilus, Nagemulus. Charlet. p. 164.
Suecis Giös.
Pomeranis, Holfatis & Megapolensibus Sandat.
Augustæ Vindelicorum Schindel.
Bavaris ad lacum Ammerzee Nagmanl.

III. *PERCA lineis utrinque octo vel novem transversis nigris.* Art.

- Asper pisciculus.* Rondel. part. 2. p. 207.
 Jonston. l. 3. tit. 1. c. 11. t. 26. f. 18.
 Charlet. p. 157.
 Willugh. p. 294.
 Raj. p. 98.

Asper pisciculus, gubioni similis. Gefner. p. 403. 478. paralip. p. 19.
 Aldrov. l. 5. c. 28. p. 616.

- Gobius asper.* Gefner. (Germ.) f. 162. b.
Lugdunensibus in Gallia Apron.
Ratisbonæ Strever.

IV. *PERCA* dorso monopterygio, capite cavernoso. Art. spec. 80.

α . ?*Χοῖρος Ποτάμιος*. Athen. l. 8. c. 331. (vocem edit.)

?*Χοῖρος*. *Ælian*. l. 14. c. 23. p. 833.

?*Acerina*. *Plinii medici*.

Cernua fluviatilis. *Bellon*.

Gefner. p. 151. 192. 226.

Willugh. p. 334.

Raj. p. 144.

Cernua fluviatilis, aliis *Perca minor*. *Charlet*. p. 158.

Perca fluviatilis genus minus. *Gefner*. p. 701. & 825.

Porcus fluviatilis, *Perca fluviatilis minor*, *Cernua fluviatilis*.
Gefner. (Germ.) f. 160. a.

Aurata fluviatilis. *Tragi* in epistola ad *Gefnerum* p. 701.

Aspredo. *Cajl* (Jo.) apud *Gefner*. p. 228.

Perca minor, *Porcus*, *Porculus*, *Porcellus*, *Cernua nonnullorum*. *Schonev*. p. 56.

Perca fluviatilis minor. *Aldrov*. l. 5. c. 34. p. 624. 626.

Jonston. l. 3. tit. 3. c. 2. t. 28. f.

Perca minor, quibusdam *Cernua*. *Charlet*. p. 161.

Suecis Giers. *Danis Horch*.

Germanis Knulbarsi, *Suerbarfs* & *Stuer*.

Belgis Pofch, *Poff*.

Anglis A Ruffe.

β . *Piscis Danubii*, quem *Schrödl* vel *Schröllen* *Germani* ejus fluminis accolæ nuncupant. *Gefner*. p. 29. (Germ.) 1289.

Schrödl. *Gefner*. (Germ.) f. 161.

Danubii incolæ, *Piscis Schrödlus*. *Aldrov*. l. 5. c. 35. p. 627.

Srollus. *Jonston*. l. 3. tit. 3. c. 3. t. 28. f. a dextro latere.

Srollus Danubianus. *Charlet*. p. 161.

Willugh. p. 335.

Raj. p. 143.

Ratisbonenf. Schrollus.

Obs. Quod α & β sit ejusdem speciei.

V. *PERCA* dorso monopterygio, lineis utrinque longitudinalibus nigris. Art.

Schraitser Ratisbonensibus. *Willugh*. p. 335.

Raj. p. 144.

Obs. Officula in pinna dorsali 30, quorum aculeata 18. sunt.

VI. *PERCA* lineis utrinque septem, transversis; nigris, ductibus miniaceis cæruleisque in capite & antica ventris.

Πέγμη. *Aristot*. l. 2. c. 13. 17. & l. 8. c. 15.

Athen. l. 7. fol. 159. 29. ed. valderi.

Oppian. l. 1. p. 6.

Galen. class. 2. fol. 29. C.

Perca. *Ovid*. hal. v. 112.

Plin.

Acanthopterygii.

Perca. 69

Plin. l. 9. c. 16.

Jov. c. 24. p. 92.

Rondel. l. 6. c. 8. p. 182.

Salvian. fol. 224. b. ad iconem.

Perca pelagica, Jov. c. 24. p. 92.

Perca marina, Bellon.

Salvian. fol. 225.

Gesner. p. 696. 819. & (Germ.) fol. 16.

Aldrov. l. 1. c. 9. p. 50.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 7. t. 14. f. 8.

Charlet. p. 134.

Willugh. p. 327.

Raj. p. 140.

Romanis *Perca*.

OBS. Huc procul dubio pertinent omnes tres species *Perce* marinæ, quos enumerat Aldrovandus l. 1. c. 9. p. 47. 48. 49. differentias enim a solo colore defumit.

VII. *PERCA* radiis pinne dorsalis secunda tredecim, ani quatuordecim;

Αἰσπῆξ. Aristot. l. 1. c. 5. & l. 4. c. 8. & l. 5. c. 9. 19.

Ælian. l. 1. c. 30. p. 36. & l. 9. c. 7. & l. 10. c. 2. & l. 16. c. 12.

Athen. l. 7. p. 310. 311. & l. 14. p. 662.

Oppian. hal. l. 1. p. 5. & l. 2. c. 34. 58.

Lupus. Ovid. hal. v. 23. 38. 112.

Varro. rust. l. 3. c. 3.

Plin. l. 9. c. 16. 17. 51. 54. & l. 32. c. 2.

Macrob. saturnal. l. 3. c. 16.

Ambros. hexam. l. 5. c. 23. p. 52.

Gazz. arist. l. c.

C. Figul. f. 4. b.

Wotton. l. 8. c. 172. fol. 155.

Bellon.

Salvian. fol. 107. b. 108. 109.

Gesner. p. 506. & (Germ.) fol. 17. b.

Aldrov. l. 4. c. 2. p. 492.

Jonston. l. 2. tit. 1. c. 2. t. 23. f. 3.

Willugh. p. 271.

Raj. p. 83.

Lupus vulgaris. Aldrov. l. 4. c. 2. p. 491.

Lupus marinus. Hidor.

Cub. l. 3. c. 53. fol. 83. a.

Spigola sive *Lupus*. P. Jov. c. 9. p. 64.

Cablio. Lucii Poëtz.

Romanis *Spigola*. Venetis *Branchini*. Hetruscis *Araneo*.

*Hidganis Lape.**Ganis Latr.**Argus A Boiss.*

TRACHINUS , G. Pifc. 32

I. TRACHINUS *maxilla inferiore longiore, cirris deflexis*
Art.α. *Δράκων*. Aristot. l. 2. c. 13.*Ælian*. l. 2. c. 50.?*Oppian*. l. 1. p. 7. & l. 2. p. 46.*Ταλασσίον*. *Ælian*. l. 11. c. 41. & l. 14. c. 12. p. 816.*Draco marinus*. *Plin*. l. 9. c. 27.*Isidor*. l. 12. c. 6.*Bellon*.*Wotton*. l. 8. c. 173. fol. 158. b.*Salvian*. fol. 71. ad iconem.*Draco*. *Gill*. nom. c. 65.*Rondelet*. l. 10. c. 11. p. 300.*Aldrov*. l. 2. c. 50. p. 256.*Jonston*. l. 1. tit. 3. c. 3. a. 1. punct. 2. t. 21. f. 2. 3. 5.*Charlet*. p. 146.*Draco fuscus Araneus piscis*. *Salvian*. f. 71. b.*Draco marinus fuscus Araneus*. *Rondelet*. l. 10. c. 11. p. 301.*Draco fuscus Araneus Plinii*. *Gesner*. p. 77. 78. 89. & (Germ.)
43. b.*Willughb*. p. 288.*Raj*. p. 21.*Araneus*. *Plin*. l. 9. c. 48.*Charlet*. p. 149.*Araneus Aldrovandi alter*. *Aldrov*. l. 2. c. 50. p. 258.*Araneus vel Draco marinus*. *Schonev*. p. 16.*Aranea*. *Isidor*. l. 12. c. 6.*Cub*. l. 3. c. 3. fol. 71. b.*Trachurus*. *Jov*. c. 19. p. 86.*Trachina*. *Jov*. c. 19. p. 86.Et *Trachidna*. *Jov*. p. 86.*Huc etiam pertinent,*β. *Draco major*. *Gesner*. p. 78.*minor*. *Gesner*. p. 78.*Draconis forte omnes species*, in libri 2. cap. 50. apud *Aldrov*.

Et forte etiam.

γ. *Ar-*

Acanthopterygii.

Trachinus. 71

γ. *Aranei seu Draconis marini species altera.* Willugh. p. 289.

Raj. p. 92.

Suecis & Danis *Fjärving*, ad sinum Codanum,

Hiliglandis *Schwerfisch*.

Anglis *Weever*. Gallis *Viver*.

Italīs *Pisce ragno*.

II. *TRACHINUS cirris multis in maxilla inferiore.* Art.

Ὁ Καλλιῶνυμος. Aristot. l. 2. c. 15. & l. 8. c. 13.

Καλλιῶνυμος. Ælian. l. 13. c. 4. p. 753.

Οὐρανοσκόπος. Athen. l. 7. f. 142. 5. ed. Valderi.

—— l. 8. f. 177. 33.

Galen. class. 1. fol. 125. A.

Ἄγνος. Athen. l. 8. f. 177. 33. ed. Valderi.

Ἐμεροκοίτης. Oppian. l. 2. p. 37.

Uranoscopus. Plin. l. 32. c. 7.

Uranoscopus. Cub. l. 3. c. 101. fol. 93. b.

Rondelet. t. 19. c. 13. p. 305.

Salvian. fol. 196. b. ad icon. & 197. b. & 198.

Aldrov. l. 2. c. 51. pro 52. p. 265.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 3. a. 1. punct. 4. t. 21.

f. 7. thaumat. p. 429.

Raj. p. 97.

Uranoscopus seu Celi Speculator. Charlet. p. 147.

Callionymus. Plin. l. 32. c. 7.

Wotton. l. 8. c. 171. fol. 154. b.

Callionymus sine Uranoscopus. Plin. l. 32. c. 11.

Callionymus vel Uranoscopus. Gesner. p. 135. 158. & (Germ.)

f. 20. a.

Callionymus vel Uranoscopus. Willugh. p. 287.

Puleber piscis. Gaz. l. c.

Romanis *Meforo* & Venetiis (*Lucerne*) & cec e prete item

βacca in capo.

Massiliensibus *Tapecon* & *Raspecon*.

TRIGLA, G. Pisc. 32.

.. *TRIGLA capite glabro, cirris geminis in maxilla inferiore.* Art.

Ἡ Τρίγλα. Aristot. l. 2. c. 17. & l. 4. c. 11. & l. 5. c. 9. & l. 6. c. 17. & l. 8. c. 2. 13. & l. 9. c. 2. 37.

Τρίγλη

Τρίγλη. *Ælian*. l. 2. c. 41. p. 118. & l. 9. c. 51. 65. p. 551
& l. 10. c. 2.

Athen. l. 7. p. 324. 325.

Oppian. l. 1. p. 5. 6.

Mullus. *Ovid.* v. 123.

Columell. l. 8. c. 17.

Plin. l. 9. c. 17. 18. 51. & l. 32. c. 10. 11.

Senec. natur. quæst. l. 7. epist. 96.

Martial. l. 15.

Ciceron. parad. 48.

Horat. Serm. l. 2.

Jovenal. sat. 4.

Macrob. l. 3. saturnal. c. 16.

Gaz. arist. l. c.

Wotton. l. 8. c. 169. fol. 151. b.

P. Jov. c. 18. p. 83.

Salvian. fol. 235. 236. &c.

Schonev. p. 47.

Jonston. thaum. p. 421.

Willugh. p. 285.

Raj. p. 90.

Mulus. *Isidor.* l. 12. c. 6.

Auctor.

Mulus vel Mullus. *Cub.* l. 3. c. 60. fol. 84. b.

Mullus minor. *Salvian.* fol. 236. a. l. 32. & 35. &c.

Mullus barbatus. *Cicer. attic.* 22.

Varron. rust. l. 3. c. 17.

Rondel. l. 10. c. 4. p. 290.

Gesner. p. 565. 667. & (*Germ.*) fol. 19. a.

Mullus Gesneri, qui minor Salviani dicitur. *Aldrov.* l. 2. c. 1
p. 231.

Jonston. t. 17. f. 5

II. *TRIGLA capite glabro, lineis utrinque quatuor, lineis, longitudinalibus, parallelis.* *Art.*

Mullus major. *Salvian.* fol. 236. a. l. 32. 34. &c. fol. 235
a. fig. 95.

Mullus major ex Hispania missus. *Aldrov.* l. 2. c. 1. p. 123.
Jonston. t. 17. f. 6.

Mullus major noster & Salviani. *Willugh.* p. 285.

Raj. p. 91.

Gallis & Cornubiensibus a Surmuller.

OBS. Hic piscis a *Salviano* primum descriptus est.

III. *TRIGLA, capite glabro, tota rubens, cirris carens.* *Art.*

Mullus imberbis sive Bax mullorum. *Willugh.* p. 286.

Raj

Raj. p. 91.

Melitenfibus *Re di Triglia.*

IV. *TRIGLA capite aculeato, appendicibus utrinque tribus, ad pin-
nas pectorales.* Art.

Kορδζ. Athen. l. 8. fol. 177. 29. 32. 33. sec. Salvian.

Hirundo Aldrovandi prior, cum suo fetu. Aldrov. l. 2. c. 3.
p. 136.

Hirundo. Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 2. t. 17. f. 8.

Willugh. p. 280.

Raj. p. 88.

Corvus. Plin. l. 32. c. 11.

Isidor. l. 12. c. 6.

Salvian. fol. 194. 195.

Anglis Cornubienfibus *The Tub-fish.*

Romanis *Capone.*

V. *TRIGLA rostro parum bifido, linea laterali, ad caudam bifurca.*
Art.

Milvus sine Milvago. Plin. . . sec. Rondeletium.

Milvus. Rondel. l. 10. c. 8. p. 297.

Aldrov. l. 2. c. 58. p. 276. rostro bifido, cauda fur-
cata.

Lucerna seu Milvus. Rond. Gesner. p. 499.

Lucerna, Milvus, & Milvago. Gesner. p. 497. & (Germ.)
fol. 17. a.

Lucerna Venetorum. Willugh. p. 281.

Raj. p. 88.

Cuculus. Salvian. fol. 190. 191.

Neapolitanis & Siculis *Cocco.* Liguribus *Organo.* Massiliensi-
bus *Galline.*

VI. *TRIGLA capite parum aculeato, pinnula singulari, ad pinnas
pectores.* Art.

Χελιδών. Aristot. l. 4. c. 9. strepet volatu suo.

Ælian. l. 2. c. 50. p. 429. & l. 9. c. 52. & l. 12.
c. 59.

Oppian. l. 2. p. 46. ut videtur, & l. 1. fol. 113. 53. 58.

ἱερὰζ. Ælian. l. 12. c. 59.

Athen. l. 8. fol. 177. 32.

ἱερζ. Oppian. l. 1. fol. 113. 53.

Milvago Plin. l. 32. c. 2. ex Trebio Nigro.

Milvus. Ovid. v. 92. ? ex nigro Tergore.

Plin. l. 9. c. 26. 27.

Bellon.

Salvian. fol. 187.

Arredi Synonymia.

K

Aldrov.

Aldrov. l. 2. c. 5. p. 141. vel 124.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 3. t. 17. f. 12.

Willugh. p. 283.

Raj. p. 89.

Hirundo. Rondel. l. 10. c. 1. p. 254.

Gesner. p. 434. 514. & (Germ.) fol. 17. b.

Accipiter. P. Gillii in *Ælian*. vers. l. 12. c. 59.

Lucerna. Plin. l. 9. c. 27. & l. 32. c. 11.

Parabele. Marcgr. l. 4. sec. Rajum.

Hispanis Volodor. Salv.

Romanis Rondire.

Melitenisibus & Sicil. Falcone.

Suecis Flygande-fisk.

OBS. *Accipiter marinus*. *Ælian*. l. 9. c. 52. huc forte pertinet.

VII. *TRIGLA tota rubens, rostro parum bicorni, operculis branchiarum striatis*. Art.

Ὁ Χοκκυζ. Aristot. l. 4. c. 9. & l. 8. c. 13.

Ælian. l. 10. c. 11.

Oppian. l. 1. p. 5.

Athen. l. 7. p. 309.

Cuculus. Gaz. arist.

Rondel. l. 10. c. 2. p. 287.

Gesner. p. 305. & (Germ.) fol. 17. b.

Aldrov. l. 2. c. 4. p. 139.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 2.

Willugh. p. 89.

Raj. p. 89.

Cuculus minor. Bellon.

Gesner. p. 306.

Cuculus Lyra species. Schonev. p. 32.

Lyra. Charlet. p. 139.

Capo. P. Jov. c. 16. p. 76. ut videtur.

Gallis *Morrude*.

Belgis *Hunchem*.

Hiliglandis *Sehebanen*.

Anglis *The Red Gurnad* or *Rotchet*.

VIII. *TRIGLA varia, rostro diacantho, aculeis geminis ad utrumque oculum*. Art.

Piscis cuculi, quem grey Gurnad vocant. Charlet. onom. p. 139.

Gornatus seu Gurnardus griseus. Willugh. p. 279.

Raj. p. 88.

Anglis *Cornubiensibus The grey Gurnard*.

IX. *TRIGLA rostro longo diacantho, naribus tubulosis*. Art.

Ἡ λύρα.

Ἡ λύρα. Aristot. l. 4. c. 9. stridula est & grunnit.

? *Capo.* P. Jov. c. 16. p. 76.?

Lyra. Rondel. l. 10. c. 9. p. 298.

Gefner. p. 516. (Germ.) f. 20. b.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 3.

Lyra prior. Rond. Aldrov. l. 2. c. 7. p. 146.

Willugh. p. 282.

Raj. p. 89.

Anglis Cornubiensibus *The Piper.*

Genuensibus *Organie.*

Gallis *Rouget.*

X. *TRIGLA cirris plurimis, corpore octagono.* Art.

Lyra altera. Rond. Aldrov. l. 2. c. 7. p. 147.

Willugh. p. 283.

Raj. p. 89.

Lyra. Salvian. fol. 192. b. ad iconem & 193.

Cornuta sive Lyra altera. Rondel. l. 10. c. 10. p. 299.

Gefner. p. 517. 610. & (Germ.)
fol. 20. b.

Coccyx alter seu major. Bellon.

Romanis *Pesce Capone* & *Pesce Forca.* Salv.

Liguribus & Massiliensibus *Mularmar.*

SCORPÆNA, G. Pisc. 33.

I. *SCORPÆNA pinnulis, ad oculos & nares.* Art.

Ὁ Σκορπίος. Aristot. l. 2. c. 17. & l. 5. c. 9. 10. & l. 8. c. 13.

Ἡ Σκορπίς. Aristot. l. c. femina est.

Σκορπίος. Athen. l. 7. p. 320.

? Oppian. l. 1. p. 7. & l. 2. p. 46.?

• *Scorpius.* Ovid. v. 116. ut videtur.

Rond. Aldrov. l. 2. c. 24. p. 196.

Scorpius & *Scorpis.* Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 14. t. 19. f. 9.

Scorpius minor & *Scorpana.* Willugh. p. 331.

Raj. p. 142.

Scorpena. P. Jov. c. 23. p. 91.

Salvian. fol. 201. ad iconem.

Scorpana. Plin. l. 32. c. 11.?

Salvian. fol. 202.

K 2

Scorpio.

Scorpio. Isidor.

Cub. l. 3. c. 85. fol. 90. a.

Wotton. l. 8. c. 178. f. 158. b.

Scorpio & Scorpæna. Rondel. l. 6. c. 19. p. 201.

Scorpio vel Scorpæna id est Scorpius minor. Gefner. p. 847. (867) 1018.

Scorpius, Scorpæna seu Scorpius minor. Gefner. (Germ.) fol. 45

Scorpidus seu Scorpæna. Charlet. p. 142.

Romanis Scrofanello. Salv.

II. *SCORPÆNA tota rubens, cirris plurimis ad os*. Art.

Scorpius. Salvian. fol. 197. a. ad iconem.

Scorpius simpliciter vel major. Gefner. p. 846. (pro 866.) 10

Scorpius major. Gefner. (Germ.) fol. 44. b.

Willugh. p. 331.

Raj. p. 142.

Scorpio marinus. Salvian. fol. 199. 200.

Scorpio. Charlet. p. 142.

Romanis Scrofanio.

Massiliensibus Scorpæna,

COTTUS, G. Pisc. 34.

I. *COTTUS alepidorus glaber, capite diacantho*. Art. spec. 82.

Βόττος. Aristot. nat. l. 4. c. 8. *Κόττος* in m. f. f. antiq
Biblioth. Vatic.

Cottus. Gaz. arist.

Bellon.

Rondelet. part. 2. p. 202.

Gefner. p. 400. 477.

Aldrov. l. 5. c. 27. (pro 28.) p. 614.

Cottus sine Gobio fluviatilis capitatus. Gefner. (Germ.) f. 162
Capitatus. Auctor.

Cuba l. 3. c. 38. fol. 79. b.

Citus. Salv. fol. 216. sine icone.

Gobio fluviatilis capitatus. Gefner. p. 401. 477.

Willugh. p. 137. tab. H. 3. f.
nova nitida.

Gobio fluviatilis *sive capitatus*. Aldrov. l. 5. c. 28. p. 613.
Gobius fluviatilis *Gesneri*. Raj. p. 76.
Gobius capitatus. Jonston. l. 3. tit. 1. c. 10. p. 2. t. 29. f. 11.
Gobio capitatus. Charlet. p. 157.
Suecis Sten-simpa. *Stén-lake*.
Anglis A Bull-head or *Millers Thumb*.
Gallis Chalot.
Romanis Messore & Capo grosso.

II. *COTTUS scaber*, *tuberibus quatuor corniformibus*, *in medio capite*. Art. spec. 84.
Suecis Horn-Simpa.

III. *COTTUS alepidotus*, *capite polyacantho*, *maxilla superiore paulo longiore*. Art. spec. 86.
Scorpane Bellonii. (Gall.) p. 201. *similis Willugh*. p. 138.
 Raj. p. 145.
 Aldrov. l. 2. c. 27. (pro 25.) p. 201.
 Jonston. t. 18. f. 12.
Scorpio marinus *vel Scorpium nostras*. Schonev. p. 67.
Scorpius marinus. Jonston. t. 47. f. 4. 5.
Suecis Röt-simpa, *Skrabba*, *Skjälvyra*.
Danis & ad fretum danicum Ulk, Ulka.
Belgis Potsboest.
Anglis Cornubiensibus Father-Lasher.

IV. *COTTUS pinna secunda dorfi alba*.
Dracunculus. Rondel. l. 10. c. 12. p. 304.
 Aldrov. l. 2. c. 51. p. 262.
 Jonston. l. 1. tit. 3. c. 3. a. 1. punct. 3. t. 21.
 f. 4. *thaumat*. p. 413.
 Willugh. p. 136.
 Raj. p. 79.
Dracunculus, *aranei species altera*. Gesner. p. 80. 92.
Dracunculus aranei species. Gesner. (Germ.) fol. 43. b.
Exocæti tertium genus. Gesner. p. 16.

V. *COTTUS cirris plurimis*, *corpore octagono*. Art. spec. 87.
Cataphractus. Schonev. p. 30.
 Jonston. l. 2. tit. 1. c. 9. t. 46. f. 5. 6.
 Charlet. on. p. 150.
 Willugh. p. 211.
 Raj. p. 77.
Anglis septentrionalibus d Pogge.

Z E U S, G. Pisc. 35.

I. *ZEUS ventre aculeato, cauda in extremo circinata.* Art.

?Κοτῆς. Athen. l. 7. fol. 164. 14. ed. Valderi.

Ὁ Χάλλεος. Athen. l. 7. fol. 163. 55. ed. Vald.

Oppian. l. 1. fol. 6. 17.

Zeus, idem Faber. Plin. l. 9. c. 18.*Citula siue Sancti Petri piscis.* P. Jov. c. 27. p. 98.*Corvus.* P. Jov. c. 8. p. 61.*Faber siue Zeus* Plin. l. 32. c. 11.*Faber siue Gallus marinus.* Rondel. l. 11. c. 19. p. 328.

Gefner. p. 369. 439.

Willugh. p. 294.

Raj. p. 99.

Faber. Ovid. v. 110.

Columell. l. 8. c. 16.

Wotton. l. 8. c. 181. fol. 160. b.

Salvian. fol. 203. 204. 205.

Gefner. (Germ.) fol. 22. b.

Aldrov. l. 1. c. 25. p. 112.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 18. t. 17. f. 1. 2.

Charlet. p. 136.

*Gallis Doree.**Anglis A Doree.**Hispanis Gal.**Romanis Citula, Pesce san Pietro.**Liguribus, Rotula. Dalmatis Fabro.*II. *ZEUS cauda bifurca.* Art.*Gallus marinus seu Faber Indicus.* Willugh. app. p. 33.*Abucatuxia Brasiliensibus, Peixe Gallo Lusitanis.*

Marcgr. l. 4. c. 11.

Willugh. p. 295.

Raj. p. 99.

Abacatuaja, Lusitanis Peixe. Jonston. l. 4. tit. 2. c. 1. s. 4.

p. 141. t. 37. f. 2.

Ican Kapelle. Ruysch. theatr. p. 16. t. 9. f. 7.III. *ZEUS totus rubens, cauda equali, rostro sursum reflexo.* Art.

?Κόπρος. Aristot. l. 2. c. 13. & l. 4. c. 9.

? Athen. l. 8. p. 331. ? vocem edit.

Aper

Aper. Gaz. arift. l. c.?

Rondel. l. 5. c. 27. p. 161.

Charlet. p. 123.

Gefner. p. 61. 70. & (Germ.) fol. 30. b.

Aldrov. l. 3. c. 12. p. 297.

Jorifton. l. 1. tit. 1. c. 1. a. 4.

Willugh. p. 296.

Raj. p. 99.

Romanis *Riondo*. Genuenfibus *Strivale*.

CHÆTODON, G. Pisc. 36.

I. CHÆTODON *niger*, *maculis flavis*, *lunulatis variis*. Art.*Paru brasíl.* Marcgr.

Raj. p. 102.

II. CHÆTODON *cauda bifurca*, *aculeo in utroque latere ad caudam*. Art.*Acarauna Brásíl.* Marcgr.

Raj. p. 102.

III. CHÆTODON *quadratus*, *spinulis multis ad caput*. Art.*Acarauna quadrata*, *Nantis Retula dicta*. Willugh. p. 217.IV. CHÆTODON *niger*, *capite diacantho*, *lineis utrinque quatuor, transversis, curvis*. Art. spec. 91.*Acarauna exigua nigra*, *zonis aliquot luteis eleganter depicta*.

Lift. app. ad Willugh. p. 23.

Raj. p. 103.

Guarerna Brasíl. Marcgr.

Raj. p. 103.

V. CHÆTODON *lineis longitudinalibus variis*, *cauda bifurca*, *utrinque aculeata*. Art. spec. 89.VI. CHÆTODON *nigrescens*, *cauda albescente aequali*, *utrinque aculeata*. Art. spec. 90.VII. CHÆTODON *aculeis duobus brevibus*, *supra oculos*, *officulo tertio pinnae dorsalis longissimo*. Art. spec. 92.VIII. CHÆTODON *canescens*, *aculeo utrinque ad os*, *officulo tertio pinnae dorsalis setiformi longissimo*. Art. spec. 93.

IX. CHÆ.

IX. *CHÆTODON macrolepidotus*, lineis utrinque duabus nigris,
 officulo quarto pinnae dorsalis setiformi longissimo. Art. spec. 94
 De Tafelfisch. Ruysch. theatr. p. 1. t. 1. f. 1.

X. *CHÆTODON macrolepidotus*, lineis utrinque tribus nigris
 latis, linea quarta in cauda. Art. spec. 95.

GASTEROSTEUS, G. Pisc. 37.

I. *GASTEROSTEUS aculeis in dorso tribus*. Art. spec. 96.

Spinachia. Auctor.

Cub. l. 3. c. 83. fol. 89. b.

Pungitivus. Auctor.

Cub. l. 3. c. 72. fol. 87. a.

Pungitius. Merret.

Pungitius Alberti. Jonston. l. 3. tit. 3. c. 3. p. 146. t. 28. fig. 1
 latere dextro.

Pungitius piscis. Albert.

Aldrov. l. 5. c. 36. p. 628.

Pisciculi aculeati prius genus. Rondel. part. 2. p. 206.

Pisciculus aculeatus: primum genus. Gefner. p. 8. 9.

Pisciculus aculeatus, *Pisciculus pungitivus*, *Spinachia*. Gefner.
 (Germ.) fol. 160. a.

Pisciculus aculeatus. Rondel. Willugh. p. 341.

Raj. p. 145.

Suecis *Skittspigg*. Skirrhär den fjörre.

Anglis a *Steckleback*, *Banslickle* or *Sharpling*.

II. *GASTEROSTEUS aculeis in dorso decem*. Art. spec. 97.

Pisciculi aculeati alterum genus. Rondel. part. 2. p. 206.

Gefner. p. 8. 9.

Pisciculus aculeatus, *Pisciculus pungitivus*, *Spinachia*. Gefner.
 (Germ.) fol. a. (ambobus enim idem nomen tribuit.)

Pisciculus aculeatus minor. Raj. p. 145.

Piscis aculeatus minor. Willugh. p. 342.

Alterum genus Pungitii. Aldrov. l. 5. c. 36. p. 628.

Jonston. tab. 28. fig. a. latere sinistro.

? *Spinarella pusilla*. Bellon ?

? *Aculeatus minor levis* & *glaber*. Schonev. p. 10. 11. ?

Suecis *Skittspigg den mindre*.

Anglis

Acanthopterygii.

Gasterosteus. §1

Anglis *The lesser Stickleback. Banstickle or Shurpling.*

- III. *GASTEROSTEUS aculeis in dorso quindecim.* Art.
Aculeatus vel Pungitius marinus longus. Schonev. p. 10.
Willugh. p. 340.
Raj. p. 145.

Aculeatus marinus major. Schonev. (ad calcem) t. 4. f. 3.
Lift. (in app. Willugh.) p. 23.
Jonston. t. 47. f. 1.

Germanis ad finem Chiloniensium *Steinbicker.*
Hilliglandis *Erffkraper.*

O R D O III.
B R A N C H I O S T E G I.

B A L I S T E S, G. Pisc. 38.

- I. *BALISTES aculeis dorfi tribus, cauda bifurca.* Art.
Guaperua, Marcgr. l. 4. c. 12.
Jonston. t. 34. f. 2.
- II. *BALISTES aculeis dorfi duobus, cauda quadrata.* Art.
Guaperua longa, cauda fere quadrata & minime forcipata, ca-
pitis vertice latiusculo. List. app. Willugh. p. 21.
- III. *BALISTES cauda bifurca, pinna dorfi maculosa.* Art.
Guaperua lata, cauda forcipata, pinna dorsali maculis quibus-
dam distincta. List. app. Willugh. p. 21.
- IV. *BALISTES lineis striatis, cauda bifurca.* Art.
Guaperua lata ad caudam striata. List. app. Willugh. p. 21.
- V. *BALISTES aculeis quinque in utroque latere.* Art.
Guaperua Histrix. List. app. Willugh. p. 21.
- VI. *BALISTES aculeis binis loco pinnarum ventralium & sol-
tario infra anum.*
Scolopax. Rondel. l. 15. c. 5. p. 422.
Aldrov. l. 3. c. 13. p. 298.
Willugh. p. 160.
Raj. p. 50.
Gefner. p. 838. vel potius 858. 1008. & (Germ.)
fol. 4. a.
Jonston. l. 1. tit. I. c. 1. a. 4. t. 1. n. 9.
Charlet. onom. p. 123.
? Serra. Plinii, secundum Gefnerum.
Genuensibus Trombetta id est Tuba.
Romanis Soffietta id est Follis ob similitudinem.

OSTRACION, G. Pisc. 39.

I. *OSTRACION sphaericus tetraodon, aculeis undique exiguis.*

Art.

Orbis. Plin. l. 32. c. 2. 11.

Bellon.

Rondeletii l. 15. c. 2. p. 419.

Isidor. hisp. l. 12. c. 6.

Salvian. fol. 208. b. ad iconem & 209.

Gefner. (Germ.) fol. 83. b.

Jonston. l. 2. tit. 2. c. 5. t. 24. n. 9.

Orbis primus. Rondel. l. 15. c. 2. p. 419.

Willugh. p. 143.

Raj. p. 43.

Orbis vulgaris. Charlet. onom. p. 154.*Orbis species ex gefnero*. Aldrov. l. 4. c. 15. p. 554.*Orbis vel Orchis*. Gefner. p. 631. 744.Venetis *Pesce Columbo*.II. *OSTRACION oblongus quadrangulus gibbosus*. Art.*Ostracion alter*. Aldrov. l. 4. c. 19. p. 561.

Jonston. t. 25. n. 7.

Ostracion alter gibbosus. Aldr. Lister. apud. Willugh. p. 156.

Raj. p. 44.

Piscis quadrangularis gibbosus. List. apud Willugh. 20.

Raj. p. 44.

III. *OSTRACION subrotundus, aculeis undique, densis basi tri-*
queris. Art.*Orbis echinatus sine muricatus*. Rondel. l. 15. c. 4. p. 421.

Gefner. p. 632. 745. & (Germ.)

fol. 84. b.

Aldrov. l. 4. c. 17. p. 556.

Jonston. t. 24. n. 10.

Willugh. p. 144.

Raj. p. 43.

Orbis echinatus & muricatus. Charlet. p. 154.? *Orbis muricatus*. Clus. exot. l. 6. c. 23.

Willugh. p. 144.

IV. *OSTRACION carbetoplateus subrotundus inermis asper, pin-*
nis pectoralibus horizontalibus, foraminibus quatuor in ca-
pite. Art.? *Orthragoriscus*. Plin. l. 32. c. 2. 11.?

Gefner. p. 635.

Orthragoriscus fuit Luna piscis. Rondel. l. 15. c. 7. p. 424.
Gefner. p. 640. & (Germ.) fol. 85.

Mola. Salvian. fol. 155. & 154. a. ad iconem.

Jonston. thaum. p. 419. 420.

Rondeletii. Aldrov. l. 3. c. 44. p. 412.

Charlet. p. 129.

Willugh. p. 151.

Raj. p. 51.

Mola salviani seu Orthragoriscus Rondeletii. Jonston. l. 1. tit. 1.
c. 3. a. 2. punct. 8. t. 9. f. 2.

Anglis *The Sun-fish.*

V. *OSTRACION oblongus, teres aculeatus, osse scutiformi in pectore, tuberculis rotundis.*

Orbis scutatus. Rondel. l. 15. c. 3. p. 420.

Gefner. p. 632. 745. & (Germ.) fol. 84. b.

Aldrov. l. 4. c. 16. p. 556.

Jonston. t. 25. n. 5.

Willugh. p. 144.

Raj. p. 43.

Orbis scutatus sue scutifer. Charlet. p. 154.

VI. *OSTRACION oblongo-quadrangulus, tuberculis quatuor majoribus in dorso.* Art.

Piscis maximus quadrangularis i. e. dorso plano. Raj. p. 45.

Piscis maximus quadrangularis, quatuor tuberculis in dorso, non longe a capite, insignitus. Willugh. p. 20.

α. *Ostracion prior.* Aldrov. l. 4. c. 19. p. 560.

Jonston. t. 25. n. 6.

Willugh. p. 148.

Raj. p. 44.

Ostracion nili. Gefner. (Germ.) fol. 177. a.

Ostracion nili, quem Bellonius Holosteum appellat.

Gefner. p. 642. 757.

Willugh. p. 148.

Holosteum bellonii sue Ostracion gesneri. Aldrov. l. 4. c. 19.
p. 559.

Jonston. l. 2. tit. 2.

c. 7. t. 25. f. 8.

Holosteus bellonii seu Ostracion gesneri. Charlet p. 154.

OBS. *Piscis* α a praedicta specie vix diversus videtur.

VII. *OSTRACION oblongo-quadrangulus, rostro acuto, maculis in dorso ac capite.* Art.

Piscis majusculus quadrangularis rostratus. List. app. Will. p. 20.

Raj. p. 45.

α. *Ostrac*

α. *Ostracion tertius rostratus*. List. apud Will. p. 156.
Raj. p. 44.

OBS. α videtur forte esse idem piscis.

VIII. *OSTRACION quadrangulus, maculis variis plurimis*. Art.
Piscis mediocris quadrangularis maculosus. List. app. Will. p. 20.
Raj. p. 45.

IX. *OSTRACION triangulatus, duobus aculeis in fronte & totidem in imo ventre*. Art.
Piscis triangularis clusii cornutus. Raj. p. 44.

X. *OSTRACION triangulatus, aculeis duobus in capite & unico longiore superne ad caudam*.
Piscis triangularis capite cornutus, cui e media cauda cutacea aculeus longus erigitur. List. app. Will. p. 19.
Raj. p. 44.

XI. *OSTRACION triangulatus, limbis figuram hexagonam eminentibus, aculeis duobus in imo ventre*. Art.
Piscis triangularis clusii, cornibus carens. Willugh. p. 156.
Raj. p. 44.

XII. *OSTRACION triangulatus totus maculosus ac tuberculatus, aculeis duobus in imo ventre*. Art.
Piscis mediocris triangularis, ad imum ventrem prope caudam tantum cornutus, ex toto maculis aequalibus subrufis dense insignitus. List. app. Willugh. p. 20.
Raj. p. 44.

XIII. *OSTRACION triangulatus, tuberculis hexagonis radiatis, aculeis duobus in imo ventre*. Art.
Piscis triangularis parvus non nisi imo ventre cornutus. List. app. Will. p. 20.
Raj. p. 45.

XIV. *OSTRACION triangulatus, tuberculis exiguis innumeris, aculeis carens*. Art.
Piscis triangularis ex toto cornibus carens. List. app. Willugh. p. 20.
Raj. p. 4. 5.

XV. *OSTRACION maculosus, aculeis undique densis exiguis*. Art.
Orbis asper maculosus. Willugh. p. 155.
Raj. p. 43.

- XVI. *OSTRACION cathetoplateo-oblongus, ventre tantum aculeatus & subrotunda.* Art.
Orbis cauda productiore, dorso laevi, ventre spinoso. Willugh.
 p. 44.
Orbis lagocephalus. Grew. mus.
 Raj. p. 43.
- XVII. *OSTRACION bidens sphaericus, aculeis undique densis triquetris.* Art.
Atinga alter minor orbicularis. Willugh. p. 155.
 Raj. p. 42.
- XVIII. *OSTRACION subrotundus; aculeis brevibus planis, ventri glabro.*
Orbis muricatus ranae rictu, Guamajaca atinga.
 Marcgr. l. 4. c. 14.
 Willugh. p. 145. 155.
Orbis spinosus. Clus. exot. l. 6. c. 22.
 Raj. p. 42.
- XIX. *OSTRACION subrotundus, aculeis undique brevibus triquetris variis.* Art.
Orbis muricatus & reticulatus. Willugh. p. 155.
 Raj. p. 42.
- XX. *OSTRACION rotundo-oblongus, tuberculis utrinque, pinnae dorso longissima.*
Orbis ranae rictu. Clus. exot. l. 6. c. 25.
 Raj. p. 43.
- XXI. *OSTRACION conico-oblongus, aculeis undique longis teretiformibus imprimis in lateribus.*
Hystrix piscis. Clus. exot. l. 6. c. 21.
 Raj. p. 42.
- XXII. *OSTRACION oblongus bobocanthus, aculeis longissimis teretiformibus in capite imprimis & collo.* Art.
Hystrix alter, capite angusto subrotundo & admodum spinoso, scilicet spinis praelongis in ipso capite & scapulis donatus.
 Willugh. p. 155.
 Raj. p. 42.
- XXIII. *OSTRACION oblongus glaber, capite longo, corpore figuris variis ornato.* Art.
Orbis oblongus, testudinis capite. Clus. exot. l. 6. c. 26.
 Willugh. p. 147.
 Raj. p. 43.

?Orbis

Branchioflegi.

Cyclopterus. 87

? *Orbis levis oblongus cinereis & fuscis maculis notatus.* Sloan.
hist. 2.

CYCLOPTERUS, G. Pisc. 40.

I. CYCLOPTERUS. Art.

Lumpus anglorum. Turner. epist. ad Gefner.

Gefner. paral. p. 25. v. 1284.

Aldrov. l. 3. c. 68. p. 479.

Jonston, l. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 12.

p. 42. t. 13. f. 1.

Charlet, p. 131.

Willugh. p. 208.

Raj. p. 77.

Lumpus anglorum piscis. Schelham. anat. Xiph. p. 20.

Orbis britannici sive Oceani species. Gefner. (Germ.) fol. 85.

Lepus marinus nostras, Orbis species. Schonev. p. 41.

Succis Sjurbygg-fisk.

Hilliglandis Hasspodde.

Belgis Snottolff.

Scotis Cock-padd.

Anglis The Lump or Sea-owl.

LOPHIUS, G. Pisc. 41.

I. LOPHIUS ore cirroso.

Ὁ ἀλίας βάτον. Aristot. l. 9. c. 37. & l. 2. c. 13. & l. 5.
c. 5. partib. anim. l. 4. c. 14.

Βάτραχος, ἀλίας. Aristot. l. 9. c. 37.

Βάτραχος ἀλιεύς. Ælian. l. 9. c. 24. & l. 13. c. 1. 5.

Βάτραχος. Athen. l. 7. p. 286.

Oppian. l. 2. p. 33.

Rana. Ovid. v. 126. ut videtur.

Plin. l. 9. c. 24. & l. 25. c. 10.

Rana marina. Cicer. l. 2. nat. deor. 186.

Jonston, l. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 9. p. 36. t. 11. f. 8.

Rana

Rana piscatrix. Bellon.

Rondel. l. 12. c. 20. p. 363.

Salvian. fol. 139. b. 140. 141.

Gefner. p. 813. 816.

Charlet. p. 130. mantiss. anat. p. 201. icon.
elegans.

Willugh. p. 85. 86. 87. 88.

Raj. p. 29.

Rana piscatrix sine marina. Gefner. (Germ.) fol. 64. a. b.

Rana piscatrix vel marina. Schonev. p. 59.

Rana piscatrix vulgaris. Aldrov. l. 3. c. 64. p. 466.

Anglis *The Toad-fish or Frog-fish or Sea-divel.*

Italix *Martino Pescatore.* Salv.

II. *LOPHIUS fronte unicorni.*

Guncucuja brasili. Marcgr.

Raj. p. 30.

ORDO IV.

CHONDROPTERYGII

PETROMYZON, G. Pisc. 42.

I. PETROMYZON unico ordine denticulorum minimorum in limbo oris præter inferiores majores. Art. spec. 99.

α. Lampetra parva & *fluviatilis*. Rondel. part. 2. p. 202.

Gesner. p. 598. 706.

Willugh. p. 104.

Raj. p. 35.

Lampetra fluviatilis gesneri. Aldrov. l. 5. c. 9. p. 581.

Jonston. l. 2. t. 28. f. 10.

Schonev. p. 41.

Charlet. p. 159.

Lampetra subcinerea, maculis carens. Salvian. fol. 63. a.

Lampetra minor. Salvian. fol. 63. b.

Lampetra minima. Aldrov. l. 4. c. 13. p. 539. ? an. speciei
2dæ tenellus

Lampetra fluviatilis minor. Roberg. pisc. p. 2.

β. Mustela. Plin. l. 9. c. 17.

Ambros. hexam. 5. c. 2.

Cub. l. 3. c. 56 fol. 83. b. 84 a.

Mustela fluviatilis minor. Bellon.

Mustella. Auson. mosell. v. 107.

C. Figul. fol. 5. b.

Salvian. fol. 62. b. ad iconem.

Exormistos. Cassidor. regni litoris desit.

Murena. Alb. anim. l. 24.

γ. Alterum genus Lampredæ. Gesner. p. 597.

Alterum genus Lampredæ minus. Gesner. paralip. p. 23.

Genus Lampredæ alterum. Gesner. (Germ.) fol. 181. a.

Artedi Synonymia.

M

Lam-

Lampetra medium genus germanis & belgis Prick seu Brick dictum. Willugh. p. 106.

Raj p. 35.

Lampreda minor vel *Enneopthalmus major*. Kentman, apud Gefner. paralip. p. 23.

Pryck. Salvian. fol. 63. a. b.

Pricka. Aldrov. l. 4. c. 13. p. 540.

Jonston. l. 2. t. 24. f. 6.

? *Lampreta media*. Schwenkf. pisc. Glef.

A Lampern and Pride of the Ifs. Plot. hist. nat.

Suecis Nätting. Neunögen.

Germanis Neunangen.

Anglis a *Lampern*.

OBS. Synonyma β obscura sunt & melius discutienda & γ ad hanc speciem etiam pertinere putat author.

II, *PETROMYZON maculosus*, ordinibus dentium circiter viginti. Art.

Lampetra. P. Jov. c. 34. p. 109.

Rondel. l. 14. c. 3. p. 398.

Charlet. p. 153.

Willugh. p. 105.

Raj. p. 35.

Lampreta. Gefner. (Germ) fol. 180. b.

Lampreda Kentmanni. Gefner. paralip. p. 23.

Lampreda murina. Gefner. paralip. p. 23.

Lampetra maculosa & *bicubitalis*. Salvian. fol. 63. a.

Lampetra major. Salvian. fol. 63. b.

Aldrov. l. 4. c. 13. p. 549.

Jonston. l. 2. tit. 2. c. 3. t. 24. f. 5.

Musfela siue *Lampetra*. Bellon.

Gefner. p. 590.

Italies *Lampreda*.

Anglis a *Lamprey* or *Lamprey Eel*.

OBS. Videtur esse $\epsilon\chi\epsilon\upsilon\epsilon\iota\varsigma$ Oppian. l. 1. p. 9.

Species 2da dicitur $\Gamma\alpha\lambda\epsilon\zeta\iota\alpha$ Galen. class. 2. fol. 30. b. ut pluribus probat Salvianus; illam romæ vidit Galenus, reliqui vero græci præter Durionem ($\mu\acute{\upsilon}\rho\alpha\iota\nu\alpha\ \pi\omicron\tau\alpha\mu\iota\alpha$ Dionis Asben. l. 7. c. 312.) hunc piscem ignorarunt, qui non invenitur in mari græco secundum Galenum.

III. *PETROMYZON* corpore annuloso, appendicibus utrinque duobus in margine oris.

? *Lampetra minima* canosa. Schwenckfeld. pisc. Glef.

Lampetra cæca seu oculis carens, argentine ein blinder Neunögen i. e. *Enneopthalmus cæcus*. Willugh. p. 107.

Lampetra cæca seu oculis carens. Raj. syn. 36.

ACIPENSER, G. Pisc. 43.

L ACIPENSER corpore tuberculis spinosis exasperato. Art.

α. Ούίσκος. Durionis apud Athen. l. 7. p. 315. ut videtur,

Ἀκκισπήσιος. Athen. l. 7. p. 294.

Acipenser. Plaut. comed. fab. in baccharia.

Nigid. Figul. l. 4. de animal.

Cicer. de fato & finib. l. 2. p. 69. tuscul. quæst. l. 3.

Luculii.

Martialis.

Ovid. v. 132.

Plin. l. 9. c. 17. & l. 32. c. 11.

Macrob. l. 3. saturnal. c. 16.

Cub. l. 3. c. 1. f. 71. a.

Wotton. l. 8. c. 171. fol. 154.

Bellon.

Rondel. l. 14. c. 9. p. 410.

Gesner. p. 2.

Schonev. p. 9.

Acipenser, Aquipenser, Sturio. Gesner. (Germ.) fol. 184. b.

Accipenser, Sturio, Merreth.

Sturio. Albert.

Auctor.

Cub. l. 3. c. 88. fol. 90. b. 91. a.

P. Jov. c. 4. p. 18.

C. Figul. fol. 5. a.

Aldrov l. 4. c. 9. p. 517. & c. 526.

Jonston. fl. '2. tit. 1. c. 7. p. 106. t. 23. f. 8. 9.

thaumat. 426.

Charlet. p. 152.

Willugh. p. 239.

Raj. p. 112.

Sturio primus. Gesner. p. 6.

Sturio sine Silurus, Salvian. fol. 113.

Silurus, Salvian. fol. 112. b. ad iconem.

Galeus rhodius. Athen. secund. Schonev.

Sus. Ilidor. Or. l. 12. c. 6.

Succis Stör. Danis Store.

Anglis The Sturgeon.

Italix Sturione.

β . Ὁ ἔλωψ. Aristot. l. 2. c. 13. 15.

ἔλωψ. Ælian. l. 8. c. 28.

Athen. l. 7. p. 300.

Helops. Ovid. v. 96.

Elops. Plin. l. 9. c. 17. 54.

Rondel. l. 15. c. 12. p. 430.

Gesner. p. 360.

Obs. *Helops* (β) idem cum priore (α) piscis esse videtur
quod & *Plinius* l. 9. c. 17. confirmat.

II. *ACIPENSER tuberculis carens*. Art.

α . *Mario*. Plin. l. 9. c. 15. ut videtur.

Huso. Gesner. (Germ.) fol. 186.

Aldrov. l. 4. c. 11. p. 534.

Jonston. l. 2. tit. 2. c. 1. t. 25. f. 1. 2. 3. & thau-
mat. p. 416.

Charlet. p. 153.

Huso germanorum. Gesner. p. 59.

Willugh. p. 243.

Raj. p. 113.

Exos piscis & *Ichthyocolla*. Rondel. part. 2. p. 177.

Gesner. p. 50.

Italica *Copio* & *Colpesce*.

β . *Exos sine Ichthyocolla*. Gesner. (Germ.) fol. 186.

Ichthyocolla. Plin. l. 32. c. 7.

Bellon.

Rond. Aldrov. l. 5. c. 4. p. 566.

Jonston. l. 3. tit. 2. c. 3.

Willugh. p. 244.

Raj. p. 114.

Ichthyocolla. Charlet. p. 199.

Germanica *Husen*.

γ . Ἀντακῆϊος. Ælian. l. 14. c. 23. 26.

Strabon.

Antaceus Borysthenis. Rondel. part. 2. p. 187.

Gesner. p. 50. & (Germ.) fol. 185.

Antaceus Borysthenis. Jonston. l. 3. tit. 2. c. 2. t. 25. f. 4.

Antaceus Borysthenis Rondelerii. Charlet. p. 158.

Obs. cum *Pisce* α & β descripto, *Antaceus* γ etiam specie
convenire videtur.

SQUALUS, G. Pisc. 44.

SQUALUS rostro longo cuspidato osseo plano utrinque dentato.

Ὁ Πείσης. Aristot. l. 6. c. 12.

Athen. l. 8. p. 333.

Oppian. l. 1. p. 14.

Πείσης. Ælian. l. 9. c. 49.

Pristis. Plin. l. 9. c. 3. 4. & l. 32. c. 11.

Albert.

Cub. l. 3. c. 68. fol. 86. b.

Gesner. p. 729.

Jonston. l. 5. c. 2. a. 3. p. 217.

Pristis, Serra. Charlet. p. 168.

Pristis siue Serra. Rond. Aldrov. l. de Cetis. c. 5. p. 693.

Pristis siue Serra piscis. Clus. exot. l. 6. c. 9.

Willugh. p. 61.

Raj. p. 23.

Pristes. Gaz. arist. l. c.

Rondelet. l. 16. c. 15. p. 487.

Serra. Ambros. hexam. l. 5. c. 10. p. 59.

Isidor

Auctor.

Cub. l. 3. c. 81. fol. 89. a.

Serra marina. Bellon.

Gesner. p. 730.

Serra siue *Pristis*. Aldrov. l. de Cetis c. 5. p. 696.

Suecis Säg-fisk.

Anglis The Saw-fish.

SQUALUS dentibus obtusis seu granulosis. Art.

α. Γαλέος λεῖος. Aristot. l. 6. c. 10.

Athen. l. 7. p. 294.

Oppian. l. 1. fol. 113. 4.

Galeus laevis. Bellon.

Rondel. l. 13. c. 3. p. 375.

Gesner. p. 608. 613. 717. & (Germ.) fol. 77. a.

Charlet. p. 128.

Galei laevis species ex Gesnero. Aldrov. l. 3. c. 35. p. 392.

Mustelus laevis. Salvian. fol. 135. b. 137. a.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 2. punct. 3.

M 3

Muste-

Mustelus laevis primus. Willugh. p. 60.

Raj. p. 22.

Anglis. *The Smooth or Unprickly Hound.*

β. Ὁ Ἀσπερίας. Aristot. l. 5. c. 10. & l. 6. c. 11.

Γαλέος ἀσπείρας. Oppian. l. 1. fol. 113. 5.

Athen. l. 7. f. 147. 36. ed. Valderi.

Galeus stellarus. Gaz. arist. l. c.

Bellon.

Gesner. p. 613.

Galeus asterias. Rondel. l. 13. c. 4. p. 376.

Aldrov. l. 3. c. 36. p. 393.

Willugh. p. 61

Galeus asterias sive stellaris. Charlet. p. 128.

Galeus asterias, id est stellarus vel varius. Gesner. p. 608. 717.

Galeus stellarus seu asterias. Gesner. (Germ.) fol. 77. b. 78. a.

Mustelus stellaris sive varius. Salvian. fol. 138. b.

Mustelus asterias. Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 2. punct. 2. t. 8. f. 1.

OBS. *Galeus asterias* β varietas præcedentis solummodo videtur. Sequentia synonyma in appendice locavit author, æ certæ alicui speciei adscripsit. an hujus Speciei?

Ὁ γαλέος. Aristot. l. 2. c. 17. & l. 3. c. 1. & l. 5. c. 5.

Ælian. l. 1. c. 55. p. 59. & l. 2. c. 55. p. 132. & l.

9. c. 65. p. 570.

Oppian. l. 1. p. 15.

? *Squalus.* Ovid. v. 123.?

? Plin. l. 9. c. 24. 51.?

Mustelus. Gaz. aristot.

Appendices pylori multas habet. Cartilagineus;

III. *SQUALUS pinna ani nulla, corpore subrotundo.* Art. spec. 100

Ὁ ἀκανθίας γαλέος. Aristot. l. 6. c. 10. & l. 9. c. 37.

Athen. l. 7. p. 294.

Oppian. l. 1. fol. 113. 3. ed. lippil

Galeus acanthias. Rondel. l. 13. c. 2. p. 373.

Gesner. p. 607. 716.

Charlet. p. 128.

Galeus acanthias. Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 2. punct. 4. t. 8. f. 5.

Galeus acanthias sive Spinax. Aldrov. l. 3. c. 40. p. 399.

Willugh. p. 56.

Raj. p. 21.

Mustellus spinax. Gaz. arist. l. c.

Mustellus spinax. Bellon.

Salvian. fol. 135. b. ad iconem 136.

Gesner. p. 612.

Mustelus

Mustelus spinus. Scaliger.
Canis acanthius, *Gaza Spinax*. Schonev. p. 29.
Dornhundt. Gefner. (Germ.) fol. 77. a.
Venetis Azio. Romanis quibusdam *Scazone*. Salv.
Anglis A picked dog or *Hound-fish*.

- IV. *SQUALUS pinna ani carens, navibus in extremo rostro*. Art.
Galeus acanthias seu spinax fuscus. Willugh. p. 57.
Raj. p. 21.

Genuensibus Sugree.

- V. *SQUALUS pinna ani carens, ambitu corporis triangulato*. Art.
Κετρίνη. *Ælian*. l. 1. c. 55. p. 59. & l. 11. c. 8.
Κετρίνη. *Athen*. l. 7. p. 294.
Oppian. l. 1. p. 15. & l. 3. c. . . .
Centrina. *Rondel*. l. 13. c. 9. p. 384.
Salvian. fol. 156. b. 157. 158.
Gefner. p. 609.
Aldrov. l. 3. c. 41. p. 401. &c.
Centrine. *Jonston*. l. 1. tit. 3. a. 2. punct. 6. t. 7. f. 4. 5.
Willugh. p. 58.
Raj. p. 21.
Galeus Centrina. *Gefner*. (Germ.) 78. b. 79. a.
Vulpecula. *Bellon*.
Gefner. p. 613.
Italia. *Pesce Porco*.

- VI. *SQUALUS pinna ani carens, ore in apice capitis*. Art.
Η Πύνη. *Aristot*. l. 2. c. 15. & l. 5. c. 5. 10. 11. & l. 6. c. 10. 11.
& l. 9. c. 37. & part. l. 4. c. 12.
Athen. l. 7. p. 319.
Oppian. l. 1. p. 15.
Rhina, quæ Squatus. *Plin*. l. 32. c. 11.
Squatus. *Isidor*. l. 12. c. 6.
Squatina. *Plin*. l. 9. c. 12. 24. 42. 51. & l. 32. c. 9.
Auctor.
Cub. l. 3. c. . . fol. 89. b.
Gaz. arist. l. c. . .
P. Jov. c. 29. p. 101.
Bellon.
Rondel. l. 12. c. 21. p. 367.
Salvian. fol. 151. a. 152.
Gefner. p. 899.
Aldrov. l. 3. c. 66. p. 472.
Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 10. t. 11. f. 7.
Charlet. p. 131.

Squa-

Squatina: græcis Πύνη. Willugh. p. 79;

Raj. p. 26.

Squatina seu Angelus marinus. Gefner. (Germ.) fol. 65. b.

Squamis. Albert. ut videtur.

Cyb. l. 3. c. 86. fol. 90. b.

Genuenſibus Peſce Angelo.

Anglis *The Monk* or *Angel-fish.*

VII. *SQUALUS capite latissimo transverso mallei instar.* Art.

Ἡ Ζύγαινα. Aristot. l. 2. c. 15.

Ζύγαννα. Ælian. l. 9. c. 49.

Oppian. l. 1. p. 14.

Zygæna. Bellon.

Rondel. l. 13. c. 11. p. 385.

Gefner. p. 1050. 1255. & (Germ.) fol. 82. b.

Aldrov. l. 3. c. 43. p. 408.

Jonſton. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 8. punct. 7. t. 7. f. 1.

Charlet. p. 128.

Willugh. p. 55.

Raj. p. 20.

Zigena. Ambros. hexam. l. 5. c. 10. p. 59.

Libella. Gaz.

Salvian. fol. 128. b. 129.

Romanis *Ciambetta.* Salv.

Anglis *The Balance-fish.*

VIII. *SQUALUS cauda longiore quam ipsum corpus.*

Ἡ ἀλώπηξ. Aristot. l. 6. c. 10. 11. & l. 9. c. 37.

Ἀλώπηξ. Oppian. l. 2. p. 59.

Ἀλωπεκίας. Athen. l. 7. p. 294.

Θαλάττια ἀλώπηξ. Ælian. l. 9. c. 12. p. 522.

Vulpes marina. Plin l. 2. p. 59.

Cyb. l. 3. p. 101. fol. 93. b.

Gefner. p. 1045. 1248.

Willugh. p. 54.

Raj. p. 50.

Vulpes galeus. Gefner. (Germ.) fol. 79. b.

Vulpes. Rondel. l. 13. c. 10. p. 387.

Vulpecula. Salvian. fol. 130. ad iconem 134.

Vulpecula marina. Aldrov. l. 3. c. 39. p. 396.

Jonſton. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 2. p. 5. t. 7. f.

Charlet. p. 128.

Simia marina. Bellon.

Gefner. p. 1045.

Anglis *The Sea fox* or *Ape.*

IX. *SQUALUS* *navibus ori vicinis; foraminibus exiguis ad oculos.* Art.

Γαλεός Κύων. Aristot. l. 6. c. 11.

Oppian. l. 44. fol. 44. ed. Lipp. & 40. in græc.

Canicula. Plin. l. 9. c. 46. & l. 32. c. 11.*Galeus canis*. Rondel. l. 13. c. 5. p. 377.*Galeus canis vel Canicula plinii*. Gefner. p. 167. 197. & (Germ.) fol. 80. a.*Canis galeus*. Salvian. fol. 130. ad iconem & 132. 133.

Willugh. p. 51.

Raj. p. 20.

Canis galeus vulgaris. Aldrov. l. 3. c. 33. p. 388.

Jonston. t. 8. f. 4.

Anglis Cornubiensibus *A Tope*.Masilienibus *Pal. Romanis Lamiola vel Canosa*.X. *SQUALUS* *ex rufo varius, pinna ani medio inter anum & caudam pinnatam.* Art.

? Σκυλίον. Aristot. l. 6. c. 10. 11.

Σκυμνος. Athen. l. 7. p. 294.

Oppian. l. 1. fol. 113. 4.

Canicula aristotelis. Rondel. l. 13. c. 7. p. 380.

Gefner. p. 168.

Canicula, secunda species siue Aristotelis. Gefner. (Germ.) fol. 80. a.*Catulus major*. Salvian. fol. 137. b. ad iconem.

Aldrov. l. 3. c. 34. p. 390.

Jonston. t. 8. f. 1.

Catulus major vulgaris. Willugh. p. 62.*Catulus major vulgaris & salviani*. Raj. p. 22.Romanis *Scorzone*. Venetis *Pesce Gatto*.Anglis cornub. *à Bounce*.XI. *SQUALUS* *dorso vario, pinnis ventralibus concretis.* Art.*Catulus*. Salvian. fol. 137. b. ad iconem.*Catulus minor*. Salvian. fol. 138. a. l. 32. & 138. b. l. 8. 13. & 29.

Aldrov. l. 3. c. 34. p. 390.

Willugh. p. 64.

Catulus minor vulgaris. Raj. p. 22.*Musculus stellaris tertius*. Bellon.Romanis *Pesce Gatto*. Salv.Anglis cornub. *The-Rough-boud or Morgay*.XII. *SQUALUS* *cinereus; pinnis ventralibus discretis.* Art.? *Canicula saxatilis*. Rondel. l. 13. c. b. p. 383.Artedi *Synonymia*.

N

Gefner.

Gefner. p. 169. 199. & (Germ.) fol. 80. b
Willugh. p. 63.

Catulus maximus. Willugh. p. 63.

Raj. p. 22.

? *Musielus stellaris primus.* Bellon.

Gefner. p. 723.

XIII. *SQUALUS* fossula triangulari in extremo dorso, forāmini-
bus nullis ad oculos, Art.

Γλαῦκος. Ælian. l. 1. c. 16. p. 22.

Galeus glaucus. Rondel. l. 13. c. 6. p. 378.

Gefner. p. 609. 718. & (Germ.) fol. 78. b

Aldrov. l. 3. c. 37. p. 394.

Jonston. t. 8. f. 9.

Willugh. p. 49.

Raj. p. 20.

Glaucus. Charlet. p. 128.

Anglis *The Blew Shark.*

XIV. *SQUALUS* dorso plano, dentibus plurimis ad latera ferra-
tis, Art.

Ἡ λαμία. Aristot. l. 5. c. 5. & l. 9. c. 37.

Δόμνη. Oppian. l. 1. p. 14.

Καρχαρία. Athen. l. 7. p. 306. 310.

? Κῶων θαλασσία. Ælian. l. 1. c. 17.

Lamia. Plin. l. 9. c. 24.

Gaz. arift.

Rondel. l. 13. c. 12. p. 390.

Gefner. (Germ.) fol. 82. a.

Canis carcharias seu *Lamia.* Gefner. p. 173. 264.

Willugh. p. 47.

Raj. p. 18.

Canis carcharia. Gefner. (Germ.) fol. 81. a.

Canis carcharias. Aldrov. l. 3. c. 32. p. 383.

Charlet. p. 127.

? *Canis carcharias alius.* Aldrov. l. 3. c. 33. p. 388.

Canis aristotelis seu *Carcharias.* Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 2.
punct. 1. t. 6. f. 4. 6.

Tibur. Rondel. l. 16. c. 16. p. 489.

Gefner. p. 213.

Tiburone. Marcgr. l. 4. c.

Nieremb. l. 12. c. 20.

Jonston. l. 4. tit. 2. c. 3. p. 208.

Tiburonus recentiorum. Raj. p. 18.

Suecis *Haj.* Piscis *Jonæ.*

Anglis *The white Shark.*

RAJA,

R A J A, G. Pisc. 45.

I. *RAJA oblonga*, unico tantum aculeorum ordine in medio dorso.

Art.

Ὁ Πινόβατος. Aristot. l. 6. c. 11.

Squatino Raja. Gaz. arist. l. c.

Aldrov. l. 3. c. 67. p. 475. 477. 478.

Charlet. p. 131.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 11.

Squato-Raja seu Rhinobatos. Bellon.

Salvian.

Gefner. p. 903.

Rhinobatis seu Squat-Raja. P. Jov. c. 29. p. 101.*Rhinobatus seu Squato-Raja*. Gefner. (Germ.) fol. 66. b.*Rhinobatus seu Squatino-Raja*. Willugh. p. 79.

Raj p. 28.

Rhinobatus seu Squat-Raja. Salvian. fol. 153. b.*Rhinobatos*. Rondel. l. 12. c. 22. p. 370.II. *RAJA aculeata dentibus tuberculosis, cartilagine transversa in ventre*. Art spec. 103.α. *Raja clavata*. Rondel. l. 12. c. 13. p. 353.

Aldrov. l. 3. c. 57. p. 460.

Gefner. p. 795. & (Germ.) fol. 71. a.

Schonev. p. 58.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 7. t. 11. f. 2.

Charlet. p. 130.

Willugh. p. 74.

Raj. p. 26.

Raja. Bellon.*Raja proprie dicta Bellon*. Gefner. p. 798.Anglis *The Thornback & Maids*.β. *Altera species Raja clavata*. Rondel. l. 12. c. 14. p. 354.

Gefner. p. 795. 936.

Raja clavata altera. Gefner. (Germ.) fol. 71. a.*Raja clavata rondeletii altera*. Aldrov. l. 3. c. 58. p. 461.

Jonston. t. 11. f. 3.

Raja clavata altera species. Rond. Willugh. p. 78.

Raj. p. 26.

N 2

III. *RAJA*

III. *RAJA corpore glabro, aculeo longo anterieus serrato in cauda apterygia.* Art.

Ὁ Τεαγγών. Aristotel. l. 1. c. 5. & l. 5. c. 3. 5. & l. 6. c. 10. 11. & l. 8. c. 13. & l. 9. c. 37. & part. anim. l. 4. c. 12.

Τεσυγών. Aelian. l. 1. c. 37. 56. & l. 2. c. 36. 50. & l. 8. c. 26. & l. 7. c. 8.

Athen. l. 7. p. 330. & circa finem.

Oppian. l. 1. p. 5. & l. 2. p. 46. 47. 48.

Pastinaca. Rondel. l. 12. c. 1. p. 331.

Salvian. fol. 144. 145.

Pastinaca marina. Gefner. p. 679. & (Germ.) p. 63. a.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 2. t. 9. f. 7.

Pastinaca marina nostra. Aldrov. l. 3. c. 46. p. 426.

Pastinaca marina Oxyrinchos. Schonev. p. 58.

Pastinaca marina prima. Rondel. Willugh. p. 67.

Pastinaca marina laevis. Bellon.

Raj. p. 24.

Pastinaca & *Turtur* & *Trigon*, hodie *Brucceus dicta*. P. Jov. c. 29. p. 101.

Anglis *The Fire-Flaire*.

Romanis *Brucio vel Brucho*. Salv.

IV. *RAJA corpore glabro, aculeis saepe duobus postice serratis in cauda apterygia.*

Pastinaca marina altera περιπλατεῖα, *Altavela dicta*. Columna aquatil. c. 2. p. 4. t. 2.

Pastinaca marina altera περιπλατεῖα, *Altavela neapoli dicta*. Willugh. p. 65.

Raj. p. 24.

V. *RAJA corpore glabro, aculeo longo serrato in cauda pinnata.* Art.

Aetos. Aristot. l. 5. c. 5.

Athen. l. 7. fol. 143. 52.

Oppian. l. 1. fol. 117. 25. ed. Lippi.

Aquila. Plin. l. 9. c. 24.

Salvian. fol. 146. b. 147.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 3. t. 9. f. 8.

Willugh. p. 64.

Raj. p. 23.

Aquila marina. Bellon.

Gefner. p. 75. & (Germ.) fol. 67. a. & parali. p. 37.

Aquila aldovandi prior. Aldrov. l. 3. c. 47. p. 438.

Pasti-

Passinaca marina levis altera δξυπτερυγίς, *Aquilone dicta.*

Column. c. 1. p. 3. t. 2.

Secunda Passinacæ species. Rondel. l. 12. c. 2. p. 338.

Romanis *Aquilone.*

VI. *RAJA* toto dorso aculeato, duplici ordine aculeorum in cauda, simplicique ad oculos.

α. *Raja aspera nostras, the White horse dicta.* Willugh. p. 78.

Raja aspera nostras. Raj. p. 26.

β. *Raja fullonica.* Rondel. l. 12. c. 17. p. 356.

Gesner. p. 797. 938. & (Germ.) fol. 72. a.

Rond. Aldrov. l. 3. c. 61. p. 462.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 8. t. 11 f. 4.

Charlet. p. 130.

Willugh. p. 78.

OBS. *Raja fullonica* β authorum, forte eadem cum α sit.

VII. *RAJA* dorso ventreeque glabris, aculeis ad oculos, terroque eorum ordine in cauda. Art.

? *Raja oculata* & *levis.* Rondel. l. 12. c. 9. p. 349.

Aldrov. l. 3. c. 51. p. 453.

Gesner. p. 793: 933. & (Germ.) fol.

69. 70.

Raja oculata. Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 5. t. 10. f. 4.

Charlet. p. 130.

? *Raja levis oculata.* Schonev. p. 58.

Raja levis oculata. Willugh. p. 72.

Raj. p. 27.

Raja stellaris. Salvian. fol. 150. a.

Raja Salvian. fol. 148. b. ad iconem 51.

? *Miraletus.* Bellon.

Gesner. p. 793.

Venetis *Barracot.* Romanis *Arzilla.*

Massiliensibus *Mirallet.*

VIII. *RAJA* varia, tuberculis decem aculeatis in medio dorso. Art.

α. *Bōs.* Aristot. l. 5. c. 5. & l. 6. c. 12.

Oppian. l. 1. p. 5. & l. 2. p. 35.

Βὸς θαλάττιος. Ælian. l. 1. c. 19. p. 26.

Bos. Ovid. v. 94.

Plin. l. 9. c. 24.

Bos Bellula. P. Jov. c. 3. p. 16.

β. Ὁ λειόβατος. Aristot. l. 2. c. 15. & l. 6. c. 11.

Athen. l. 7. p. 312.

Levi-Raja. Bellon.

Salvian. fol. 149. a. b.

? *Raja laevis*. Morrell. p. 185. ?

γ. *Bos bellonii*, *Oxyrinchus major* Rondel. Aldrov. l. 3. c. 52.
p. 453.

Oxyrinchus major. Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 6.
t. 10. f. 8.

Raja Oxyrbynchus major. Rondel. Willugh. p. 77.

Raj. p. 26.

Raja Oxyrbynchus major, quam aliqui bovem antiquorum esse
putant. Gefner. (Germ.) fol. 69. a.

Alia Raja Oxyrbynchus major, quam aliqui Bovem antiquorum
esse putant. Gefner. p. 792. 933.

Alia Raja ὀξύρυγχος. Rondel. l. 12. c. 8. p. 348.

Romanis *Mucosa* & *Bavosa*. Massiliensibus *Flossade*. Salv.

OBS. *Lævi Raja* β nullos aculeos in dorso obtinet, sed in
cauda tantum. Salv.

IX. *RAJA varia*, dorso medio glabro, unico aculeorum ordine in
cauda. Art.

Ἡ Βαρίς. Aristot. l. 1. c. 5. & l. 2. c. 13. & l. 5. c. 5. & l. 6.
c. 10. 11. & l. 8. c. 15. & l. 9. c. 37.

Ælian. l. 16. c. 13. p. 921.

Oppian. l. 1. p. 5. b. & l. 2. p. 60.

Athen. l. 7. p. 286.

Rayte, *Rayche* & *Rubus*. Cub. l. 3. c. 74. & 77. fol. 87. b. 88. b.

Auctor.

Albert.

Raja undulata siue cinerea. Rondel. l. 12. c. 6. p. 346.

Gefner. p. 791. 932.

Aldrov. l. 3. c. 50. p. 452.

Raja undulata. Gefner. (Germ.) fol. 68. b. 69.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 5.

Charlet. p. 130.

? *Raja laevis*. Schonev. p. 58.

Anglis *The Skate* or *Flair*.

OBS. *Raja mase*. ὁ Βάρτος. Aristot.

fam. ἡ Βαρίς. Aristot.

X. *RAJA tota laevis*. Art.

Ἡ Νάγκη. Aristot. l. 2. c. 13. 15. & l. 5. c. 5. 11. & l. 6.
c. 10. 11. & l. 9. c. 37. & part. l. 4. c. 12.

Ælian. l. 1. c. 36. & l. 5. c. 37. & l. 9. c. 14.

Athen. l. 7. p. 314.

Oppian. l. 1. p. 5. & l. 2. p. 32.

Narcos. Cub. l. 3. c. 62. fol. 85.

Rabas. Jorath. auctoris obscuri.

Cub.

Cub. l. 3. c. 74. fol. 87. b.

Torpedo. Plin. l. 9. c. 16. 24. 42. 51. & l. 32. c. 11. 9.

Isidor.

Cub. l. 3. c. 91. fol. 91. b.

P. Jov. c. 28. p. 100.

Bellon.

Rondel. l. 12. c. 19. p. 358.

Salvian. fol. 142. 143.

Gesner. p. 988.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 1. t. 9. f. 3. 4.

thaumat. p. 428.

Charlet. p. 129.

Torpedo gracilis Ναρχη. Raj. p. 28.

Torpedo gracilis Ναρχη, genuensibus Batte potta. Willugh. p. 81.

Torpedo non maculosa. Gesner. (Germ.) fol. 75. a.

Aldrov. l. 3. c. 45. p. 418.

Jonston. l. 9. f. 5. 6.

Torpedo maculosa. Gesner. (Germ.) fol. 75. a.

Torpedo maculosa supina. Gesner. (Germ.) fol. 75. a.

Torpedo Salviani maculosa. Aldrov. l. 3. c. 45. p. 417.

Torpedo oculata. Bellon.

Gesner. p. 988. 989.

Torpedo oculata prima. Gesner. (Germ.) fol. 74. b.

Torpedinis species secunda. Rondel. l. 2. c. 19. p. 362.

Gesner. p. 992.

tertia. Gesner. p. 992.

magis varia. Rondel. l. 12. c. 19.

p. 362.

quarta. Rondel. l. 12. c. 19. p. 363.

Gesner. p. 992.

Romanis *Ochiarella*.

Anglis *The Crampfish*.

ORDO V.
P L A G I U R I.

PHYSETER, G. Pisc. 46.

I. *PHYSETER* maxilla superiore longiore, pinna longa in dor-
Art.

*Balæna major, in inferiore tantum maxilla dentata, dentib.
arcuatis fauciformibus pinnam seu spinam in dorso habens*
Sibbald.

Raj. p. 15.

II. *PHYSETER* pinna dorsi altissima, apice dentium pla-
Art.

*Balæna macrocephala tripinnis, quæ in mandibula inferiore den-
tes habet minus inflexos & in planum desinentes.*
Sibbald.

Raj. p. 16.

DELPHINUS, G. Pisc. 47.

I. *DELPHINUS* corpore fere coniformi, dorso lato, ro-
strato. Art.

H *Φωκία*. Aristot. l. 6. c. 12. & l. 8. c. 13.

Tursio Gaz. arit. l. c.

?*Tursio*. Plin l. 9. c. 9.

Bellon. p. 16.

Rond

- Rondel. l. 16. c. 10. p. 474.
Phocana. Wotton. l. 8. c. 194. fol. 172. a.
 Rondel. l. 16. c. 9. p. 473.
 Jonston. l. 5. c. 2. a. 5. p. 220. t. 41.
 Charlet. p. 168.
 Willugh. p. 31.
 Raj. p. 13.
Phocanus sine Turfio. Bellon. p. 16.
 Scaliger.
 Gefner. p. 711. 838.
 Aldrov. cet. c. 8. p. 719. 720.
Phocana sine Turfio. Gefner. (Germ.) fol. 96. b.
Turfio seu Phocena. Schonev. p. 77.
Parvus Delphinus vel Delphin septentrionalium aut orientalium.
 Schonev. p. 77.
Suecis Murfvin. Danis & Cimbris idem.
Anglis d Porpeffe.

II. *DELPHINUS corpore oblongo subtereti, rostro longo acuto.*
 Art.

- Ὁ Δελφίς. Aristot l. 2. c. 13. & l. 3. c. 1. & l. 4. c. 8. 9. 10.
 & l. 5. c. 5. & l. 6. c. 12. & l. 8. c. 2. 13. 19.
 & l. 9. c. 48. & part. l. 4. c. 12.
 Athen. l. 7. p. 282. & l. 8. p. 353.
 Δελφίς. Ælian. l. 1. c. 18. & l. 2. c. 6. & l. 5. c. 5. & l. 6.
 c. 15. & l. 8. c. 3. & l. 10. c. 8. & l. 11. c. 12. & l. 12. c. 12.
 Δελφίς ἰσος. Oppian. l. 1. p. 15. 22. 25. & l. 2.
Delphinus. Plin. l. 9. c. 8. & l. 8. c. 25. 56. & l. 32. c. 11.
 Auctor.
 Auctor.
 Cub. l. 3. c. 25. fol. 76. b.
 Wotton. l. 8. c. 194. fol. 171. b
 Bellon.
 Rondel. l. 16. c. 8. p. 459.
 Gefner. p. 319. & (Germ.) fol. 92. 93. a.
 Jonston. l. 5. c. 2. a. 4. p. 218. t. 43. f. 2. 3. 4.
 thauemat. p. 414.
 Charlet. p. 168.
Delphinus prior. Aldrov. cet. c. 7. p. 703.
Delphinus antiquorum. Raj. p. 12.
 Willugh. p. 28.
Delphin. Solin. polyhist. c. 18.
 Ambros. hexam. l. 5. c. 2. 3.
 C. Figul. fol. 5. a. b.
Anglis The Dolphin & Porpeffe.

III. *DELPHINUS* rostro sursum repando, dentibus latis serratis.
Art.*Orca*. Plin. l. 9. c. 6. & l. 32. c. 11.

Auctor.

Cub. l. 3. c. 63. fol. 85. b.

Wotton. l. 8. c. 195. fol. 172. b.

Bellon.

Rondel. l. 16. c. 13. p. 483.

Gesner. p. 635. & (Germ.) fol. 101. b.

Schonev. p. 53.

Aldrov. cet. c. 6. p. 698.

Jonston. l. 5. p. 217.

Charlet. p. 168.

Willugh. p. 40.

Raj. p. 10.

Balæna minor utraque maxilla dentata. Sibbald.

Raj. p. 15.

? *Capitolinus*. P. Jov. c. 2. p. 12.? *Burs-Kopf*. Marten.

Raj. p. 10.

Oceani accolis Loper.*Hilliglandis Tandebeye*, Springer.*Scotis A North Caper*.*Anglis A Grampus*.

BALÆNA, G. Pisc. 48.

I. *BALÆNA* fistula in medio capite, dorso caudam versus acuminato. Art. spec. 106.*Balæna major*, laminas corneas in superiore maxilla habens, fistula donata, bipinnis. Sibbald.

Raj. p. 216.

Balæna vulgaris edentula, dorso non pinnato. Raj. p. 6.*Balæna vulgo dicta sine Musculus*. Rondel. l. 16. c. 11. p. 475.*Balæna vulgo dicta sine Myslicerus aristotelis*, *Musculus plinii*.

Gesner. p. 114.

Balæna vulgi. Aldrov. cet. c. 3. p. 688. t. 732.

Jonston. p. 216.

Balæna vulgaris. Charlet. p. 167.? *Balæna*. Bellon.

Aldrov.

- ? Aldrov. cet. c. 2, p. 676
 ? Jonston. t. 41.
 Schonev. p. 24.
 Drossand. dissertat. Upsalæ 1694. Octavo.
 Rond. Willugh. p. 35.

Balæna Spitzbergensis, Martens.

Musculus μυσικητος. Gefner. (Germ.) fol. 99, b.

Musculus piscis, Gaz. Arist.

? *Musculus*. Plin. l. 32. c. 11. nullo verbo describitur.

? *Ὁ μυσικητος*. Aristot. l. 3. c. 12.

Suecis *Groenlands Hvalfisken*. Anglis *The Whale*.

OBS. *Balæna major*, laminas corneas in superiore maxilla habens, bipinnis, fistula carent. Sibbaldi Raj. p. 16. videtur tantum ficta esse ex mala descriptione. Joh. Fabr. Lyncei & G. Rondeletii, & præterea vero simile est Fabrum nullam aliam Balænam descripsisse quam Groenlandicam seu Spitzbergensem Martensii.

I. *BALÆNA* fistula in medio capite, tubero pinniformi in extremo dorso. Art.

α. *Balæna edentula*, corpore strictiore, dorso pinnato. Raj. p. 9. 10. Anglis *The Fin-fish*.

β. ? *Φύσαλος*. Alian. l. 9. c. 49.?

Oppian. l. 1. p. 14.

Physeter. Plin. l. 9. c. 4. & l. 32. c. 11.

Solin. polyhist. c. 55.

Rondel. l. 16. c. 14. p. 485.

Aldrov. cet. c. 4. p. 689.

Jonston. l. 5. p. 216.

Willugh. p. 41.

Physalis belua seu *Physeter*. Gefner. p. 723. 851.

Physalus seu *Physeter*. Gefner. (Germ.) fol. 100, a.

Physeter & *Physalus*. Charlet. p. 167.

OBS. Synonyma β videntur ad eandem speciem cum α pertinere.

II. *BALÆNA* fistula duplici in rostro, protuberantia cornuiformi in extremo dorso. Art.

Balæna tripinnis nares habens, cum rostro acuto & plicis in ventre. Sibbald.

Raj. p. 21.

VI. *BALÆNA* fistula duplici in fronte maxilla inferiore multo latiore. Art.

Balæna tripinnis, maxillam inferiorem rotundam, & superiorem multo latiore habens Sibbald.

Raj. p. 17.

M O N O D O N, G. Pisc. 49.

I. MONODON.

Monoceros, unicornu marinum. Charlet. p. 168.*Monoceros piscis de genere cetaceo.* Raj. p. 11.*Monoceros piscis, qui de genere cetaceo esse ferrur.* Willugh.
p. 42.*Islandis Narhwal.*

C A T O D O N, G. Pisc. 50.

I. CATODON *fistula in rostro.* Art.*Balena minor, in inferiore maxilla tantum dentata siue pinna
aut spinu in dorso.* Sibbald.

Raj. p. 15.

II. CATODON *fistula in cervice.* Art.*Balena major in inferiore tantum maxilla dentata macrocephala
bipinnis.* Sibbald.

Raj.

Cete. Clus. exot. l. 6. c. 17.

Let. theatr. belg. part. 1. l. 3.

Metern. hist. belg. part. 2. l. 22.

Cete cluso descriptum, Pot-Walfisch batavis maris accolis dictum.

Willugh. p. 41.

Cete Pot-Walfisch batavis maris accolis dictum clusi exos.

Raj. p. 11.

Cetus dentatus. Charlet. p. 167.*A Trumpe Purchasii.*

THRICHECHUS, G. Pisc. 56

THRICHECHUS Art.

Manatus. Rondel. l. 16. c. 18. p. 490.

Gesner. p. 213.

Manati indorum. Aldrov. cet. c. 11. p. 728. 729.

Jonston. l. 5. c. 2. a. 7. p. 223.

Manati. Jonston. thaumat. 418.

Charlet. p. 169.

Manati seu Vacca marina. Raj. quadrup. 193.

Manathi. Clus.

Hasszi (theol. lubec) dissert. philolog. 8. 9.

Taurus marinus. Herrera descript. novi orbis. c. 12.

La Donna. Zucchelli (Anton.) itinerar. cong. p. 146.

See-koejen. Rochefort.

? *Tachas vel Thachasch*. Mosi Exod. 25. v. 5. &c. ex Hasszo.

Anglis *Manalec*.

Hispaniolensibus *Monathi* vel *Monati*.

Gallis *Lamontin*, *Namantin*, *les Vaches marines*.

Lusitanis *Pezze Mouller* vel *Muger*.

Amboiensibus *Dujung* vel *Dujung*.

Guajanis *Cojumero*.

A P P E N D I X.

S I L U R U S.

2. *SILURUS cirris quatuor in mento*, Art. spec. 107.
Σιλαγρος. Ælian. l. 12. c. 29. & l. 14. c. 25. p. 838. 840.
Σιλαγρος. Athen. l. 7. c. 287.
Ἡ Γλανίς. Aristot. l. 2. c. 13. 15. & l. 6. c. 14. & l. 8. c. 20.3
 & l. 9. c. 37.
Glanus, Plin. l. 32. c. 10.
Glanis, Plin. l. 9. c. 43.
 Salvian. fol. 210. b. 211.
 Aldrov. l. 5. c. 5. p. 569.
 Jonston. l. 3. tit. 2. c. 4. t. 27. f. 8. thaumat. p. 415.
Glanis, *Glanus* & *Glanius*. Charlet. p. 159.
Silurus, Plin. l. 9. c. 15. 51. & l. 5. c. 9.
 Solin. polyh. c. 60.
 Ambrosi. hexam. l. 5. c. 5.
 Auson. mosell. v. 135.
 Hildegard. l. 4. part. 1. c. 10. p. 90.
 Gaz. arist. l. c.
 C. Figul. fol. 5. a.
 Rondelet. part. 2. p. 180.
 Gefner. p. 867. 872. 1047.
 Schonev. p. 69.
 Jonston. t. 47. f. 7.
 Willugh. p. 128.
 Raj. p. 70.
 Roberg. pisc. p. 11.
Sylurus, Gefner. (Germ.) fol. 183. 184.
Silurus gesneri prior. Aldrov. l. 5. c. 5. p. 569.
 ? *Mustela marina*. Bellon. ?
Sebeid dictus piscis. *Mylioceros*, Gefner. (Germ.) fol. 176. b. 17

Pis

Piscis barbatus, Salvian. fol. 210. ad iconem.
 Succis Mål.
 Germanis Scheid, Schoiden, Wäls, Waller, &c.
 Polonis Sum.
 Pannonibus Harcha. Salv.
 Byzantinis Glano.
 Anglis *The Shont-fish*.

- I. *SILURUS cirro unico in mento*. Art. spec. 107.
 Succis Lake. Alkuffa.

P H Y C I S.

. PHYCIS.

- α. Ἡ Φυκίς. Aristot. l. 6. c. 13. & l. 8. c. 10.
 Oppian. l. 1. p. 6.
 Athen. l. 7. p. 319.
Phyfis. Plin. l. 9. c. 26. & l. 32. c. 11.
 P. Jov. c. 20. p. 89.
 Rondelet. l. 6. c. 10. p. 186.
 Gefner. p. 718. & 845. & (Germ.) fol. 16. b.
 Charlet. p. 133.
Salviani. Aldrov. l. 1. c. 8. p. 43.
 Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 6. t. 14. n. 4.
Phuca sue Phycis. Salvian. fol. 228.
Fuca. Gaz. Arist. l. c.
 Salvian. fol. 227. ad iconem 92.
Ficis. Cub. l. 3. c. 37. f. 79. b.
 ? *Trebius Auctor*. Cub. l. 3. c. 92. f. 91. b.
 β. *Tenca marina*. Salvian. fol. 230. b. ad iconem.
Tinca marina. Aldrov. l. 3. c. 9. p. 192.
 Jonston. l. 1. tit. 1. c. 1. a. 2. t. 1. n. 5.
 Charlet. onom. p. 122.
Asellus callarias. Bellon.
 Gefner. (Germ.) 42. b.
Asellus callarias Bellonii & Salviani. Raj. p. 75.
 Romanis *Fico* vel *Ficus* & *Tenca marina*.
 Gallis *Mole*. Rondel.
 QBS. Salvianus negat *Phycidem* α *veterum*, esse *Tencam mari-*
nam Romanorum t. 228. & 232, notatque ideo Rondele-
 tium. Ergo ab aliis adhuc discutienda res est.
 Blenni generi cognatus piscis est.

CICLA:

C I C L A.

I. *CICLA vix palmaris.*

Ἡ Κίχλη. Aristot. l. 2. c. 13. & l. 8. c. 13. 15. 30.

Oppian. l. 1. p. 6.

Athen. l. 7. p. 305.

Turdus. Varro. lat. l. 4.

Plin. l. 9. c. 15.

Ambros. hex. l. 5. c. 2. p. 52.

Isidor. l. 12. c. 6.

Gaz. Arist. l. c.

? Salvian. fol. 220. b. ad iconem.

Turdus minor. Salvian. fol. 221. b. 222. a.

OBS. Ex Salviano. 1. Iris aurea, cauda lata non bifurca.
2. Latiusculus est, Tincæ marinæ non absumilis. 3. Caput, dorsum, cauda & pinnæ ex cineraceo nigricant; latera cineracea. Venter subalbidus maculis liventibus nullo ordine positus varius. 4. Raro palmi mensuram excedit.

II. *CICLA cubitalis.*

Turdus major. Salvian. fol. 221. b. 222. a.

Turdi species. Salvian. fol. 221. a. ad iconem.

Romanis *Tordo* & *Verdone*.

OBS. 1. Priori oblongior est & major scilicet quandoque cubitalis. 2. Color vel totus viridis vel subrubens, sed maculæ parvæ rotundæ & cæruleæ in dorso. 3. Venter & latera maculis liventibus confuse permixtis insignita.

S P H Y R Æ N A.

I. *SPHYRÆNA.*

Σφύρανα, Aristot. l. 9. c. 2.

Ælian. l. 1. c. 33. p. 40.

Athen. l. 7. p. 323.

Oppian. l. 1. p. 7. & l. 2. p. 58. & l. 3.

Sphyræna. Charlet. p. 136.

Sphy

- Sphyræna prima species.* Rondel. l. 8. c. 1. p. 224.
 Gefner. p. 882. 1059.
 Willugh. p. 273.
- Sphyræna, prima species.* Gefner. (Germ.) fol. 39.
- Sphyræna siue Sudis.* Salvian. fol. 70. a
 Aldrov. l. 1. c. 21. p. 102.
 Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 16. t. 18. f. 1.
 Raj. p. 84.
- Sudis.* Varro. lat. l. 4.
 Plin. l. 32. c. 11.
 Wotton. l. 8. c. 166. fol. 149. a.
 Salvian. fol. 69. b. ad iconem.
- Malleolus.* Gaz. arist. l. c.
- Italis Livornis Luzzo marino.*
- Gallis Spet. Rondel.*
- OBS. Ad Genus Scombri pertinere videtur, *Salviani* icon accurata non est pinnam dorsii primam enim omittit.

H E P A T U S.

I. HEPATUS.

- Ὁ ἥπατος. Aristot. l. 2. c. 17.
 Ælian. l. 9. c. 38. p. 547.
 Oppian. l. i. p. 6.
- ἥπατις siue λεβίας. Athen. l. 7. p. 301.
- Hepatus.* Rondel. l. 5. c. 18. p. 147.
 Gefner. (Germ.) fol. 27. b.
 Aldrov. l. 1. c. 12. p. 60.
 Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 9. t. 14. n. 14.
 Charlet onom. p. 134.
 Willugh. p. 314.
 Raj. p. 133.
- Hepatus alius, Quam Bellonii.* Gefner. p. 411.
- Iecorinus.* Gaz. arist. l. c.
- Iecur marinum vel Hepatus.* Harmolai.
- Græcis hodiernis *Seipuros.* Rondel.

CAPRISCUS.

I. *CAPRISCUS.*

- Καπρος.* Aristot. l. 2. c. 13. & l. 4. c. 9.
 Athen. l. 8. p. 331. & l. 7. fol. 152. 40. & fol. 163. 5.
Χαπρίσκος. Diphili apud Athen. l. 3. fol. 177. 25.
Χοῖρος. Strabon. Georg. l. 17. fol. 181. ex sentent. Rondeletii.
 Athen. l. 8. fol. 165. 27.
Mūs. Ælian. l. 12. c. 26.
 Oppian. hal. l. 1. fol. 109. 37.
Τς. Epicharmi apud Athen. l. 7. p. 326. ?
Sus. Ovidii. hal.
Mus piscis. Gefner. (ed. Francof.) p. 589.
Aper. Gaz. Arist. l. c.
 Bellon.
 Gefner. p. 70.
Caper. Plin. l. 11. c. 51.
 Salvian. fol. 207. 208. t. 206. b.
Caper siue Capri/cus. Aldrov. l. 4. c. 8. p. 516.
 Jonston. l. 2. tit. 1. c. 6. t. 23. n. 7.
Carpus siue Copri/cus. Charlet. onom. p. 151.
Capri/cus. Rondel. l. 5. c. 26. p. 159.
 Gefner. p. 181. 214. & (Germ.) fol. 30. b.
 Willugh. p. 152.
 Raj. p. 47.
 Romanis *Pesce Bulestra.* Salv.
 OBS. Rondeletius & Salvianus hunc piscem primo recte de-
 scripserunt.

T Æ N I A.

I. *TÆNIA autbormu.*

- ἡ Ταινία.* Aristot. l. 2. c. 13. habet pinnas duas ut Anguilla.
 Oppian. l. 1. p. 5.
 Athen. l. 7. p. 325.

Vitta.

Vitta. Gaz. arift. l. c.

Tania. Rondel. l. 11. c. 17. p. 326. cauda, ex icone, vix pinnata.

Gefner. p. 938. & (Germ.) fol. 56. a.

Rondel. Aldrov. l. 3. c. 30. p. 369.

Jonston. p. 23. t. 6. f. 1.

Charlet. onom. p. 126.

Tania prima Rondeletii. Raj. p. 39.

Ichthyopolis romanis Cepole dicta, Willugh. p. 116. *

II. TÆNIA *Falx venetorum dicta*.

Falx venetorum. Bellon.

Falx bellonii. Jonston. t. 6. f. 3.

Altera Tania species, Falx venetorum Bellonii. Gefner. p. 939.

Tania tertia, Falx venetorum Bellonio. Willugh. p. 117.

Tania Bellonii. Gefner. (Germ.) fol. 56. a.

Tania, melius quam à Bellonio expressa. Aldrov. l. 3. c. 30. p. 370.

? *Tania falcata*. Imperati.

Aldrov. l. 3. c. 30. p. 371.

Jonston. l. c.

III. TÆNIA *serpens rubescens dicta*.

Serpens rubescens. Rondel. l. 14. c. 8. p. 410.

Willugh. p. 118.

Gefner. p. 863. serpent. fol. 70. a.

Serpens marinus rubescens. Gefner. (Germ.) fol. 47. b.

Murus alter siue Serpens rubescens. Rondel. Aldrov. l. 3. c. 28. p. 367. vide Jonston t. 5. f. 5.

Tania potius species censenda. Willugh. p. 118.

IV. TÆNIA *altera dicta*.

Altera Tania species. Rondel. l. 11. c. 18. p. 327.

Gefner. p. 938.

Tania altera species. Gefner. (Germ.) fol. 56. a.

Tania altera. Rond.

Aldrov. l. 3. c. 30. p. 370.

Jonston. t. 6. f. 2.

Willugh. p. 118.

Raj. p. 71.

? *Tania rubra, genua ubi frequens est Cavagiro & Freggia dicta*.

Willugh. p. 117.

Raj. p. 71.

P H O L I S.

I. *PHOLIS.*

Ἡ Φωλῖς. Aristot. l. 9. c. 37.

Pholis. Rondel. l. 6. c. 23. p. 206.

Aldrov. l. 1. c. 25. p. 116.

Gefner. p. 714. & (Germ.) fol. 5. a.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 2. a. 1. t. 17. n. 4.

Charlet. onom. 137.

Willugh. p. 135.

Raj. p. 74.

C I T H A R U S.

I. *CITHARUS.* Plin. l. 32. c. 11.

Κιθάρος. Aristot. l. 2. c. 17.

Oppian. l. 1. fol. 108. 24.

Galen. class. 2. fol. 29. t. Rhombo similis est.

Strabon. Georg. l. 17.

Athen. l. 7. fol. 152. 48. ed. Valderi.

Ælian. c. 39.

A T H E R I N A.

I. *ATHERINA.*

α. ? *Ἀθέρινα*. Aristot. l. 6. c. 17. & l. 9. c. 2.?

? Oppian. l. 1. p. 5.

? *Ἀθέρινη*. Athen. l. 7. p. 85. ex quo fit *Epsetus* f. junior.
Atherina.

Ron.

- Rondelet. l. 7. p. 7. c. 10. p. 215. Juoit. Gallis & Monspelienf.
- Ἡψήριος. Athen. l. 8. p. 356. & l. 7. p. 293. 301.?
- Hepsetus*. Gefner. (Germ.) fol. 2. a.
Rond. Aldrov. l. 2. c. 35. p. 216.
Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 17. t. 19.
- Hepseri*. Gefner p. 71. Gobio similis, pinnæ in dorso duæ.
- Arista*. Gaz. Arist. l. c.
- Pisciculus Anguella venetiis dictus*. Willugh. p. 209.
Raj. p. 79.
- β. *Atherina*. Rondel. l. 7. c. 11. p. 216. Latharina Romanis.
Aldrov. l. 2. c. 36. p. 217. & (Germ.).
f. 2. b.
Gefner. p. 72.
Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 18. t. 19. f. 13.
Willugh. p. 209.
Raj. p. 79.
- γ. *Atherina*. Bellonii.
Gefner. p. 72. 83.
Aldrov. l. 2. c. 36. p. 217.
Willugh. p. 219.
Raj. p. 97.
- Venetiis *Anguella*, cauda furcata.
- OBS. Verosimile est hos tres α. β. γ. nil nisi varietates esse.

L I P A R I S.

I. LIPARIS.

- α. *Liparis nostras*. Johnson in append. Willugh. p. 17.
Raj. p. 74.

Forte sequentia synonymia huc pertineant.

- β. *Liparis*. Rondel. l. 9. c. 8. p. 272.
Gefner. p. 483.
Aldrov. l. 3. c. 11. p. 296.
Jonston. l. 1. tit. 1. c. 1. a. 3. t. 1. f. 7.
Willugh. p. 135.
Raj. p. 74.

Anglis Eboracensibus & Dunelmensibus *The sea-snail*.

C H E L O N.

I. *CHELON auctorum.*

Ὁ χέλλων καὶ χέλων. Aristot. l. 5. c. 11. & l. 6. c. 17. & l. 8. c. 2.

Labeo, Gaz. Arist. l. c.

Chelo, Rondel. l. 9. c. 5. p. 266.

Gefner. p. 552.

Chelon, *Labeo*. Gefner. (Germ.) fol. 37.

Gallis *Chaluc*. Rond.

II. *CHELON Myxo auctorum.*

Ὁ μυζων καὶ μυζων. Aristot. l. 5. c. 11. & l. 6. c. 17.

Muco, Gaz. Arist. l. c.

Myxo, Rondel. l. 9. c. 4. p. 265.

Gefner. p. 552.

Mixon, *Muco*. Gefner. (Germ.) fol. 36. b.

Provincialibus & Liguribus *Maxon*.

I N D E X

N O M I N U M L A T I N O R U M.

A.

catuaja.	pag. 78	<i>Anableps.</i>	pag. 43
.	11	<i>Anorbichas.</i>	38
nis.	4	<i>Anarrichas.</i>	39
nus.	4	<i>Anchorago.</i>	23
stuxia.	78	<i>Anguilla.</i>	30, 39
una.	79	<i>Antacæus.</i>	92
enfer.	91	<i>Anthias.</i>	36, 54
iter.	74	<i>Aper.</i>	79, 114
ndes	23	<i>Aphua.</i>	47
nfer.	91, 92	<i>Aphyæ.</i>	14, 47
na.	68	<i>Apua.</i>	47
c.	16	<i>Aquila.</i>	100
atus.	80, 81	<i>Aranea.</i>	70
	1, 2, 27	<i>Araneus.</i>	70, 71
is.	18	<i>Argentina.</i>	17
is.	18	<i>Aringa.</i>	15
inus.	36	<i>Arista.</i>	117
is.	16	<i>Aristotus.</i>	16
ger.	27	<i>Asellus.</i> 34, 35, 36, 37,	111
a.	44, 45	<i>Asper Pisciculus.</i>	67
a.	16	<i>Aspredo.</i>	68
en.	20	<i>Atherina.</i>	116
a.	11, 18, 19, 20	<i>Atherina.</i>	117
nus,	11, 13	<i>Atinga.</i>	86
piscis.	13	<i>Aurata.</i>	64, 68
	61		
	14		
	15, 16		
res.	56	<i>Bacchus.</i>	37
a.	38	<i>Balena.</i>	106, 107
	51	<i>Balæna.</i>	104, 108
æcetus.	30	<i>Balistes.</i>	82
dytes.	30	<i>Ballerus.</i>	12
			Bam-

B.

Bambele.	pag. 12	Carperen.	pag. 4
Barbulus.	8	Carpio.	24
Barbus.	8, 9	Carmo.	4
Belone.	27	Carpus.	114
Bezola.	19	Caspargus.	58
Bib.	35	Cataphractus.	77
Blicca.	12	Catodon.	108
Blennius.	44, 45	Catulus.	97, 91
Blennus.	44	Centrina vel centrine.	95
Boca.	61	Cephalus.	7, 52
Boops.	61	Cerebrum Jovis.	55
Borbocha.	38	Cernua.	63, 68
Borbotha.	38	Cerrus.	62
Bos.	101, 102	Cestreus.	52
Bottatritz.	38	Cete.	108
Box.	61	Cetus.	108
Brefma.	4	Chærodon.	79, 80
Bubulca.	14	Chalcis.	14, 15
Buglossa.	33	Chana.	54
Buglossus.	33	Chanadella.	53, 54
Butskopf.	106	Channe.	54
		Channus.	54
		Chanus.	54
		Charax.	5
		Chare.	24
		Chelon.	118
		Chromis.	63, 65
		Chrysophrys.	64
		Cicerellus.	30
		Cicla.	112
		Cinædus.	56
		Citharus.	33
		Citula.	78
		Citus.	76
		Cobitis.	2, 3
		Coccyx.	75
		Colfisch.	35
		Conger.	40
		Congrus.	40
		Coracinus.	65, 66
		Coregonus.	18, 19, 20, 21
		Cordyla.	50
		Cornuta.	75
		Corvo.	66
		Corvus.	73, 78
		Coryphæna.	28, 29
		Cott.	

C.

Cahllo.	69		
Calliæthys.	34		
Callionymus.	71		
Callyonymus.	71		
Canicula.	97		
Canis acanthias.	95		
Canis aristotelis.	98		
Canis carcharias.	98		
Canis galeus.	97		
Cantharus.	58		
Caper.	114		
Capidolius.	106		
Capitatus.	76		
Capito.	6, 7, 8, 10, 52		
Capo.	74, 75		
Caprifcus.	114		
Carapo.	43		
Caraffius.	5		
Carafus.	5		
Carpa.	4		
Carpanus.	4		
Carpera.	4		

<i>Cottus.</i>	pag. 76, 77
<i>Cuculus.</i>	73, 74
<i>Clupea.</i>	14, 15, 17
<i>Clupea.</i>	16
<i>Curimata.</i>	20
<i>Cyclopterus.</i>	87
<i>Cynædus.</i>	56
<i>Cynoglossus.</i>	31
<i>Cyprinus.</i>	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

D.

<i>Delphin.</i>	105
<i>Delphinus.</i>	104, 105, 106
<i>Dentalis.</i>	60
<i>Dentex.</i>	60
<i>Dentrix.</i>	60
<i>Dobula.</i>	7
<i>Donna.</i>	109
<i>Dorado.</i>	29
<i>Dornhundert.</i>	95
<i>Draco.</i>	70
<i>Dracunculus.</i>	77

E.

<i>Echeneis.</i>	28
<i>Echineis.</i>	28
<i>Elops.</i>	92
<i>Encrasicholus.</i>	17
<i>Engraulis.</i>	17
<i>Eperlanus.</i>	21
<i>Equisele.</i>	29
<i>Erica.</i>	14
<i>Eriox.</i>	23
<i>Erythrinus.</i>	59
<i>Erythrinus.</i>	59
<i>Erythrinus.</i>	59
<i>Esch.</i>	21
<i>Esox.</i>	26, 27
<i>Exochinus.</i>	18
<i>Exocætus.</i>	18
<i>Exormistos.</i>	89
<i>Exos.</i>	52

Artedi Synonymia.

F.

<i>Faber.</i>	pag. 78
<i>Falx.</i>	115
<i>Farra.</i>	20
<i>Ferra.</i>	20
<i>Fiatola.</i>	34
<i>Ficis.</i>	111
<i>Fleſus.</i>	31
<i>Fluta.</i>	42, 58
<i>Forna.</i>	23
<i>Fragolinus.</i>	59
<i>Fratola.</i>	34
<i>Fuca.</i>	111
<i>Fullo.</i>	5
<i>Fundulus.</i>	2, 11

G.

<i>Gadus.</i>	34, 35, 36, 37, 38
<i>Galea.</i>	37
<i>Galerita.</i>	44
<i>Galeus.</i>	91, 93, 94, 95, 97, 98
<i>Gallus marinus.</i>	78
<i>Gardus.</i>	9
<i>Gasterosteus.</i>	80, 81
<i>Gattorugine.</i>	44
<i>Glacus.</i>	51, 98
<i>Gladius.</i>	48
<i>Glanis.</i>	110
<i>Glanus.</i>	110
<i>Glaucus.</i>	51, 52, 98
<i>Gobionaria.</i>	47
<i>Gobius.</i>	46, 47
<i>Gobius.</i>	11, 67, 76, 77
<i>Gonger.</i>	40
<i>Gornatus.</i>	74
<i>Grey.</i>	23
<i>Grislagine.</i>	5
<i>Gryllus.</i>	40, 42
<i>Guacucuja.</i>	88
<i>Guaperva.</i>	82
<i>Guaracapema.</i>	29
<i>Guarerua.</i>	79
<i>Guiniad.</i>	20

Q

Gun-

Gunnellus.	pag. 45	Leuciscus.	pag. 9, 10
Gymnotus.	43	Libella.	96
		Limanda.	33
H.		Limaria.	50
		Limosa.	50
Halec.	14	Linguatula.	31
Halecula.	17	Lingulaca.	35
Hamia.	51	Liparis.	117
Harengus.	15, 16	Lophius. •	87, 88
Helops.	92	Lota.	38
Hepatus.	113	Lucerna.	73, 74
Hepatus.	53	Lucio - perca.	67
Hepsetus.	117	Lucius.	26
Hiatula.	54	Lumpen.	45
Hippocampus.	1	Lumpus.	87
Hippoglossus.	31	Lupus.	38, 39, 69
Hippurus.	28, 29	Lutius.	27
Hirundo.	18, 73, 74	Lyra.	74, 75
Holotheus.	84		
Huso.	92	M.	
Hystrix.	86		
		Mæna.	61, 62
I.		Mænas.	61
		Malleolus.	113
Ican.	78	Manathi.	109
Ichthyocolla.	92	Manati.	109
Iecorinus.	113	Manatus.	109
Iecur marinum.	113	Magio.	92
Jozo.	47	Marfio.	47
Iperuquiba.	28	Melanuros.	59
Julia.	53	Melanurus.	59
Julis.	53	Membras.	15
		Menerela.	61
L.		Merlangus.	34
Labeo.	118	Merluccius.	37
Labrus.	53, 54, 55, 56, 57	Merula.	6, 56
Laccia.	16	Merulus.	56
Lacertus.	50	Mesoro.	44
Lævi - Raja.	101	Milvago.	73
Lamia.	98	Milvus.	73
Lampetra.	89, 90	Miraletus.	101
Lampreda.	90	Misgurn.	3
Lavaretus.	19	Mixon.	118
Lechia.	51	Mola.	84
Lepus marinus.	87	Molva.	35, 36
		Molvus.	35
			Mono-

Pompilus.	pag. 29	Sardina.	pag.
Porcus.	68	Sargus.	9,
Praefmus.	4	Sauris.	
Pricka.	90	Saurus.	22,
Pristes.	93	Scarabæus.	
Pristis.	93	Scarus.	55,
Pryck.	90	Scheid.	
Pungitius.	80	Schilus.	
Pungitivus.	80	Schraitfer.	

Q.

Quadratulus.	30
--------------	----

R.

Rahas.	102	Scelopax.	
Raja.	99, 100, 101, 102	Scomber.	48, 49, 50,
Rayna.	4	Scombrus.	
Rayte.	102	Scorpena.	75,
Rana.	87, 88	Scorpenæ.	
Rapax.	8	Scorpena.	
Remora.	28	Scorpides.	
Reinfisch.	39	Scorpio.	76,
Rhina.	95	Scorpius.	
Rhinobatis.	99	Scorpius.	75, 76,
Rhinobatos.	99	Scrollus.	
Rhinobatus.	99	See - koejen.	1
Rhombus.	31, 32	Sera	
Rootaug.	5	Serpens marinus.	2, 41, 1
Roffe.	10	—— Rubescens.	1
Rotele.	6	Serra.	82,
Rubellio.	59	Sicus.	
Rubiculus.	10	Silurus.	110, 11
Rutilus.	6, 10	Silurus.	

S.

Sacchettus.	53	Simia.	
Sacer.	54	Smaris.	
Sachettus.	53	Smyrus.	
Salar.	23	Solea.	32,
Salmarinus.	24	Sparulus.	
Salmo.	22, 23, 24, 25, 26	Sparus.	57, 58, 59, 60, 62, 63, 64
Salpa.	60	Sphondelus.	
Sandilz.	29	Sphyrana.	1
Sarachus.	16	Sphyræna.	17, 1
Sarda.	16	Spigola.	
		Spinachia.	
		Spinarella.	
		Spirinchus.	

Sprat

<i>Spratti.</i>	pag. 17
<i>Squalius.</i>	7
<i>Squalus.</i>	93, 94, 95, 96, 97, 98
<i>Squalus.</i>	7
<i>Squamis.</i>	96
<i>Squatina.</i>	95, 96
<i>Squatino - Raja.</i>	99
<i>Squato - Raja.</i>	99
<i>Squatius</i>	95
<i>Steinbiza.</i>	3
<i>Strinfia.</i>	38
<i>Strömingus.</i>	15
<i>Strömlingus.</i>	15
<i>Stromateus.</i>	33
<i>Stromateus.</i>	34
<i>Stromatheus.</i>	34
<i>Sturio.</i>	91
<i>Sudis.</i>	113
<i>Sus.</i>	91, 114
<i>Sylurus.</i>	110
<i>Synagris.</i>	60
<i>Syngnathus.</i>	1, 2
<i>Synodon.</i>	60

T.

<i>Tachas.</i>	109
<i>Tania.</i>	114, 115
<i>Tania.</i>	3
<i>Tafelfisch.</i>	80
<i>Taurus marinus.</i>	109
<i>Tenca.</i>	111
<i>Teucha.</i>	5
<i>Thedo.</i>	23
<i>Thinnus.</i>	49
<i>Thricbebus.</i>	109
<i>Thunnus.</i>	49
<i>Thymallus.</i>	20
<i>Thymalus.</i>	20
<i>Thymus.</i>	20
<i>Thynnus.</i>	49
<i>Tiburo.</i>	98
<i>Tiburonus.</i>	98
<i>Tinca.</i>	5, 111
<i>Tirfio.</i>	104
<i>Tithymallus.</i>	20

<i>Tobianus.</i>	pag. 30
<i>Torpedo.</i>	103
<i>Trachina.</i>	70
<i>Trachinus.</i>	70, 71
<i>Trachurus.</i>	50, 51, 70
<i>Trebius.</i>	111
<i>Trichis.</i>	15
<i>Trigla.</i>	71, 72, 73, 74, 75
<i>Triscus.</i>	38
<i>Triffa.</i>	15
<i>Trirtz.</i>	23
<i>Tructa.</i>	23
<i>Trumpe.</i>	108
<i>Truta.</i>	23
<i>Truti.</i>	24
<i>Trutta.</i>	23, 24, 25
<i>Tunallus.</i>	21
<i>Turdus.</i>	55, 56, 57, 112
<i>Tursio.</i>	104, 105
<i>Typhle.</i>	1, 2

U.

<i>Varius.</i>	23
<i>Verith.</i>	16
<i>Vitta.</i>	115
<i>Umbla.</i>	25, 26
<i>Umbra.</i>	21, 65, 66
<i>Umbrina.</i>	65, 66
<i>Voca.</i>	61
<i>Uranoscopus.</i>	71
<i>Vrow. fisch.</i>	5
<i>Vulpecula.</i>	95, 96
<i>Vulpes.</i>	96

X.

<i>Xiphiar.</i>	47
<i>Xiphias.</i>	48

Z.

<i>Zeus.</i>	78
<i>Zidrach.</i>	1
<i>Zifius.</i>	48
<i>Zigena.</i>	96
<i>Ziphius.</i>	48
<i>Zigzua.</i>	96

I N D E X

N O M I N U M S U E C I C O R U M.

A bbor.	pag. 67	Haj.	pag. 98
Alkuffa.	111	Harr.	21
Anchovics.	17	Hav - nal.	2
Asp.	14	Horn - Gmpa.	77
Al.	40	Hwafsbuk.	17
		Hwitling.	34
Benlöja.	11	Hälgflundra.	31
Biörka.	13		
Biörk - fisk.	13	Id.	14
Biörkna.	13	Idbarn.	3
Blicca.	13		
Blicca.	19	Karp.	4
Brax.	4	Kollior.	36
Braxenpanka.	13		
Braxnaflicka.	13	Lake.	38, 111
Budd.	14	Lax.	23
Bäckrö.	24	Laxöring.	24
Börting.	24	Linnare.	6
		Lohi <i>fenn.</i>	23
Cabliä.	36	Longa.	36
		Löja.	11
Faren.	13		
Fjärfling.	71	Makrill.	49
Flygande - fisk.	74	Marsvin.	105
Forell.	24	Moiku <i>fenn.</i>	19
		Mudd.	14
Giers.	68	Mäl.	111
Giädda.	27	Mört.	10
Giös.	67		
Groenlands - Hwalfisken;	107	Neunögen.	90
Grälax.	23	Nors.	22
		Näbb.	

INDEX NOMINUM SUBCICORUM. 127

bgiädda.	pag. 27	Skrabba.	pag. 77
ting.	90	Små - Torfk.	35
		Stenbit.	24
d. Lapp.	26	Sten - Lake.	77
la.	5	Sten - Simpa.	77
is. fenn.	19	Stjnt.	19
ing.	26	Strömming.	15
le.	26	Stämm.	5
-simpa.	77	Stör.	91
	5	Sutare.	6
	19	Svärdfisk.	48
Läja.	19	Säg - fisk.	93
	15		
ygg - fisk.	87	Tobis.	90
tborr.	80	Tunga.	33
tpigg.	14, 80	Tong - Lake.	3
lryta.	77		
nakare.	6	Wimba.	14

INDEX NOMINUM DANICORUM.

orn.	pag. 67	Lüyer.	pag. 11
traper.	81	Makril.	49
ing.	71	Marfvin.	105
le.	27	Narhwal.	108
npel.	11	Nügnogen.	42
podde.	87	Rüdfchallig.	10
c.	19		
h.	68	Sandheft.	11
ag.	36	Schickpleder.	90
	36	Schwerdfisch.	71
			Sche-

Sehehanen.	pag. 74	Tandtheje.	pag.
Smelte.	22	Tungpleder.	
Snebbel.	19		
Springer.	106		
Store.	91	Ulk.	
Sydere.	6	Ulka.	

I N D E X

NOMINUM GERMANICORUM

A	pag. 19	Felchen.	pag.
Adelfisch.	40	Furn.	
Ahl	7		
Alat.	20	Gangfisch.	
Albelen.	11	Göbe.	
Alblen.	7	Grefling.	
Alet.	38	Grundel.	
Alraupe.	16	Gründeke.	
Alfen.	7	Gründling.	
Alte.	21		
Asch.		Häring.	
		Hasela.	
Barbe.	9	Hasler.	
Barble.	9	Hasle.	
Barff.	67	Hecht.	
Berfich.	67	Hering.	
Blauling.	19	Hessling.	
Blick.	13	Höuerke.	
Blicke.	11	Hornfiske.	
Bliegg.	11	Hufen.	
Brassam.	4		
		Jentling.	
Diebel.	7	Jefe.	
Digünen.	10	Jesen.	
		Jesitz.	
Elderitze.	12	Jesus.	
Elft.	6		
Elte.	7		

INDEX NOMINUM GERMANICORUM.

129

sche.	pag. 5	Scheid.	pag. 111
.	5	Schindel.	67
	4	Schley.	6
arfs.	68	Schleyen.	6
ig.	7	Schmerpütta.	3
en.	8	Schnot.	10
		Schnotfisch.	10
	23	Schoiden.	111
.	10	Scholle.	30
le.	10	Schomaker.	6
.	36	Schrolln.	68
		Schwal.	9
el.	49	Smerle.	2
ch.	10	Smerling.	2
fch.	16	Snepel.	12
e.	7	Steinbeisser.	3
en.	51	Steinbicker.	81
		Steinpicker.	3
aul.	67	Stinckfisch.	22
ng.	6	Stint.	22
augen.	90	Stöcker.	51
		Strever.	67
.	6	Stuver.	68
pe.	38	Stuerbarfs.	68
•	6	Treischen.	38
		Trüsch.	38
fe.	30	Urff.	6
ma.	4		
	8	Wäls.	111
.	8	Weisser Blauling.	19
alet.	8	Weisfisch.	11
gau.	19	Weisgang-fisch.	20
.	10	Witeke.	11
ig.	9, 10	Witinck.	11
ge.	10	Wyrfling.	6
n.	38	Vysfisch.	10
		Wysfisch.	19
it.	67		
rt.	8	Zumbelfischlein.	11

I N D E X

N O M I N U M B E L G I C O R U M

E perlan:	pag. 22	Potshoeft.	pag. 77
		Putael.	31
Hautin.	21	Schoemaker.	6
Hunchem.	74	Snoeck.	27
Outin.	21	Snottolff.	27
		Spirinch.	22
Pofch.	68	Spiring.	22
Post.	68	Suyger.	22

I N D E X

N O M I N U M A N G L I C A N O R U M

A nchovies:	pag. 17	Bream.	pag. 4
Angel - fish.	96	Bul.	31
Ape.	96	Bulcard.	45
		Bull - head.	77
Balance - fish.	96	Butterfly - fish.	44
Banlickle.	80		
Bastickle.	81	Carp.	4
Barbell.	9	Chab.	7
Bib.	35	Chevin.	7
Bleak.	11	Cock - padd.	27
Blew - Shark.	98	Cod.	35
Blinds.	35	Cod - fish.	35
Bosse.	70	Colefish.	35
Bounce.	97		

Conger

INDEX NOMINUM ANGLICANORUM.

131

Conger Eel.	pag. 40	Lesser Stickleback.	pag. 81
Crampfish.	103	Ling.	36
		Loche.	2
Dab.	33	Lug - aleaf.	32
Dare.	10	Lump.	87
Dolphin.	29, 105		
Dorce.	78	Macarell.	49
Duce.	10	Maids.	99
		Manalec.	109
Eel.	40	Millers.	77
Eelpout.	38	Minin.	12
		Minow.	12
Father - Lasher.	77	Monk.	96
Fin Fisch.	107	Morgay.	97
Finscale.	6	Mother.	16
Fire Flaire.	100	Mulgranoc.	45
Flaire.	102	Mullet.	52
Flounder.	31		
Fluke.	31	North caper.	106
Flyingfift.	18		
Frog - fish.	88	Old - Wife.	56
Garfish.	27	Peark.	67
Gilt Charre.	24	Pearl.	32
Gilt Head.	64	Picked dog.	25
Gilt - poll.	64	Pickerell.	27
Grampus.	106	Pike.	27
Grayling.	21	Pilchard.	16
Grey.	23	Pink.	12
Grey Gurnard.	74	Piper.	75
Grigs.	30	Plaife.	30
Groundling.	2	Pogge.	77
Gudgeon.	11	Poor.	36
		Porpeffe.	105
Hadock.	36	Pout.	38
Hake.	37	Pouting.	38
Herring.	15, 16	Power.	36
Holibut.	31		
Hornfish.	27	Raw - Pollack.	35
Horfe Mackrell.	51	Red Gurnad.	74
Hound - fish.	95	Roche.	10
		Rockfish.	46
Launces.	30	Rotchet.	74
Lampern.	90	Rough - hound.	97
Lamprey.	90	Rudd.	6
Lamprey Eel.	90	Ruffe.	68
		R 2	Salmon.

Salmon.	pag. 23	Sun - fish.	pag. 84
Sand - Eels,	30	Surmullet.	72
Saw - fish.	93	Sword - fish.	40
Schelley.	19		
Scurf - Bull Trout.	24	Tench.	6
Sea - Bream.	64	Thomback.	99
Sea - divel.	88	Toad - fish.	88
Sea - fox.	96	Tope.	97
Sea - Gudgeon.	46	Trout.	24
Sea - Owl.	87	Tub - fish.	73
Sea - Snail.	117	Tunny - fish.	50
Sea - Wolf.	39	Turbot.	31
Shad.	16		
Sharpling.	80, 81	Umber.	21
Sheat - fish.	111	Unprickly Hound.	94
Skate.	102		
Small Pilchard.	16	Weever.	71
Smelt.	22	Whale.	107
Smooth.	94	White Shark.	91
Sole.	33	Whiting.	34
Soul.	33	Whiting Pollack.	35
Spanish Mackrell.	50	Whiting - Pout.	38
Steckleback.	80	Wistle - fish.	37
Surgeon.	91	Wraffe.	56
Suckingfish.	28		

INDEX NOMINUM GALLICORUM

A blette.	pag. 11	Barblau.	pag. 9
Alofe.	16	Boga.	61
Anchovies.	17	Bordeliere.	13
Apron.	67	Boulerot.	46
Auriol.	49	Brochet.	27
Barbeau.	9	Capelan.	36
Barbel.	9	Carpe.	4
Barbiau.	9		

Chalot.

GALLICORUM.

133

ot.	pag. 77	Morme.	pag. 62
ic.	118	Mormo.	62
		Munier.	7
	10		
c.	78	Namantina.	109
lla.	53		
		Oblada.	59
an.	22		
le.	27	Pagel.	59
		Pagre.	64
ade.	102	Pal.	97
		Perche.	67
ne.	73		
on.	9	Raspecon.	71
is.	62	Rouget.	75
on.	11		
on.	11	Scorpena.	76
		Sole.	33
in.	17	Soul.	33
		Spet.	113
z.	61	Suiffe.	10
		Surmullet.	72
ntin.	109		
nde.	33	Tapecon.	71
e franche.	2	Testard.	7
n.	17	Trompette.	2
rmat.	75	Vaches Marines.	109
ude.	74	Vairon.	11
lole.	61	Vandoise.	10
us.	37	Veron.	12
liet.	101	Vilain.	7
	111	Viver.	71

I N D E X
NOMINUM ITALICORUM.

).	pag. 13	Afdelles.	pag. 53
ella.	27	Alboro.	59
	R 3	Anguella	

Anguella.	pag. 117	Gagnola.	pag. 6
Angusticula.	27	Gerruli.	6
Araneo.	69	Giroli.	4
Arboro.	59	Go.	4
Arzilla.	101	Goget.	4
Aquilone.	101		
Azio.	95	Laccia.	11
		Lacerto.	45
Barbio.	9	Lamiola.	91
Barbo.	9	Lampreda.	90
Barracoli.	101	Lampuga.	34
Bavosa.	102	Lascha.	9
Bezola.	19	Lavaret.	19
Boga.	61	Leccia.	8
Bronchini.	69	Licette.	31
Bronco.	40	Lucerne.	71
Brucho.	100	Lucio.	27
Bruco.	100	Luzzo.	27
		Luzzo marino.	113
Canosa.	97		
Capo grosso.	77	Macarello.	49
Capone.	73	Marfione.	47
Carpena.	4	Martino Pescatore.	88
Castagnole.	63	Maxon.	118
Cavallo Marino.	1	Menchina di re.	53
Cefalo.	52	Menelo.	61
Ciambetta.	96	Menola.	61
Citula.	78	Merluzo.	37
Clupea.	16	Mesoro.	44, 71
Cocco.	73	Meffore.	77
Colpescce.	92	Mollo.	36
Copso.	92	Monachelle.	63
Corvo.	65	Morello.	12
		Morena.	42
Dentale.	60	Mormillo.	62
Donzella.	53	Mormiro.	62
Donzellina.	37, 53	Mourene.	42
		Mucosa.	102
Emperador.	48		
		Occhiata.	59
Falcone.	74	Ochiatella.	103
Fico.	111	Ora.	64
Ficus.	111	Orata.	64
Fragolino.	59	Organie.	75
Frangolino.	59	Organo.	73
		Paga-	

Paganello.	pag. 47	Savetta.	pag. 7
Pagro.	59, 64	Sauro.	51
Papagallo.	55	Scatto.	32
Percia.	69	Scazone.	95
Perfega.	67	Scombros.	49
Perfego.	67	Scorzono.	97
Pesce Angelo.	96	Scrofano.	76
---- Balestra.	114	Scrofanello.	76
---- Capone.	75	Soagia.	32
---- Columbo.	83	Sopraciolo.	54
---- Forca.	75	Sorge Marina.	37
---- Gatto.	97	Soffietta.	82
---- Parfico.	67	Sparo.	58
---- Porco.	95	Spigola.	69
---- Prete.	71	Squaglio.	7
---- Ronding.	18	Strivale.	79
---- Son Pietro.	78	Sturione.	91
---- Spada.	48	Sveta.	7
Pignoletti.	47		
Pisce ragno.	71	Tarantola.	22
		Temelo.	21
Raijna.	4	Tenca.	6
Re di Triglia.	73	Tenca Marina.	111
Rhombo.	32	Tordo.	112
Riondo.	79	Trombetta.	82
Rondire.	74	Trotta.	24
Rotula.	78		
		Verdone.	112
Sagree.	95		
Salamandrino.	24	Zigorella.	53
Salmarino.	24	Zigurella.	53
Sanguinerola.	12	Zillo.	53
Sarpa.	67	Zolcro.	46

I N D E X

NOMINUM HISPANICORUM.

Carallo.	pag. 49	Pagel.	pag. 1
Dorade.	64	Pezze Mouler.	11
Gal.	78	Pieze Pogador.	1
Lupo.	70	Piezo Pioltho.	1
Muger.	109	Saccolos.	1
		Serrau.	1
		Volador.	7

M I S C E L L A N E A.

Bocca in Capo.	pag. 71	Galeetto Livonis.	pag. 4
		Glano Byzantinis.	11
Cojumero Guajanis.	109	Harcha Pannonibus.	11
Dujong } Amboinenfibus.	109	Monathi } Hispaniolensibus.	11
Dujung }		Monati }	
Fabro Dalmatis.	78	Sum Polonis.	1

I N D E X

N O M I N U M G R Æ C O R U M.

Αγνος.	pag. 71	Βοῶς.	pag. 101
Ἀδωνις καὶ ἐξώκοιτος.	18	Βέγλοσση.	32
Ἀετός.	100	Βέγλοσσος.	32
Ἀθέρια.	116	Βῆς θαλάττιος.	101
Ἀθέρην.	116	Βώκη.	61
Ἀκανθίας γαλέος.	94	Βωξ.	61
Ἀκκιπήσιος.	91		
Ἀλίας βάτον.	87	Γάδος.	37
Ἀλφησαί.	56	Γαλεός.	94
Ἀλωπέκίας.	96	Γαλεός ασηρίας.	94
Ἀλώπηξ.	96	Γαλεός κύων.	97
Ἀλωπηξ.	96	Γαλέος λεῖος.	93
Ἄμια.	51	Γλανίς.	110
Ἀγδίας.	54	Γλαυκός.	51
Ἀγτακαῖος.	92	Γλαῦκος.	98
Ἄρας.	15	Γόγγρος.	40
Ἀσερίας.	94		
Ἄφουα κωβίτις.	47	Δελφίν.	105
		Δελφίς.	105
Βάλερος.	12	Δελφίς ἴνος.	105
Βατίς.	bis. 102	Δράκων.	70
Βάτος.	102	Δράκων θαλάττιον.	70
Βάτραχος.	87		
Βάτραχος ἀλιάς.	87	ἐγγράυλεις.	feu. 17
Βάτραχος ἀλιεύς.	87	Εγκραββικόλοι.	17
Βέλενος.	44	ἐγχέλυς.	39
Βελόνη.	27	ἔλλαψ.	92
Βελόνη θαλάττια.	27	ἔλαψ.	92
Βλέννος.	44	ἐμεροκόιτης.	71
Βοκτος.	76	ἐνκραυλος.	17
<i>Artedi Synonymia.</i>		S	Εξα-

ἔξωκοίτος.	pag. 18	Κεντρίτη.	pag. 95
ἐρυθρικός & ἐρυθρινός.	59	Κεζρέα.	52
ἐρυθρινός.	59	Κεζρέος & Κεζρέα.	52
Ερυθρινός.	59	Κεζρεύς.	52
Ερυθροφθάλμος.	5	Κέφαλος.	52
Εχενής.	28	Κιθάρος.	116
ἑψητός.	117	Κίχλαι.	56
		Κίχλη.	112
Ζάυρος.	22	Κόγγρος.	40
Ζύγαινα.	96	Κοῖρος.	114
Ζύγαννα.	96	Κορακῖνος.	65
		Κοράξ.	77
Ἡπατος.	113	Κόσσυφοί.	5
Ἡπατος, seu λεβιάς.	113	Κόσσυφος θαλάττιος.	55
		Κοττός.	78
Θαλάττια αλώπηξ.	96	Κότυφος.	55
Θαλάττιος.	37	Κυπριανός.	3
Θρίσσα.	15	Κυπρίνος & κυπριανός.	3
Θύμαλλος.	20	Κυπρίνος μέλας.	4
Θυμός.	20	Κύων θαλάττια.	68
Θύννος.	49	Κωβίος.	bis. 46
		Κωβίος λευκός.	47
Ιερᾶξ.	73	Κωβίος λευκότερος.	47
Ἰερηξ.	73	Κωβίτης.	47
Ἰελίς.	53		
Ἰἔλις.	53	Λάβραξ.	69
ἰπποκαμπες.	1	Λαμία.	98
ἰππῆρος.	28	Λάμνη.	98
ἰππερος.	28	Λεβιάς.	113
		Λειόβαλος.	101
Καλλιώνυμος.	71	Λυκόσομοι.	17
Καλλυώνυμος.	71	Λύρα.	75
Κάνθαρος.	58		
Κάνθαρος θαλάττιος.	58	Μαϊνίς.	61
Καπρίσκος.	114	Μελάνθερος.	58
Κάπρος.	78, 114	Μορμύλος.	62
Καρκαρίας.	98	Μόρμευρος.	62
Κεντρίνη.	95	Μύζων καὶ μύζων.	118
		Μύσαννα.	

Μύραινα.	pag. 41	Σίλβρος.	pag. 110
Μύρος.	40	Σκάρος.	54
Μύς.	114	Σκίαίνα.	65. 66
Μυσικήτος.	bis. 107	Σκίαννα.	65
		Σκόμβρος.	48
Νάεκη.	109 bis. 103	Σκορπίος.	bis. 75
		Σκορπίς.	75
Ξιδός.	59	Σκύλιον.	97
Ξιφίας.	bis. 47	Σκύμνος.	97
		Σμαρίς.	62
Ονίσκος.	91	Σπάρος.	57
ὄνος.	bis. 36	Στρωματεὺς.	33
Οξύρυγχος.	quater. 26	Συναγείς.	60
Οξύρυγχος.	102	Σύνοδον.	60
ὀρεκύνος.	49	Συνόδον καὶ συναγείς.	60
ὀρεκύνος.	50	Σφύραινα.	26. 112
Ορεφός.	63		
Ορεφός.	63	Ταινία.	114
Ουρανοσκόπος.	71	Τραγών.	100
ὀφίς θαλάττιος.	41	Τραχέρος.	50
		Τραχέρος.	50
Πέρεκη.	66. bis. 68	Τρίγλα.	71
Πηλαμῖς.	50	Τρίγλη.	72
Πηλαμυς.	50	Τρυγών.	100
Πόμπιλος.	29	Τρωκτης.	51
Πρηῆτες.	93		
Πρίτης.	93	Υς.	114
Ραφίς.	27	Φάγρος.	64
ῤίγη.	95	Φοξινός.	12
ῤινόβασις.	99	Φυκίς.	111
ῤόμβος.	31	Φύσαλος.	107
ῤυάς.	57	Φώκαινα.	104
		Φωλῖς.	116
Σάλπη.	60		
Σάργος.	58	Χαλκίεος.	78
Σαύρος.	50	Χάλκισ.	14
Σιλβρος.	110	Χάλλων καὶ χέλων.	118

Χάνη.	pag. 54	Χρέμψ, χρομῖς καὶ χρω-	
Χάννη.	54	μῖς.	pag.
Χάννος.	54	Χρόμῖς.	
Χάραξ.	5	Χρυσόφρως.	
Χελιδών.	18	Χρύσοφρως.	
Χελιδών.	73	Χρώμῖς.	
Χοῖρος.	68		
Χοῖρος ποτάμιος.	68	Ψῆττα.	
Χέκκυξ.	74	Ψῆτται.	
Χόρδυλος.	50	Ψύλων.	

A U T O R E S.

<i>Aëtior</i> Aëtior, obscurus author.	<i>Jonston</i> . Jonstonus.
<i>Ælian</i> . Ælianus.	<i>Jov</i> . Jovius.
<i>Albert</i> . Albertus magnus.	<i>Mangolt</i> . Mangoltus.
<i>Aldrov</i> . Aldrovandus.	<i>Marcgr</i> . Marcgravius.
<i>Ambros</i> . Ambrosius mediolanensis.	<i>Massar</i> . Massarius.
<i>Apul</i> . Apulejus.	<i>Oppian</i> . Oppianus.
<i>Aristot</i> . Aristoteles.	<i>Ovid</i> . Ovidius.
<i>Assel</i> . Asselen.	<i>Platear</i> . Platearius.
<i>Athen</i> . Athenæus.	<i>Plin</i> . Plinius.
<i>Avicen</i> . Avicenna.	<i>Pis</i> . Pifo.
<i>Auson</i> . Ausonius.	<i>Raj</i> . Rajus Synopf. piscium.
<i>Auctior</i> . Auctor de natura rerum.	<i>Rzac</i> . Rzaczynski.
<i>Byzant</i> . Byzantinus.	<i>Rondel</i> . Rondeletius.
<i>Cassid</i> . Cassidorus.	<i>Salvian</i> . Salvianus.
<i>Charlet</i> . Charleton.	<i>Sibbald</i> . Sibbaldus de balænis.
<i>Columel</i> . Columella.	<i>Seasipp</i> . Seasippus.
<i>Column</i> . Columna.	<i>Sloan</i> . Sloane hist. jamaicæ.
<i>P. Figul</i> . Publius Figulus.	<i>Schwenckf</i> . Schwenckfeld.
<i>C. Figul</i> . Carolus Figulus.	<i>Schonev</i> . Schoneveldus.
<i>Gesner</i> . Gesnerus.	<i>Solin</i> . Solinus.
<i>Grew</i> . Grew. museum Soc. Angl.	<i>Strab</i> . Strabo.
<i>Gyll</i> . Gyllius.	<i>Varr</i> . Varro.
<i>Hermol</i> . Hermolaus Barbarus.	<i>Willughb</i> . Willoughbejus.
<i>Hildegard</i> . Hildegardis Abbatisa.	<i>Wotton</i> . Wottonus.
<i>Imperat</i> . Imperatus.	

PETRI ARTEDI
SUECI
DESCRIPTIONES

SPECIERUM PISCUM

QUOS VIVOS PRAESERTIM DISSECVIT ET EXAMINAVIT,
INTER QUOS PRIMARIO

PISCES

REGNI SUECIAE

FACILE OMNES

ACCURATISSIME DESCRIBUNTUR

CUM NON PAUCIS ALIIS

EXOTICIS.

ICHTHYOLOGIÆ PARS V.

EDITIO II.

GRYPESWALDIÆ,
IMPENSIS ANT. FERDIN. RÖSE 1793.

LECTORI

S.

C. LINNÆUS.

Obstupesceres certe Lector, si vidisses ipse, qua constantia & assiduo, nec defatigando labore, Pisces suos descripserit Auctor, qui non delassatus integros plures dies in unius Piscis descriptione consumsit; vidisses quam adcurata manu singulas pinnas, inque his singulos radios, non semel sed pluries numeraret; quomodo omnes vertebrae distinctas numeraret, describeret; ut hic Tibi specimen sit verum, secundum quod, si pisces describas, felix eris. Nullus certe umquam Pisces adcuratius examinavit.

Pisces plurimos suos descripsit UPSALIÆ in Suecia, ex lacu adfluente MÆLERO extractos, ubi per annos bene multos vixit, nec paucos in NORLANDIA SUECIÆ, quam visitabat anno 1728 & 1729; varios dein in itinere maritimo, dum *Angliam* peteret 1734, nec non aliquot in ipsa Anglia 1735; paucos dein in *musæis* Curiosorum adumbravit.

INDEX

INDEX GENERICUS.

Ammodytes.	spec.	1	pag.	55	Mugil.	spec.	1	pag.	71
Balæna.	—	1	—	106	Murena.	—	1	—	66
Chætodon.	—	7	—	89	Osinerus	—	1	—	45
Clupea.	—	3	—	31	Perca.	—	3	—	74
Cobitis.	—	1	—	4	Petromyzon.	—	1	—	99
Coregonus.	—	4	—	37	Pleuronectes.	—	6	—	57
Cottus.	—	4	—	82	Raja.	—	1	—	103
Cyprinus.	—	16	—	6	Salmo.	—	5	—	48
Esox.	—	1	—	53	Scomber.	—	1	—	68
Exocoetus.	—	1	—	85	Silurus.	—	1	—	107
Gadus.	—	4	—	62	Squalus.	—	1	—	102
Gasterosteus	—	2	—	96	Syngnathus.	—	4	—	1
Lepturus	—	1	—	111					

I N D E X NOMINUM SUECORUM.

Abbor.	pag.	74	Moiku.	pag.	40
Åsp.	—	14	Mudd.	—	30
Beckrö.	—	51	Neinögen.	—	—
Biörkna.	—	20	Nors.	—	45
Blicka.	—	23	Räcka.	—	103
Blickta.	—	40	Røding.	—	51
Braxen.	—	20	Røfisk.	—	51
Faren.	—	23	Ruda.	—	29
Flondra.	—	57	Sarf.	—	9
Flygande-fisk.	—	35	Skælryta.	—	86
Forell.	—	51	Skrabba.	—	86
Giædda.	—	53	Skomakare.	—	27
Giers.	—	80	Sijk	—	37
Giös.	—	76	Siklöja.	—	40
Hafsnäl.	—	1	Skumm.	—	45
Harr.	—	41	Spigg.	—	86
Hwahl-fisk.	—	106	Spratt.	—	32
Hwitling.	—	62	Stenbit.	—	51
Hornsimpa.	—	84	Stensimpa.	—	82
Id.	—	6	Stenn.	—	12
Karp.	—	24	Stint.	—	40
Kollia.	—	54	Strømning.	—	31
Lake.	—	107	Sutare.	—	27
Lax.	—	48	Tånglake.	—	4
Laxunge.	—	50	Tobis.	—	55
Linnare.	—	27	Torfk.	—	63
Löja	—	17	Tunga.	—	60
Makril.	—	68	Al.	—	66
Mört.	—	10	Alalöja	—	17

MALA-

MALACOPTERYGII.

SYNGNATHUS, G. Pisc. I.

1. **SYNGNATHUS** *teres*, pinnis pectoralibus caudaeque carents. P. A.
Acus lumbriciformis seu Opbidion lumbriciforme, Raji syn. 47. Hafsñål. Suecis.
 1. *Caput* admodum longum, angustum, tenue, cathetoplateum, osseum; *Mandibula* à lateribus clausæ; *Os* in extremo rostri tantum, exiguum; Hinc *Rictus* angustissimus. *Mandibula* seu pars oris inferior magis mobilis est & tantillum longior superiore seu sursum spectans, unde Operculo quasi rictus oris tegi videatur.
 2. *Corpus* longum, gracile & fermè teres, vel tantillum cathetoplateum. *Color* corporis unicus ab obscure cano ad viridescentem vergens.
 3. *Oculi* exigui, in posteriore capitis parte, à lateribus membrana pellucida tecti. *Iris* lutescens.
 4. *Narium* duo utrinque foraminula, oculis admodum vicina, non nisi in majoribus conspicua.
 5. *Dentes* nulli perceptibiles nec visibiles.
 6. *Opercula* Branchiarum inferius non aperta, ut in maxima Pisium parte, sed supernè in cervice ad finem horum operculorum *Foraminula* duo angustissima, foramen aciculæ ordinaria in papyro factum æquantia, utrinque se. unum.
 7. *Squamæ* nullæ, sed cutis nuda. Ipsum v. corpus in annulos vel circulos quasi diiditur, lumbricorum ferè instar.
 8. *Longitudo* 8 unciarum, & sæpe minor. *Craffitiæ* in medio corpore pennæ Anserinæ æmula.
 9. *Amis* in medio corpore, vel caudæ quam rostro paulo propior. *Cauda* non in pinnam, sed in acutam cuspidem, in extremo filii crassioris instar tenuem, desinit.
 10. *Pinna* in toto pisce unica duntaxat, eaque in dorso è regione Ani, ossiculorum triginta quatuor, ejusdem ferè longitudinis, membrana tenui albescente conjunctorum.
 11. *Branchiæ* utrinque quatuor vel potius Viscus pulmonare obscure rubescens, à lateribus gulæ.
 12. *Pisculus* marinus est & in sinibus maris Baltici ad Angermaniam Sueciæ satis frequens.
- Arædi Synonymia. A Lon-

2 *Malacopterygii,*

Syngnathi.

Longitudo Tota.	unc. 8. lin. 6.
Long. ad medium oculi.	2.
finem Maxillæ.	4½.
Pinnam dorsi.	4. 3.
ad Anum.	4. 5.
finem pinnæ dorsalis.	5. 2. ferè.
Latitudo perpendicularis in corpore, ubi latissimum.	1½. circiter.
ad Anum.	½. circiter.

II. *SYNGNATHUS* corpore medio heptagono, cauda pinnata;

Acus Aristotelis species altera, major. Willoughby, p. 159.

1. Membranz branchiarum officulorum 2. Anus rostro quam caudæ vicinior.
3. Caput; Mandibulæ: Os; Rictus: Oculi; Opercula Branchiarum exigua quidem, superne pone occiput, non rotunda, sed parva & longa &c. ut in præcedente specie.
4. Corpus oblongum ut in præcedente, sed minime teres, à Capite enim ad Anum heptagonum est, inde ad finem pinnæ dorsalis hexagonum, abhinc vero ad extremum caudæ quadrangulare & sensim gracilescens, oculi a lateribus subrotundi cute laxa tecti.
5. Corpus totum laminis quibusdam striatis & quadammodo quadrangulis undique integitur. Color ex rufo fuscescens.
- * Nares utrinque duplices proxime ante oculos.
6. Pinnæ Pectorales duæ, admodum subrotundæ, breves, officulorum 14 vel 15, latæ, perpendiculariter fere sitæ, ventri quam dorso paulo propiores. Pinnæ ventrales nullæ.
7. Pinna in dorso unica, caudæ propior quam Anus, officulorum 35 à 36 in apice indivisum & ejusdem fere longitudine.
8. Cauda in pinnam radiatam definit, officulorum 10 in apice non divisum. Cauda expansa rhombum fere representat.
9. Pinna proxime infra Anum exilissima, officulorum 3.
10. Pars Capitis inter oculos & os cathetoplatea est & eandem fere latitudinem habet ac corpus proxime infra Anum. Corpus à capite ad Anum in 18 laminas divisum, ab ano ad caudam in 36 & interdum 37, in minoribus a. 35 tantum numerare potui variant enim uno vel altero numero, quod in diversis individuis hujus speciei clare expertus sum.

Longitudo tota.	unc. 4. lin. 3.
Long. ad oculum.	5.
Pinnam dorsi & Anum	2. 1.
Ejusdem finem.	2. 6.
Pinnam Caudæ.	4. 3.

Ejus.

Ejusdem finem seu long. tota.	4.	5.
Latitudo maxima.		2. ferè.
Longitudo descripti.	7.	7.

III. *SYNGNATHUS corpore medio hexagono, cauda pinnata.*

1. Capitis figura, corpus, dorsum, Venter, Anus, Os, maxillæ, Nares, oculi, Aperturæ Branchiarum, Membr. Branchiofste-gæ, Linea lateralis nulla, Pinnar numerus & situs ut in præcedente specie sese habent, sed
2. *Rostrum* seu caput anterius multo angustius & ambitu catheto-plateo subrotundo, ea circiter latitudine ac corpus extremum paulo ante caudam.
3. *Lamina* corporis à capite ad Anum 19 & interdum 20; ab Ano vero ad caudam 43 & interdum 44; In non adultis pauciores numerantur, variant enim paulum.
4. *Pinna* Pectorales off. 12 tantum indivisorum;
Pinna dorsalis off. 38 f. indivisorum.
Pinna Ani exilis off. 5. circiter.
5. Cauda in extremo æqualis fere, non vero subacuta ut in præcedente specie, off. 10 indivisorum.
6. Figura seu Anguli corporis, omnino ut in præcedente specie sese habent.
7. Longitudo interdum Unciarum; Latitudo maxima linearum 5.
8. Ex utraque specie (2 & 3.) & Mares & Fœminas vidi: fœminæ à Maribus optime distinguuntur Vesica quadem magna & longa, quam proxime infra Anum, ad dimidiam partem inter Anum & caudam, extensam obtinet. In hac Vesica Ova continentur plurima, numero tamen multo pauciora, quam in aliis piscibus *Osteropterygiis*, magnitudine in adultis multo majora quam semina raparum, colore lactescentia. Vivipares quodammodo dici possunt, nam rudimentum fœtus, dum e vesica provenit, vivum est. Tempore quodam, antequam parit, tota rima dehiscit.
9. Membrana Branchiofste-ga exigua quidem, sed tam in hac, quam in præcedentibus speciebus, duo utrinque ossicula gracilia tertia & parum conspicua continet.

IV. *SYNGNATHUS corpore quadrangulo, pinnæ caudæ carens.*

1. Caput, Figura & latitudo rostri, dorsum, Os, maxillæ, Nares, Oculi, Aperturæ Branchiarum, Membranæ Branchiofste-gæ, corpus e laminis ossiis quasi compositum, Linea lateralis nulla, ut in præcedente specie (3) sese habent, sed
2. *Eminentia* utrinque subaculeata & brevis à postica parte orbitalium, ut & tres eminentiæ in occipite proxime ante Aperturam Bran-

Branchiarum; Initium dorsi subacutum ut in 3tia specie, quod in 2da desideratur.

3. *Anus* extremitati caudæ quam rostro vicinior, contra quam in duabus speciebus præcedentibus.
4. *Corpus* à capite ad Anum quadrangulum apparet, sed lateribus inæqualibus, nam infimum reliquis latius est, & supremum reliquis angustius. Infimum v. non omnino planum, sed tres angulos exiguos continet seu quatuor latera minora, ita ut piscis, si accurate inspicimus, in medio corpore quodammodo heptagonus sit: Ab Ano ad finem pinne dorsalis hexagonus est, sed lateribus aliter comparatis quam in duabus præcedentibus speciebus, latitudo enim corporis, hoc loco magis plagioplatea quam perpendicularis est, contra quam in illis & angulus lateralis medii non deficit ad initium pinne dorsalis, ut in duobus præcedentibus, sed uno tramite continuatur. A fine pinne dorsalis vel ad medium caudæ quadratus est, deinde exiguuo spatio pentagonus quasi evadit, reliqua pars ad extremum caudæ quadrata est, sed angulis contrario modo sitis quam in anteriore parte.
5. *Corpus* extremum à fine pinne dorsalis ad finem caudæ multo magis gracilescit & angustius est respectu, quam in præcedentibus 2bus speciebus.
6. Numerus *Laminularum* à capite ad Anum 17, ab ano vero ad extremum caudæ 45 circiter, nam extremæ ab parvitate numeratu difficiles sunt.
7. *Cauda* in extremo subacuta & apterygia erat, nec ullum signum aderat, quo colligere liceret, ei caudam adfuisse.
8. *Pinna* in dorso humilis, off. 35 vel plurimis, numeratu admodum difficilia sunt. Pinne Pectorales exigue. P. Ani nulla in pisce sicco aderat. Color totius corporis albescens.
9. *Longitudo* descripti 6 unc. 3 lin. circiter. Non cartilagineus est, sed spinam dorsi osseam intus continet. Vertebrae longæ.

COBITIS, G. Pisc. 2.

I. *COBITIS aculeo bifurco infra utrumque oculum, Cobitis barbarula, aculeata. Auctorum.*

Tänglake ad Lacum Melerum & prædium Wälsätra Succis dicitur.

1. *Caput* Cathetoplateum, oblongum. *Rostrum* ad inferiora flexum seu resimum.
2. *Corpus* cathetoplateum & satis tenue, ejusdem fere ubique latitudinis.

3. *Man-*

3. *Mandibula* vel rostri pars Superior ante inferiorem prominens, eam recipiens & claudens pyxidis modo.
Rictus angustissimus.
4. *Cirri* exigui & graciles, sed longiusculi & albi circum Os, sc. duo minores supernè in rostro, duo ad latera Oris, & duo majores infernè in parte inferiore Oris, numero sunt sex.
5. *Nares* medio inter oculos & rostrum.
6. *Oculi* exigui in summa parte à lateribus capitis. *Iris* infernè alba, supernè obscura.
7. *Aculeus* bifureus utrinque pone nares infra anteriorem oculorum partem, apex seu uncus aculei exterior, minor & brevior est interiore, utrique albi & acutissimi.
8. *Branchiæ* utrinque quatuor. *Opercula* Branchiarum oblonga, à lateribus tantum juxta Pinna Pectorales, sed non inferius aperta.
9. *Dentes* nulli perceptibiles aut visibiles in ore.
10. *Linea* lateralis vix visibilis.
11. *Squamæ* adeo exiles, , ut vix nisi in pisce siccato conspici possint.
12. Dorsum & præcipue *latera* Lineis aliquot vel lituris albescentibus, longitudinalibus & præterea punctulis minimis & creberrimis; obscuris vel nigrescentibus notata; dorsum magis obscurum est. *Venter* albus.
13. *Pinnæ Pectorales* $3\frac{1}{2}$ lineas longæ, officulorum octo, quorum unum in apice indivisum, ædum maximum, una cum cæteris omnibus in apice ramosum seu bifidum. *Pinnæ* albescentes.
14. *Pinna* in *dorso* unica, maculis obscuris vel nigrescentibus notata, officulorum novem, quorum primum maximum ferè & indivisum, reliqua in apice bifida, ultimum minimum & simplex.
15. *Pinnæ Ventræles* albescentes, officulorum septem, primum indivisum, cætera in apice ramosa, secundum maximum.
16. *Pinna Ani* albens, $3\frac{1}{2}$ linea ab Ano distans, officulorum octo, quorum prima duo indivisa ut & ultimum, *Duo* extrema brevia & exigua.
17. *Cauda* maculis fuscis & nigris notata, 4 lineas longa, in extremo subrotunda, officulorum octodecim, quorum duo extrema utrinque indivisa in apice, cætera ramosa; extremum officulum utrinque exiguum.
18. *Prominentia* quædam exigua infra Anum, proxime ante Pinna Ani.
19. *Cor* exiguum, magnitudine seminis Cannabini.
20. *Hepar* longum, rubescens, Intestino vel Ventriculo superincumbens & membrana conjunctum. *Vesica* felleis exigua, ad partem Hepatis superiorem.
21. *Intestinum* simplex, recta ad Anum extensum.

6 *Malacopterygii.*

Cobitis.

Longitudo Tota.	unc. 3. lin. 3.
ad medium Oculi.	2½.
Pinnas Pectorales.	6. f.
Pin. dorsalem.	1. 4½. vel 5. f.
Pin. Ventrates.	1. 5½. vel 6.
finem Pinnæ dorſi.	1. 7.
Pinnam Ani.	2. 2.
Ejusdem finem,	2. 4.
Caudam,	2. 8.
Latitudo Perpendicularis:	
ad medium Oculi.	4½.
Pinnas Pectorales & Dorsalem,	3½.
Pinnam Ani.	3. f.
Ejusdem finem, ut & ad caudæ initium,	2½.

CYPRINUS, G. Pifc. 3.

- I. *CYPRINUS iride sublutea, pinnis ventralibus anique rubris.*
Id Suecis Upsaliensibus &c.
1. *Os* edentulum, ut & Palatum & lingua glabra; sed *Dentes* quinque majores utrinque in initio Gulz vel rectius Ventriculi, robusti, ossei & albissimi, superne parum quasi curvati, infernè lati, quorum medii reliquis sunt majores: præterea duo minores à latere interiore majorum sunt, omnes v. septem communi cuidam ossi innascuntur. Præter hos autem aliquot minores infra in membranis musculosis obſconditi latent, qui ossi prædicto non adhærent. His omnibus Os submolle & quodammodo triangulare in superiore faucium vel palati infima parte respondet & è regione positum est.
2. *Capus* crassum, superne latum e cano nigrescens, ad latera vero seu in Operculis branchiarum ex aureo & argenteo colore mixtus splendens, & plurimis Punctulis nigrescentibus velut irroratum.
3. *Nares* magnæ, duplici utrinque Apertura præditæ, oculis quam extremo rostro paululum propiores.
4. *Mandibula* ejusdem fere longitudinis, ore tamen clausæ; superior ante inferiorem tantillum prominet.
5. *Oculi* ad latera capitis siti, situ multo humiliori quam *Nares*, præter Tunicas proprias nulla membrana testæ.
6. *Iris* lutescens, in suprema parte vero obscura seu cano-nigrescens & præterea tota punctis exiguis nigris veluti irrorata.

7. *Dor.*

7. *Dorsum* à capite parum admodum assurgens; Venter v. multo magis prominet & multum latior est dorso. Unde latitudo Piscis major à Ventre prominente, quam à dorso assurgente provenit.
8. *Opercula* branchiarum ut in reliquis; membrana branchiostegaria utrinque officula continet.
9. *Squamæ* magnæ, quatuor striis ad anteriorem partem plerumque notatæ; in Ventre coloris albi argentei cum tantillo rubore diluti: in lateribus argentei quidem paulo obscurioris, sed in interstitiis seu conjunctionibus, membrana nigrescente quoad superiorem partem tectæ, et sic obscuratæ: in Dorso autem coloris cano - nigrescentis, ita tamen, ut exinde aliquid argentei transluceat. Squamæ non omnino imbricatim, sed recto ordine se invicem excipiunt, præcipue caudam versus.
10. Corpus ab Ano ad caudam infernè admodum notabiliter angustatur. Spatium v. inter Anum & Pinnas Ventrals in carinam acutam non contrahitur notabiliter, ut in quibusdam hujus Generis. Totum dorsum tam ante, quam post Pinnam, convexum est: Venter planus.
11. *Linea lateralis* curva, Ventri quam dorso paulo propinquior & Ventri quoque parallela fere.
Nota ad §. 9: Squamæ non omnino imbricatim, sed recto quoad partem ordine ponuntur, præcipue caudam versus.
12. Pinna in dorso unica ad posteriorem corporis medietatem magis sita, cano nigrescens, radiorum undecim quorum duo primi indivisi sunt, cæteri vero in apice multum ramosi: Primus quoque secundo dimidio brevior, 2dus & 4tus longissimi, imprimis tertius.
13. *Pinnae Pectorales* duæ, obscurè canæ, & interdum in apice rubentes circiter (nam ultimi ægre numerantur), quorum primus indivisus, cæteri vero in apice ramosi: Primus, 2dus, 3tius & 4tus ejusdem fere longitudinis sunt, sed 2dus & 3tius tantillum longiores.
14. *Pinnae Ventrals* rubræ, situ anteriori quam dorsalis, radiorum decem, quorum duo primi indivisi, reliqui in apice admodum ramosi, 2dus, 3tius, 4tus & 5tus, ejusdem fere longitudinis sunt. Primus admodum exiguus est. Ad superiorem hujus Pinnæ partem Apophysis quædam squamosa adest. Officulum primum harum pinnarum omnino simplex in radice est.
15. *Pinna Ani* rubra, radiorum tredecim, quorum duo vel tres primi indivisi, cæteri in apice admodum ramosi: Primus est exiguus, 2dus tertio duplo brevior, 3tius & 4tus longissimi.
16. *Cauda* lata, sed non multum bifurca ut in quibusdam hujus generis, cano - nigrescens, ad exortum vero tantillum rubescens, præsertim si luce obversatur, radiorum 19 longorum præter extremos.

17. Anus magnus & parum prominens.
18. *Branchia* utrinque quatuor, duplici nodorum vel tuberculorum ordine singulæ donatæ, quarum nodi exteriores pectiniformes sunt & triplo vel duplo longiores quam interiores, imprimis vero in branchia utrinque extrema seu maxima.
19. *Locus* lacus, fluvii & sinus Maris Baltici.
20. *Intestinum* primo ad Anum fere recta extensum, deinde semel ad diaphragma reflexum, & tum secundo ad Anum iterum productum, ubi terminatur. Ventriculus ab intestino vix distinctus, saltem paulo amplior.
21. *Hepar* longum admodum, secundum intestina extensum, in 3 lobos divisum, coloris rubri, cum cystide satis magna.
22. *Lien* ex duobus lobis quasi constans, saturate obscure ruber, sub intestino situs.
23. *Ovarium duplex*, secundum totam abdominis cavitatem extensum, septem uncias & 3 vel 4 lineas longum. Uterque ovarii lobus ad superiorem partem quasi filo confringitur transversim, & in apice superioris partis in prominentias quasi dividitur. Ova intus sunt innumera, flavescentia, membranâ tenui inclusa, quæ facillimè separatur & à contactu levi laceratur.
24. *Peritoneum* argentei coloris, arteriis minutissimis pulchre ornatum.
25. *Vesica aëra* magna, quinque uncias circiter longa, argentei coloris, cujus pars interior seu major arteriis aliquot satis magnis irrigatur; superior pars seu venter multo minor est, & ex duplici membranâ constat, quarum exterior crassa est & facile detrahi potest.
16. *Canalis vesicæ* à gula ortum ducens benè conspicitur, & in partem majorem seu inferiorem vesicæ juxta ejus exortum vel initium terminatur.
27. *Caro* sapida & subdulcis, sed ossiculis bifurcis ad partem anteriorem imprimis referta, multo minus tamen, quam in quibusdam congeneribus.
28. *Costæ* utrinque septemdecim. *Vertebrae* in universum quadraginta & una.

	unc.	lin.		unc.	lin.
Longitudo tota.	15.	7.v.8.	Latitudo Perpendicularis seu Altitudo,		
ad nares.		5.cir.	circa medium oculi,	1.	9.
ad medium oculorum.	1.		circa initium Pinnarum Pectoralium,	3.	6.
finem Operculorum branchiarum.	2.	8.39.	c. init. Pin. Ventralis,	4.	5.
Pinnas Pectorales,	3.				c. init.
Pin. Ventrals]	6.	8.			
		Pin.			

Malacopterygii.

Cyprini. 9

Pin. dorsalem.	7.	1. f.	c. init. Pin. dor-	
Ejusdem finem.	8.	6.37.	salis.	4. 4. f.
Pinnam Ani	9.	7.	Ejusdem finem.	4. circ.
Ejusdem finem.	10.	6.	c. init. Pinnæ Ani.	3. 1.32
Ad initium Cau-			Ejusdem finem.	2. 1.
dæ.	13.		minima paulo an-	
			te Caudam.	1. 5.
			Latitudo transversa in	
			medio Ventre.	2. 1.32.

II. CYPRINUS iride: pinnis omnibus: caudaque rubris. Sarr. Suecis.

1. Piscis upsalie vulgaris
2. Caput breve & superne convexum.
3. Rictus respectu corporis angustus.
4. Nares; Dentes in faucibus vel initio Ventriculi: Opercula bran-
chiarum, & Linea lateralis curva, ventrique parallela, ut in
Congeneribus
Mandibulæ ambæ ejusdem longitudinis, sed quando os aperitur,
Interior longior apparet, at clauso ore minime.
5. Cranium fuscum vel nigrescens.
6. Iris rubra vel rectius crocei coloris.
7. Branchiæ utrinque quatuor.
8. Dorsum à capite assurgens, tam ante quam post pinnam, con-
vexum. Venter antèrius parum planius, inter Pinnas Ventrals
vero & Anum in earinam subacutam contactus.
9. Squamæ magnæ, coloris quidem argentei, ad ventrem vero fla-
vedine, ad dorsum obscuritate vel nigredine quadam mixti seu
turbati.
10. Pinne omnes & cauda, pectoralibus tamen exceptis, rubræ
sunt.
11. Pinne Pectorales fuscescentes, radiorum sedecim, quorum pri-
mus maximus est & in summo indivisus. reliqui omnes in api-
ce ramosi, ultimi admodum exigui.
12. Pinne Ventrals ruberrimæ sanguinis instar, radiorum decem
& interdum undecim, quorum secundus & tertius maximi sunt;
primus & secundus in apici indivisi, reliqui omnes multum
ramosi.
13. Pinna dorsi unica; supernè rubra, infernè obscura vel cana,
radiorum undecim ramosorum, quorum 2dus & 3tius longissi-
mi, primus vero secundo dimiduo minor; Primus & 2dus in
apice indivisi, reliqui in summo ramosi.
14. Pinna Ani ruberrima sanguinis instar diluti vel coloris adhuc
nobilioris, radiorum quatuordecim, & sæpe quindecim, quo-
rum

Artedi Synonymia.

B

rum

rum primus secundo dimidio minor. Imus, & 2dus indivisi in apice, reliqui vero in summo ramosi.

15. *Cauda* bifurca, rubra, radiorum novemdecim longorum præter extremos breves.

Partes intestinae ut in congeneribus.

16. *Vertebrae* in universum triginta septem.

Costæ quatuordecim vel quindecim longæ

Longitudo tota	unc. 8. lin. 9.
ad medium oculi.	5½.
ad Pinnae Pectorales.	1. 6.
Ventrales.	3. 4.
Pin. dorsalem;	4. 4.
Ejusdem finem.	5. 2.
Pinnam Ani.	3. 3.
Ejusdem finem;	6. 1.
initium Caudæ.	7. 4 c.
Latitudo perpendicularis juxta medium Oculi.	9.
juxta Pinnae Pectorales;	1. 8. à 9;
juxta Ventrales.	2. 7.
initium pin. dorsalis	2. 7. f.
Ejusdem finem & initium Pinnæ Ani.	2. 1.
finem Pinnæ Ani.	1. 1.
Minima juxta Caudam.	8. f.

III. *CYPRINUS* *Iride: pinnis ventralibus ac ani plerumque rubentibus.*

Mort Sueclis.

1. *Caput* exiguum, supernè satis planum, ex viridi & fusco colore mixtis.
2. *Dorsum* ante pinnam dorli parum in acumen contractum, pone illam vero convexum est; Venter verò planus, spatium vero inter pinnae Ventrales & Anum in acumen paulisper contractum est.
3. *Rictus* angustus. Mandibulæ ejusdem longitudinis, clauso tamen ore; superior tantillum longior apparet in majoribus imprimis.
4. *Iris* plerumque rubra, interdum lutea vel luteo-argentei coloris, sed in junioribus tantum.
5. *Nares*; *Dentes* quinque in faucibus: *Opercula* branchiarum; & *linea* lateralis ad Ventrem flexa ut in Congeneribus.
6. *Squamae*, pro mole piscis, satis magnæ, imbricatim sitæ, coloris argentei sed in dorso canescentes cum cæruleo admixto.

7. *Bran-*

Malacopterygii.

Cyprini. II

7. *Branchia* utrinque quatuor, omnes duplici Tuberculorum exilissimorum ordine donatæ.
8. *Pinna in dorso* unica, officulorum tredecim, quorum duo prima indivisa, reliqua in apice ramosa sunt; imo duplo minus secundo, 2dum vero & 3ium maxima.
9. *Pinna Pectorales* cano - albescentes, officulorum quindecim, quorum primum simplex & magnum, reliqua vero in apice bifida.
10. *Pinna Ventrals* rubræ, in junioribus vero rubescentes tantum & interdum lutescentes, officulorum novem, quorum primum & ultimum simplicia sunt, reliqua vero in apice ramosa: Primum & 2dum 3ium 4tum maxima sunt.
11. *Pinna Ani* plerumque rubra vel rubescentes, interdum vero lutescens, officulorum duodecim, interdum 13. quorum duo prima indivisa, reliqua vero in apice ramosa: primum 2do plus duplo minus est.
12. *Cauda* canescens & bifurca, officulorum novendecim longorum præter extrema brevissima, quorum 17 media in apice ramosa sunt.
13. *Locus*: lacus, stagna & fluvii, propemodum omnes in Suecia.

Partes Internæ:

14. *Cor*, Hepar cum cystide fellea, lien, Ventriculus cum Intestino semel reflexo, Ovaria duo, Vesica aërea in medio contracta & Renes ut in Congeneribus.
15. Peritonæum argentei coloris maculis nigris aspersum.
16. *Vertebræ* in universum quadraginta & quatuor.

Longitudo tota.	unc. 6.	lin. 3.
ad medium Oculi.		4.
Pinnas Pectorales.	1.	1½.
Ventrals.	2.	3½.
Pinnam dorsi.	2.	4½.
Ejusdem finem.	3.	1.
Pinnam Ani.	3.	6.
Ejusdem finem.	4.	½.
ad initium caudæ.	5.	
Latitudo juxta medium Oculi.		6½.
Pinnas Pectorales.	1.	2.
Ventrals.	1.	4½.
Pinnam dorsi.	1.	4.
Ejusdem finem.	1.	2.
Pinnam Ani.	1.	

Ejusdem finem.
minima ante caudam.

6½.
5.

IV. *CYPRINUS oblongus, figura rutili, pinna ani officulorum decem.*

Stråmn Angermännorum, W. Bothniensium.

1. Piscis fluviatilis & marinus.
2. *Locus*: Angermannia, W. Botnia.
3. *Mandibula* edentulæ, & Dentes in faucibus; Nares utrinque duplices: Opercula branchiarum, & linea lateralis curva ventrique parallela, ut in Congeneribus.
4. *Rictus* angustus.
5. *Iris* argentei coloris, in superiore parte vero obscure canescens.
6. *Branchiæ* utrinque quatuor.
7. *Squamae* magnæ, ut in plerisque congeneribus, coloris argentei, in dorso vero incanæ vel obscuriores.
8. Longitudo spithamalis & ultra. Figura corporis oblonga.
9. *Pinna in dorso* unica, radiorum decem, quorum primus minimus, 2dus vero longissimus.
10. *Pinnae Pectorales* radiorum sedecim vel septendecim.
11. *Pinnae Ventrals* radiorum novem.
12. *Pinna Ani* radiorum undecim, quorum primus minimus est.
13. *Cauda* bifurca, radiorum 19 longorum præter extremos admodum curtos, qui difficiles numeratu sunt, medii vero in apice ramosi.
14. *Pinnae omnes* albescentes vel canescentes sunt.
Nota. Coit medio Maji vel circa diem Erici sc. d. 18 Maji in Angermannia, sub Elevatione Poli 63 grad. 30 min. circiter.
15. *Vesica aërea* in medio quasi filo constricta.
16. Cor subrotundum fere.

Longitudo tota.

unc. 7. lin.

ad initium oculi.		3½.
Ejusdem finem.		6.
Pinnas Pectorales.	1.	2½.
ad Ventrals.	2.	8.
Pinnam dors.	2.	9½.
finem pinnae Ventralium.	3.	
finem pinnae dorsalis.	3.	5½.
Pinnam Ani.	4.	1.
Ejusdem finem.	4.	7.
Caudam.	5.	7.

Lati.

Latitudo perpend. juxta Oculum.	6.
Pinnae Pectorales.	1. 2.
Ventrales.	1. 4.
Pinnae dorfi.	1. 3½.
Ejusdem finem.	1. 2.
Pinnae Ani.	9½.
Ejusdem finem.	7.
minima ante caudam.	4½.
juxta initium Caudae	5.

V. *CYPRINUS quincuncialis maculosus*, maxilla superiore longiore, cirrhis duobus ad os.
Gudgeon Anglorum.

1. Caput & corpus cathetoplatea. Corpus tamen magis teres quam in multis ex congeneribus. Os, Nares, Oculi, Membrana Branchiofstea, dentes, squamæ; situs Pinnarum &c. ut in Congeneribus.
2. Mandibula Superior inferiore longior.
3. Cirrus utrinque unicus, albus, brevis in Mand. Superiore ad angulos oris.
4. Iris aurei coloris vel ex aureo & argenteo mixta.
5. Dorsum totum convexum est & sat crassum, Venter planus.
6. Anus medio inter Pinnae Ventrales & Pinnae Ani.
7. Linea lateralis fere recta, nigrescens per media latera decurrens.
8. Squamæ pro magnitudine piscis satis amplæ, in dorso ex cano-nigrescentes, in lateribus & Ventre obscurè argenteæ.
9. Macula 1° in medio dorso secundum longitudinem à capite ad caudam, septem vel octo nigrescentes & amplæ.
2° utrinque in lateribus ad lineam lateralem novem vel decem maculæ majusculæ, nigrescentes, & in quibusdam vix observabiles.
3°. Aliæ exiguæ nigrescentes numerosæ in capite, dorso Pinnis Pectoralibus, dorso & cauda.
10. Pinna dorfi exigua, officulorum 10 vel 11, primum exiguum & brevissimum est: Pectorales offic. 15. Ventrales albæ offic. 9, quorum duo prima indivisa in apice; unum admodum breve.
Pinna Ani albescens, officulis novem vel rectius 10, si primum, adeo breve ut vix videatur, numerare velis.
11. Cauda varia, lata, non multum, sed ad medium tantummodo, bifurca, officulis novendecim longis.
12. Longitudo piscis 5 à 4 uncias. Latitudo maxima 7 lineas circiter.
13. Vesica aërea & aliz partes intestinz ut in Congeneribus.

14. *Locus:* Flumina. Mense Aprili fœminæ ova habent, sed non matura.
 15. *Vertebræ* in universum 39 à 40.

VI. *CYPRINUS* *maxillâ inferiore longiore cum apice elevato, pinna ani ossiculorum quindecim.*
Asp. Suecorum.

1. *Longitudo* bipedalis & interdum tripedalis in maximis. *Figura* corporis potius oblonga quam lata.
2. *Caput* subacutum, non magnum, supernè cano-nigrescens, à dorso ad rostrum vix declivè; dorsum vero à capite parum admodum assurgit, sed tantum in initio, ad caput scilicet.
3. *Os* edentulum, non adeo angustum, sed magis patulum quam in reliquis hujus generis, respectu sc. ad molem corporis habito. Dentes utrinque quinque, satis robusti, in initio Gulz. In adultioribus quatuor digiti inantis sine incommodo capacitati oris intrudi possunt.
4. *Mandibula* inferior ultra superiorem parum prominet, quod ore aperto manifestius apparet. Hæc inferior in apice apophysis vel protuberantiam quandam sursum elevatam habet sed exiguam, inter quam & linguam os interius plurimis punctulis nigris quasi irroratur vel obscuratur, alias totum os interius album est. Rostrum vero in apice tantillum emarginatum est.
5. *Nares* patulæ, oculis quam rostro patululum propriores, duplici foramine utrinque præditæ, quorum posterius valvula tegit.
6. *Oculi* ad latera capitis siti. Iris superne aurei coloris cum punctulus nigris, in inferiore parte vero argentei coloris. Pupilla nigra.
7. *Opercula branchiarum* Argentei coloris, cum aureo admixto in adultioribus, ex duplici quasi lamella ossæ & tribus ossiculis vel spinis curvatis & aliquantum latis, membranâ conjunctis, ad inferiorem partem sitis constans, quatuor laminæ ossæ pone, infra & ante oculos sitæ sunt in musculis maxillæ superioris quæ levi pressione mobiles sunt.
8. *Linea lateralis* curva, ventri propior; circa branchias maxime sursum flexa.
9. *Squamæ* mediocres, rotundo angulata, coloris in dorso canescentis, obscure cani, vel nigrescentis & nigri cum viridi admixto in adultioribus; in lateribus argentei parum obscurati; in ventre vero argentei splendentis, rubore sanguineo in adultis interdum diluti, interdum vel maculis aliquot rubris notatæ; sunt a. multo minores, respectu habito ad corporis molem, quam in Braxen & Id Suecorum. Macula rubescens una vel altera interdum in ipsis Operculis adsunt.
10. *Branchiæ* utrinque quatuor, singulæ duplici ordine tuberculorum

- rum subacutorum donatæ, quorum exteriora longiora sunt & subacuta, interiora vero minora; In suprema branchia æqualia fere sunt.
11. Inter Pinnas Ventrals & Anum, corpus quasi in carinam sub acutam contrahitur. Dorsum convexum est. *Venter* à capite ad Pinnas Ventrals planus, tam ante quam post Pinnam dorsī, inter caudam & Pinnam dorsī, quam inter hanc & caput, latius.
 12. *Anus* partus tempore valde protuberans est, cum duplici apertura bene conspicitur, quarum inferior apertura, vulva est.
 13. *Pinna in dorso* unica, in junioribus canescens, in adultioribus vero obscure cana vel nigrescens, radiorum undecim, quorum duo primi simplices, cæteri in apice ramosi; secundum cum tertio longissimus est, primus secundo fere dimidio minor. Radius quidam curtissimus, ante primum situs, cultro separari potest ut veniat in conspectum, alias vero vix videtur.
 14. *Pinna Pectorales* obscure canescentes interdum in extremitate rubentes, punctulis minimis nigris interdum irroratæ, radiorum Octodecim, quorum primus maximus, robustus & indivisus, cæteri in apice parum ramosi præter duos extremos, qui itidem indivisi & præterea minimi sunt.
 15. *Ventrals* dilute rubentes cum cano & albo admixto, radiorum decem robustorum, quorum duo primi indivisi, reliqui in apice admodum ramosi; Primus minimus est, 2dus, 3tius, 4tus & 5tus maximi.
 16. *Pinna Ani* canescens cum punctis nigris & interdum rubore admixto, radiorum sedecim, & interdum quindecim & 17, quorum duo primi simplices sunt, cæteri in apice ramosi; Primus duplo minor secundo; secundus & tertius longissimi sunt: Duo ultimi sibi valde vicini.
 17. *Cauda* bifurca, obscure cana vel nigrescens, radiorum novemdecim longorum præter extremos curtos, quorum septendecim in apice ramosi sunt.
 18. Tempore coitus totum caput, limbus squamarum lateralium imprimis & superius latus Pinnarum Pectoralium &c. *Tuberculis subasperis* muniuntur.
 19. *Locus*: Lacus Melcerus in Uplandia, amnis Sala ad Upsaliam.
 20. Cor quodammodo triangulatum.
 21. Diaphragma satis robustum.
 22. *Hepar* admodum longum, in tres lobos divisum, quorum duo longissimi sunt ultra spithamam, à latere dextro, intestino secundum longitudinem affixi, tertius ad sinistram situs multo minor est. Vesica fellis oblonga ad supremam hepatis partem juxta diaphragma ei adnectitur.

23. Lien saturate ruber, extremitati lobi tertii seu minimi hepatis adnexus, cum longo processu ad diaphragma extenso.
24. Ventriculus ab intestino parum distinctus. Intestinum primo ad Anum fere descendit, deinde semel ad superiora reflectitur, & tum tertio recta ad Anum à sinistro latere tendit Hoc intestinum explicatum, ejusdem cum pisce longitudinis erat.
25. Ovarium duplex, per totum abdominis cavitatem extensum crassum & undecim uncias ferè longum. Ambæ partes inferiores in unum conjunctæ sunt, & ad superiorem partem circa coarctationem vesicæ aëreæ, ovaria quoque ab una parte filo quasi constricta sunt, ovis albescentibus, refertissima.
26. Peritonæum argentei & splendentis coloris.
27. Vesica aërea amplissima, septem uncias & 6 lineas longa, in medio, filo quasi constricta, cum ductu pneumatico ad initium partis inferioris conspicuo.
28. Viscus sanguinolentum spinæ dorsæ adhærens, venis magnis refertum, pro Renibus.
29. Pondus in pisce descripto erat $8\frac{1}{2}$ librarum.
30. Coit vel parit in fine Aprilis & initio Maji.
31. Costæ utrinque novendecim, Vertebræ in univ. quadraginta & novem.

Longitudo tota.

unc. 23. lin. 6.

ad medium oculi.
finem Operculorum
branchiarum.

1. 4.

Pinnae Pectorales.

4. 2.

Ventrales.

9. 5.

Pinnam dorsæ.

10. 3. à 4.

Ejusdem finem.

12. 4.

Pinnam Ani.

14.

Ejusdem finem.

15. 8. à 9. cir.

initium Caudæ.

19. 5. à 6.

Latitudo Perpendic. juxta medium oculi.

eadem transversa.

1. 7. à 8.

Perp. ad Pinnae Pectorales.

1. 7. à 8.

Transversa ibidem.

4. 3. cir.

Perp. ad Pin. Ventrales.

3.

Transversa ibidem.

6.

Perp. ad Pinnam dorsæ.

3. 2.

ad Pinnam Ani.

6. ferè.

Transversa ibidem.

4. 1. à 2.

Perp. ad finem Pinnæ Ani.

2. circit.

ad initium caudæ.

2. 8. à 9.

Transversa ibidem.

2. 1.

7. cir.

VII. *CYPRINUS quincuncialis*, pinna ani officulorum viginti.

Alburnus Decii Aufonii in Mosella, versu 126.

Lōja, Lōga, & āloya. Suecorum.

1. *Caput* exiguum & subacutum.
2. *Figura corporis* clupeæ minori non dissimilis, squamæ dorſi quæ cæruleſcente colore ſplendent, omnino ut in clupeis junioribus.
3. *Facies* Coregoni minimi.
4. *Longitudo* ſpithamali plerumque minor ſeu 4 à 5 unciarum utcuqûe.
5. *Os* reſpectu congenerum mediocre eſt. Mandibula inferior ore aperto, paulo longior eſt ſuperiori, ſed ore clauſo hæc differentia vix apparet.
6. *Oculi*, ad latera capitis, ſatis magni. Iris argentei coloris ad inferiorem partem, ad ſuperiorem vero color flavus vel aureus admiſcetur.
7. *Branchiæ* utrinque quatuor.
8. *Nares*; *Opercula branchiarum*; *Dentes faucium*, & *Linea lateralis curva*, ventrique parallela, ut in Congeneribus ſe habent.
9. *Squamæ* pro corporis mole, ſatis magnæ, facile deciduæ, imbricatim ſitæ; in dorſo coloris cano - cæruleſcentis; in lateribus vero & ventre coloris ſplendentis argenti politiffimi inſtar.
10. *Pinne* omnes albeſcentes. *Pectorales* ſatis albæ, radiorum quatuordecim vel quindecim quorum primus ſimplex & robuſtior, ceteri in apice ramoſi; ultimi admodum exigui.
11. *Pinna Ventrals* albeſcentes, radiorum novem, quorum primus ſimplex, reliqui vero in apice ramoſi.
12. *Pinna in dorſo* unica, cano - albeſcens, radiorum novem vel decem, quorum primus vel duo anteriores ſimplices, ceteri in apice ramoſi.
13. *Pinna Ani* albeſcens, radiorum viginti & unius, quorum duo primi indiviſi, ceteri in apice ramoſi; Primus & ultimi duo minimi ſunt.
14. *Cauda* biſurca, albeſcens, radiorum ramoſorum in apice, extremis tamen exceptis.
Venter inter Pinnas Ventrals & Anum, in carinam ſatis acutam contrahitur. *Dorſum* totum convexum.
15. *Locus*: Lacus & fluvii per totam Sueciam.

Partes inteſtinæ ut in Congeneribus.

16. *Vertebræ* in univerſum quadraginta duæ.

VIII. *CYPRINUS* rostro *nâsiformi*, dorso *acuminato*, *pinna ani* *officulorum viginti quatuor.*
Wimba Suecorum.

1. Nares; Dentes faucium utrinque quinque: Opercula branchiarum, & Linea lateralis curva ventri propior ut in Congeneribus.
2. *Rictus* non adeo angustus sed tam patulus, ut digitus maximus sine incommodo in adultis ori intrudi possit quando os pressione inferioris maxillæ aperitur, superior quasi è vagina protruditur.
3. *Mandibula superior* ante inferiorem promines. *Rostrum* oblongum & molle quasi; Nasus ante maxillam superiorem paulisper extensum, coloris obscuri vel nigrescentis.
4. *Caput*, respectu piscium congenerum, longius & acutius, circa cranium interdum pellucidum & coloris obscuri vel canescentis, vel nigrescentis.
5. *Iris* in parte suprema flava est vel coloris aurei punctulis nigrescentibus obscurati, ceterum in parte inferiore coloris argentei. Pupilla rotunda & nigra; sæpe quoque tota fere Iris aurea est.
6. *Opercula* branchiarum coloris argentei quidem, sed ad superiorem partem aureum admixtum est. Lamina utrinque dorso proxima sæpius nigredine obfuscata est.
7. *Branchiæ* utrinque quatuor, singulæ duplici Tuberculorum brevium & subacutorum ordine donatæ, quæ utrinque fere æqualia sunt.
8. *Venter* inter Pinna Pectorales & Ventrals planus & satis latus est, inter Ventrals vero & Pinnam Ani acutus seu in cartilaminam contractus & quasi cultellatus.
9. *Eminentia* vel canthus subacutus in supremo dorso per totam ejus longitudinem, sc. à rostro seu naso per medium caput & totum dorsum ad caudam usque procurrens.
10. *Squamæ* magnæ, facile deciduæ, coloris in Ventre argentei, sed in medio dorso & lateribus obscurioris. Latera interdum Lituras negras magnas sed dissimiles habet. Squamæ imbricatim sitæ.
11. *Pinnae Pectorales* coloris tantillum rubescentis vel fuscescentis ad inferiorem partem rubentes, & in margine superiori nigrescentes radiorum sedecim, quorum primus cum 2do & 3tio maximus, tres ultimi vero admodum exigui; primus indivisus quoque est, ceteri in apice ramosi.
12. *Pinnae Ventrals* coloris albescentis quidem, sed rubescente parumper diluti, vel dilute rubentes radiorum decem, quorum primus maximus & indivisus, ceteri in apice admodum ramosi; ultimus minimus est.

13. *Pinna dorsi unica*, coloris obscure cani vel rectius nigrescentis, radiorum undecim, quorum duo primi indivisi, ceteri vero in apice ramosi; secundus longissimus est, primo autem duplo fere major. Duo ultimi sibi vicini sunt.
14. *Pinna Ani* coloris obscure canescentis, vel interdum Nigrescens, radiorum viginti trium, vel sæpe in maribus imprimitis 24 & 25. tres primi indivisi, ceteri vero in apice ramosi; duo primi satis exigui, sunt, tertius cum 4to, 5to & 6to longissimi. Primus admodum exiguus.
15. *Cauda magna bifurca*, coloris obscure canescentis, vel nigrescentis vel nigri, sed ad extremitates parum rubore permixti, radiorum 27 à 28 circiter, quorum extremi admodum exigui & difficiles numeratu sunt, medii vero in apice ramosi, numero sc. 17; Novendecim vero longi sunt.
16. *Spine* multæ exiguæ in carne ubique, ad alteram extremitatem bifurcæ.
17. Caro dulcis quidem, sed mollis & parum sapida.
18. In *Fine Maji Capita*, dorsum & latera quorundam, sed non omnium, Tuberculis crebris, exiguis & albescentibus exasperata vidi.
19. *Locus*: Lacus Melerus & amnis Sala ad Upsaliam &c.

Partes intestinae.

20. Cor, Hepar, Lien & vesica fellis ut in aliis hujus generis speciebus se habent. Intestinum semel reflexum, extensam longitudinem piscis fere æquat. Vesica aërea bifida.
21. Ovaria duo magna in fœminis, omnino ut in aliis speciebus, hæc in *Fine Maji* magna, sed non omnino matura sunt. Et totidem lactes in maribus, ejusdem figuræ & albißimæ.
22. Peritonæum splendens, coloris argentei polito non parum incarnati.

Longitudo tota.	unc. 10. lin. 8. à 9.
ad medium oculi.	9.
Pinnas Pectorales.	4. 1.
Ventrales.	4. 3.
Pinnam dorsi.	4. 6½.
Ejusdem finem.	5. 5.
Pinnam Ani.	6. 1.
Ejusdem finem;	7. 5. à 6.
initium Caudæ.	8. 9.
Latitudo juxta medium oculi.	1. f.
Pinnas Pectorales.	1. 9.

Ventrales & Pinnam dorſi. Ejuſdem finem. Pinnam Ani. Ejuſdem finem. initium Caudæ. inter extrema Caud. furcatæ.	unc. 2. 2. 2. 1. 1. 2, circit.	lin. 5. à 9. 4. 1. 1. f. 1. 2, circit.
---	--	--

IX. *CYPRINUS quincuncialis*, pinna ani offcutorum viginti quinque.

Biörka, Biörkna & Bierkna Suecorum Uplandorum.

1. Corpus breve, vix ſpithamale, & latum.
2. Caput cathetoplateum; cranium quodammodo pellucidum & obſeure virideſcens.
3. Riſtus anguſtus admodum.
4. Mandibula ambæ ejusdem longitudinis, vel ſuperior clauſo ore tantillum longior, ita tamen ut vix appareat.
5. Iris argentei coloris, ſed ſuperne punctulis aliquot obſcuris vel maculis obſeure virideſcentibus notata.
6. Nares; Dentes in faucibus; Membrana branchioſtega tribus offculiſtota, & linea lateralis curva, ventrique parallela ut in Congeneribus.
7. Squamæ in exiguo corpore ſatis magnæ, argentei coloris.
8. Pinnæ omnes canæ vel obſeure caneſcentes, interdum vero ventrales ſunt parum rubentes.
9. Pinnae Peſtorales offcutorum 15 exilium; Ventrales off. 9. Dorſi unica offc. undecim; Pinna Ani lata offcutorum viginti quinque; Cauda bifurca, offc. 19 longorum, præter extrema prævia. Omnia offcula Pinnarum ita comparata ſunt & eaſdem proprietates ac in reliquis ſpeciebus habent.
10. Partes-inteſtinæ ut in congeneribus ſe habent.
11. Coit vel ova emittit in Julio circa finem.
12. Piſcis lacuſtris eſt in lacu Melero Uplandiz in Suecia ubique reperiundus, ſed ob ſimilitudinem ſæpe pro Ruſtilo Geſneri ſeu Mort Suecorum vel Roche Anglorum venditur, peritioribus autem piſcatoribus Björka, Björk & Björkna appellatur.

X. *CYPRINUS pintis omnibus nigreſcentibus*, pinna ani offcutorum viginti ſeptem.

Brax Suecorum.

1. Corpus ſatis latum, & ad latera multum compreſſum.
Dorſum à capite aſurgens, & ſatis acutum ſeu in carinam acutam

tam contractum; inter Caudam vero & finem pinnæ dorsalis, tergum latius est & convexum.

Venter à capite ad Pinnas Ventrals parum latus est & planus, à Ventralibus vero ad Anum in admodum acutam carinam contrahitur; Pars inde ab Ano ad caudam tenuis quoque existit.

2. *Caput* breve, crassum & obtusum
3. Quando Os per pressionem mandibulæ inferioris aperitur, superior maxilla è vagina quasi protruditur.
Mandibula superior, clauso ore, inferiori paulo longior est. Os deinde subrotundum & planum sub membrana infra nares situm.
4. *Oculi* rotundi, ad latera capitis siti; Pupilla rotunda.
Iris maximam partem Argentei coloris, sed sæpiissime aureo & tantillo rubri admixto.
5. *Opercula branchiarum* ex colore argenteo, aureo & tantillo rubri mixta.
6. Ductus aliquot seu foramina lineam constituentia supra Nares utrinque, ut & in maxilla inferiore & juxta oculos.
7. *Branchiæ* utrinque quatuor, quorum omnes duplici Tuberculorum unguiformium ordine donantur, exteriora autem in branchia suprema, ad superiorem partem, reliquis longiora sunt.
8. *Nares* oculis quam rostro paulo viciniore. *Dentes* Faucium utrinque quinque: Membr Branchioslega & linea lateralis curva ventri propior, ut in Congeneribus.
9. *Squamæ* magnæ, imbricatim sitæ, in ventre argenteo-albæ cum quodam rubore dilutæ; in lateribus ex argenteo & flavicante vel aureo mixtæ; in dorso vero obscuræ vel cano-nigrescentes, unde tamen argentei quid translucet.
10. *Rictus* in adultis ea amplitudine, ut pollex magnus sine incommodo intrudi possit.
11. *Pinnæ* omnes cano-nigrescentes vel nigræ.
12. *Pinna Pectorales* ad exortum obscure canæ, in extremitate vero nigrescentes, radiorum septendecim, quorum primus robustus & indivisus, ceteri vero in apice ramosi: Primus cum 2do 3tio & 4to maximus.
13. *Pinna Ventrals* ad exortum cano-albescentes, ceterum vero nigræ; radiorum novem, quorum primus indivisus, ceteri in apice admodum ramosi: Primus cum 2do & 3tio maximus; Radius 1cmus exiguus est & indivisus, primo adnatus quasi.
14. *Pinna dorsi* cano-nigrescens, radiorum duodecim, quorum duo primi indivisi, ceteri vero in apice ramosi: secundus, & 3tius & 4tus longissimi, ultimus minimus, primus secundo duplo minor.
15. *Pinna Ani* nigrescens, radiorum viginti & septem, interdum

& quidem sæpe 28, quorum duo vel tres primi indivisi, ceteri in apice ramosi; 2dus cum tertio & 4to longissimi, ultimi minimi.

16. *Cauda* multum bifurca, cano-nigrescens, radiorum 19 longorum præter extremos breves.
17. *Locus*: Lacus & stagna pleraque in Suecia.
18. Caro sapidissima.
19. *Cor* quodammodo triangulatum cum Auricula magna alba.
20. *Hepar* longum, rubrum, à sinistro latere situm, in duos lobos prælongos divisum, intestino arcte adhærens.
21. *Ventriculus* quoad amplitudinem ab intestino vix distinctus. Intestinum semel ad diaphragma usque reflexum, & tum recta ad Anum tendens, pinguedine admodum circumvolutum.
22. *Lien* oblongus & nigrescens juxta ventriculū.
23. *Ovaria* duo, magna, crassa & longa in fœminis, ovis flavis innumeris referta, ad superiorem partem transversim quasi filo constricta ab uno latere.
24. *Vesica aërea* magna & crassa, in medio constricta vel coarctata; ad initium partis inferioris in protuberantiam extensa, ubi Canalis ejus erumpit.
25. *Peritoneum* album.
26. *Vertebra* in universum quadraginta quatuor.
Costæ utrinque quindecim, longiores scilicet.

Longitudo tota:	unc. 16.	lin. 9.
ad Nares.		8½. cir.
medium oculi	1.	4½.
finem Operculorum branchiarum.	3.	3.
Pinnae Pectorales.	3.	3½.
Pinnae Ventrals.	6.	6.
Pinnam dorſi.	8.	
Ejusdem finem.	9.	4.
Anum.	8.	7.
Pinnam Ani.	9. f.	
Ejusdem finem.	11.	8. cir.
initium Caudæ.	13.	4.
Latitudo perpend. juxta Nares.	1.	5½.
Perpend. juxta medium Oculi.	1.	9½.
Eadem transversa.	1.	3.
Perp. j. Pinnae Pectorales.	3.	8.
Eadem transversa.	1.	6½.
Per. j. Pin. Ventrals.	5.	4.
Eadem transversa.	2.	1. f.

Per. juxta Pinnam dorsl.	unc. 5. lin. 3.
Eadem transversa.	1. 6.
Per. juxta Pinnam Anl.	4. 4½.
Eadem transversa.	1. 3.
Per. j. finem Pinnæ Anl.	1. 6. f.
initium Caudæ.	1. 4.
Eadem transversa.	3½.

XI. CYPRINUS *admodum latus & tenuis, pinna ani officulorum quadraginta.*
Blicca, Blecca, Braxenblicca, Braxen-panka & Braxen-flia. Suecorum.

1. *Corpus* latum, admodum tenue, compressum seu cathetoplateum; longitudo in adultis spithamali major.
2. *Caput* exiguum, compressum.
Cranium pellucidum, fuscum vel lutescens.
3. *Iris* argentei coloris, in superiore parte supra pupillam sæpe flavescens.
4. *Nares*: Dentes in Faucibus; *membrana branchioflega* tribus officulis fœta & *Linea lateralis* curvâ, ventrique parallela, ut in Congeneribus.
5. *Squama* exiguæ, omnes argentei coloris.
6. *Pinnæ* omnes canæ, vel cano-albescentes.
7. *Pinnæ Pectorales* officulorum 16 gracilium; *Ventrales* officulorum 9 vel 10. *Pinna dorsalis* off. 10 ad 11; *Pinna Ani* admodum lata & ampla, officulorum 40 & sæpe 41, *Cauda* multum bifurca, officulorum 19 longorum, præter extrema exigua. Omnia officula ita comparata sunt, ut in congeneribus reliquis speciebus.
8. *Locus*, in Melaro & aliis Uplandiæ lacubus satis copiose reperiendus.
9. Partes intestiniæ ut in Congeneribus sese habent.

XII. CYPRINUS *iride flava, pinna ani officulorum triginta septem.*

Faren. Uplandorum.

1. *Corpus* compressum & satis latum. *Caput* cathetoplateum.
2. *Dorsum* à capite ad Pinnam dorsalem tantillum in Acumen contrahitur; pone Pinnam dorsl vero ad Caudam convexum est. *Venter* à branchiis ad Pinnas Ventrales paullulum planus, à Pinnis Ventralibus ad Anum in carinam valde acutam contrahitur. Reliqua corporis inferioris pars ab Ano ad caudam, admodum tenuis quoque existit.

3. *Man-*

3. *Mandibula* ambz ejusdem longitudinis. Si verò os arcuè comprimatur, rostrum tantisper longius observatur. *Rictus* tam magnus, ut apex digiti majoris sine incommodo in adultis piscibus intrudi possit.
4. *Caput* superne inæquale est.
5. *Oculi* satis magni. Iris ex Argenteo & Aureo colore mixta.
6. *Nares*, quæ oculis vicinæ: *Dentes* in *Faucibus* utrinque quinque; *Opercula branchiarum* & *Linea lateralis* curva ad ventrem flexa, ut in *Congeneribus*.
7. *Squamæ* mediocres angulato-rotundæ, imbricatum fitæ. Color squamarum in toto corpore obscure argenteus, in dorso autem cano-nigrescens.
8. *Pinnae* omnes cano-nigrescentes, *Pectorales* albidiores paulo.
9. *Pinna dorsi* unica, cano-nigrescens, ossiculorum undecim, quorum duo prima indivisa, reliqua in apice ramosa; ultimum minimum est, 2dum & 3tium longissima.
10. *Pinnae Pectorales* canescentes ossiculorum octodecim, quorum im & duo vel tria ultima indivisa in apice, reliqua vero ramosa sunt; Primum maximum est & robustum valde, tria ultima brevissima & minima.
11. *Pinnae Ventrals* ad radicem albescentes, ceteras nigrescentes, ossium 10, quorum duo prima indivisa, reliqua in apice ramosa; Primum omnium minimum est & cum 2do in unum quasi concretum.
12. *Pinna Ani* cano-nigrescens, longissima, ossiculorum triginta septem, quorum tria prima & ultimum in apice indivisa, reliqua ibidem ramosa sunt; Primum omnium Minimum est, 2dum tertio duplo brevius, Tertium vero cum 4to & 5to longissima sunt.
13. *Cauda* cano-nigra, bifurca, cujus inferior pars longior est superiore, ossiculorum 19 longorum, præter extrema minora.
14. *Claviculae* ex tribus utrinque ossibus consistunt, quorum ultimum maximum est.
15. *Branchiae* utrinque quatuor, singulæ duplici *Tuberculorum* ordine donatæ in concava sui parte, quorum exteriora, in branchia suprema seu maxima, reliquis multo longiora sunt.
16. *Locus* est *Lacus Melerus* in *Uplandia*, non tamen ubique, sed tantum quod scio ad partem *Oresunds-bro* dictum, & quidem ad prædium *Bielkestad*, alibi in *Melero* ferè ignotus est ut sit piscis rarissimus omnium in toto *Melero*.
17. *Cor*, *Hepar*, *Lien*, *Ventriculus*, *intestinum*, *Ovaria*, *Vesica aërea* in medio coarctata, & reliqua, ut in *Congeneribus* *Peritoneum* est argentei coloris.
18. *Costae* utrinque tredecim longiores, quarum prima & ultima utrinque minimæ sunt. *Vertebrae* in universum quadraginta & quatuor.

Longitudo tota.	unc. 11. lin.	
ad medium Oculi.		6.
Pinnae Pectorales.	1.	8. à 9.
Ventrales.	3.	7. à 8.
Pinnam dorsi.	4.	8.
Ejusdem finem.	5.	6.
Pinnam Ani.	5.	3.
Ejusdem finem.	8.	f.
initium caudæ.	8.	8.
Latitudo perpendicularis ad		
medium oculi.	1.	1. circ.
ad Pinnae Pectorales.	2.	2.
Pin. Ventrales.	3.	
initium pin. dorsi.	3.	1.
finem pinnæ dorsi.	2.	6.
finem Pinnæ Ani.		8.
initium Caudæ, eadem lat.		8.
Latitudo Transversa in medio cor-		
pore, ubi crassissimus est.		8. à 9.

XIII. CYPRINUS *cirris quatuor, officulo tertio pinnarum dorsi uncinulis armato.*

Carp Suecorum.

1. Caput: Corpus; Nares: Os; Dentes: Membrana Branchioftega; Oculi: Branchiæ, &c. ut in Congeneribus.
2. *Dorsum* à capite tantillum assurgens, atque inter caput & imam dorsi pinnam, subacutum. *Venter* totus admodum latus & planus. *Corpus* crassius & rotundius quam in Congeneribus.
3. *Mandibula* Superior ore clauso longior paulo est Inferiore; Ambæ in ambitu colore flavo dilutæ. *Rictus* pollicem maximum in adultioribus admittit.
4. *Cirri* Quatuor in Mandibula superiore, utrinque sc. duo, quorum Inferior ad angulos oris clausi situs major est, & in diversis subjectis vel semiuncialis vel uncialis, coloris flavi; superior utrinque à lateribus Mandibulæ superioris, brevis est & nigrescens.
5. *Pupilla* rotunda, cærulea. *Iris* ex colore argenteo & aureo obscuro mixta.
6. *Opercula Branchiarum* striata, ex aureo flavicantia.
7. *Squamæ* maximæ, pentagonæ fere vel quadratæ aut irregulares, quarum utrinque mediæ, quæ lineam lateralem constituunt, in medio foramine longitudinali perviæ sunt, reliquæ non item; (hucusque non observatum) coloris, secundum ætatem piscis; diversi, ex argenteo, aureo, viridescente & nigricante mixti, imbricatum sitæ.

8. *Linea lateralis* recta, vel ad opercula branchiarum tantillum flexa, dorso quam Ventri paulo propior.
9. *Pinna Dorsi* nigrescens. *Pinnae Pectorales & Ventrals* ex pallido rubentes. *Pinna Ani* vero & *Cauda* rubrae sunt vel ex nigro rubentes.
10. *Pinnae Pectorales* ossiculorum 16: *Ventrals* oss. 9, ita comparatorum, ut in Ruda, ultimum tamen Ventralium in apice bifidum est.
11. *Pinna Dorsi* longa, ossiculorum 24, interdum 23, quorum Tria prima robusta & indivisa, reliqua omnia in apice bifida, trifida & quadrifida; Ossiculum tertium robustum, asperum, indivisum & a postica parte duobus ordinibus aculeorum deorsum spectantium praeditum, non tamen simplex est, sed ex duobus ossiculis rigidis constat: Duo prima admodum exigua & brevia sunt.
12. *Pinna Ani* ossiculorum 9, quorum tria prima indivisa, reliqua in apice admodum ramosa: Duo prima minima sunt. Tertium vero crassum, robustum, asperum, & a postica parte aculeorum obliquo duobus ordinibus praeditum, non autem simplex est, sed ex duobus ossiculis arcte cohaerentibus constat.
13. *Cauda* satis bifurca, ossiculorum 19 longorum, praeter extrema breviora; omnia ita comparata sunt ut in Congeneribus.
14. *Longitudo* Cubitalis & bicubitalis interdum. Diu vivit extra aquas, nec adeo brevis vitae est elemento suo extractus ac reliquae Cyprini species, Opercula branchiarum tamen satis ampla, sed clausa bene.
15. *Cor* rotundo angulatum. *Ovaria* duo, magna, ovis viridi albescentibus repleta, inferne coeuntia. *Vesicae seminales* totidem. *Lien* satis planus & angulatus.
Hepar in tres lobos divisum; *Vesica fellis* magna, caerulea ad superiorem Hepatis partem, ductum magnum in Ventriculi orificium habens. *Intestinum* bis & quod excurrit toto pisce longius, sexies flexum, ter sc. ad superiora, & ter ad inferiora.
Vesica aërea bipartita, pars anterior major & amplior est, ductus pneumaticus è medio illius seu orificio inferiori oritur.
Renes duo ad spinam dorsi, duobus uretheribus manifeste in Vesicam Urinariam, ad exitum intestini sitam, sese exonerantes.
16. *Vertebrae* in universum 37. *Costae* 13 à 14.

Longitudo tota in descripto.
 ad medium oculi,
 Pin. Pectorales.

unc. 10. lin. 2;
 9.
 2. 1. à 2.

ini-

Initium Pinnæ dorsalis.	unc. 4. lin.
Ejusdem finem.	7. 1. circiter.
Pin. Ventrals.	4. 1.
Pinnam Ani.	6. 3.
Ejusdem finem.	7. cir.
Initium Caudæ.	8. 5. à 6.
Latitudo ad medium Oculi.	1. 2.
Pinnas Pectorales.	2. 3.
Initium Pinnæ dors.	2. 6. à 7.
ad Anum.	2. f.
Minima ad Caudam.	1. 1. fere.

Observa. Tjäckfälling (Cyprini species) fudermännorum ad Lacum Melerum in Suecia, Cyprino nobili seu Carpæ admodum similis est, habet enim cirrum in Maxilla Inferiore, ex relatione D. Sandvall Inspectoris in Sandhamn Inf. Roslagiz.

XIV. CYPRINUS mucosus totus nigrescens, extremitate caudæ aquali.

Linnæ: Sutare: Skomakare Suecorum.

1. Caput & rostrum respectu piscis non magnum; Corpus latum, crassum & breve.
2. Rictus exiguus vel mediocris ut digitus maximus sine incommodo in adultis ori intrudi possit.
3. Mandibula edentulæ, sed Dentes Faucium utrinque quinque; Opercula branchiarum ex quatuor laminis & tribus ossiculis curvatis utrinque constantia. Linea lateralis curva ventri propior, ut in Congeneribus.
4. Ductus aliquot exigui seu foramina, lineam quandam constituentia, in capite supra oculos sc. utrinque una, & duæ lineæ seu ordines horum ductuum infra oculos, quorum unus proxime in Operculis branchiarum, alter inferius in ipsa maxilla inferiore.
5. Oculi exigui ad latera capitis siti; Iris rubra.
6. Apertura Operculorum Branchiarum minus patulæ, quam in reliquis hujus generis speciebus.
7. Branchiæ utrinque quatuor, quarum singulæ duplici Nodorum pectiniformium ordine donantur, qui nodi in branchiis tribus interioribus utrinque æquales sunt, in extrema vero nodi interiores inter se fere æquales sunt, exteriores autem ad partem superiorem interioribus sunt longiores, ad infimam tamen multo breviores; omnes autem molles sunt.
8. Dorsum à capite parum assurgens, sed crassum & minime cellatum. Venter ubique satis latus & planus.

9. *Squamæ* oblongæ, exiguæ respectu congenerum, arcte adhaerentes, coloris in dorso nigri; in lateribus vero nigrescentis cum tantillo aurei vel viridi-flavicantis admixto: in ventre autem coloris albescantis; sed ita tamen ut totum corpus nigredine quadam dilutum sit.

Nota. Hæ squamæ extus muco viscido obducuntur, ut piscis lubricus sit, anguillæ instar.

10. *Pinna* omnes & cauda nigræ, nigrescentes vel obscure cavæ.
11. *Pinna Pectorales* nigrescentes, circumscriptione subrotundâ, radiorum septedecim, quorum sextus circiter longissimus: primus indivisus & robustus est, ceteri vero in apice ramosi; ultimi satis exigui sunt.
12. *Ventrales* itidem nigrescentes & extremitate subrotundâ præditæ, radiorum undecim, quorum primus satis exiguus, secundus robustus & admodum crassus, ceteri vero in apice valde ramosi.
13. *Pinna in dorso* unica, nigra, radiorum duodecim, quorum primus admodum curtus, 2dus paulo longior medium reliquorum exæquans, 3tius reliquos magnitudine æquans & una cum duobus prioribus simplex, ceteri in apice ramosi.
14. *Pinna Ani* nigra, radiorum undecim, quorum duo primi satis exigui, præsertim vero primus exilissimus, 3tius satis longus, una cum prioribus simplex, ceteri in apice ramosi sunt. Quartus & 5tus circiter longissimi.
15. *Cauda* nigrescens, minime furcata, sed potius quadrata radiorum novendecim, præter extremos numeratu difficiles.
16. *Locus*: Lacus, stagna & paludes.
17. *Hepar* longum, secundum Ventriculum & intestinum extensum, & in aliquot lobos divisum.
18. *Ventriculus* crassus & longus, in quo ut & in intestinis nihil præter succum vel chylum viscidum inveni.
19. *Intestinum* à pyloro semel ad diaphragma reflexum, deinde rectâ ad anum tendens.
20. *Lien* oblongus, obscure vel nigro rubens, angulosus, à sinistro situs.
21. *Vesica aërea* magna, in medio, filo quasi constricta, cujus canalisis, qui initio inferioris partis inseritur. bene conspicuus est.
22. *Peritonæum* argenteo-albescens.
23. Quod ad externam speciem attinet Truttæ salmonatæ (Laxö-ring) similis est.

<i>Longitudo tota.</i>	unc. 9.	lin. 3. f.
ad medium Oculi.		7.
Pinnas Pectorales.	1.	9.
Ventrales.	3.	8. à 9.
Pinnam dorsali.	4.	2.
Ejusdem finem.	5.	2. à 3.
Pinnam Ani.	5.	6.
Ejusdem finem.	6.	2. à 3.
ad initium Caudæ.	7.	6. cir.
<i>Latitudo perpendicularis juxta medium Oculi.</i>	1.	
Pin. Pectorales.	2.	
Ventrales.	2.	8.
initium Pin dorsalis.	2.	7.
Ejusdem finem.	2.	1.
Pinnam Ani.	2.	
Ejusdem finem.	1.	4.
Minima juxta Caudam.	1.	2.

XV. CYPRINUS *pinna dorsali officulorum viginti, linea laterali recta.*

Roda. Suecorum,

1. *Caput* latum & breve.
2. *Corpus* latum quoque, nec adeo tenue, sed subcrassum.
3. *Rictus* admodum angustus, ut vix digitus minimus intrudi queat.
4. *Mandibula* ambæ ejusdem longitudinis.
5. *Dentes* Faucium quatuor utrinque vel plures, & *Opercula branchiarum* ex Tribus officulis membranâ junctis, præter laminas utrinque constant, ut in Congeneribus.
6. *Oculi* exigui respectu congenerum. Iris obscure lutea, punctis nigris quasi irrorata.
7. *Corpus* à capite assurgit, & à cervice ad initium Pinnæ dorsalis in carinam subacutam contrahitur. *Venter* planus, sed spatium inter pinnas Ventrales & Anum parum acutum est.
8. *Branchia* utrinque quatuor, singulæ duplici Tuberculorum subacutorum ordine donatæ, quæ in tribus interioribus æqualia sunt, in exteriori vero, vel maxima branchia, Tubercula exteriora longiora existunt.
9. *Ductus* aliquot exigui in capite supra nares.
10. *Linea lateralis* propemodum recta, in medio latere sita.
11. *Squamæ* magnæ, imbricatim sitæ, coloris in toto corpore lutei vel aurei ad dorsum vero obscurioris.
12. *Pinnæ Pectorales*, *Ventrales* & *Ani*, una cum *Cauda* rubentes sunt.

13. *Pinnae Pectorales* rubescentes, officulorum quindecim, quorum primum robustius & indivisum ut & ultimum; cetera in apice ramosa; ultimum minimum.
14. *Pinnae Ventrals* rubentes, sed in extremitate nigricantes, officulorum novem, quorum primum cum 2do & 3tio maximum & indivisum una cum ultimo minimo, reliqua in apice ramosa.
15. *Pinna Ani* rubescens in apice vero nigrescens, officulorum decem, quorum duo prima admodum curta sunt vix observantur, reliqua multo longiora: tria prima indivisa sunt, cetera in apice ramosa.
16. *Pinna dorsi* cana & longa, radiorum Viginti, quorum duo primi admodum exigui & curti sunt; tres primi indivisi existunt, reliqui vero in apice bifidi.
17. *Cauda* ex rubescente & cano mixta, parum admodum bifurca, officulis in apice ramosis constans.
18. *Locus*: Lacus, stagna & paludes.
19. *Hepar*, Lien, Cor, Vesica transversum bipartita, ovaria duo ovis luteis referta, omnino ut in aliis speciebus hujus generis, sed Intestinum magis convolutum vel tortum est. Peritonaeum argentei coloris.

Longitudo Tota:	unc. 7. lin. 3.
ad medium Oculi.	7.
Pinnae Pectorales.	1. 8½.
Pinnae Ventrals.	3. 1.
Pinnae dorsi.	3. 3.
Ejusdem finem.	4. 8.
Pinnae Ani.	4. 7. cir.
Ejusdem finem.	5.
initium Caudae.	6.
Latitudo Perpendicularis.	
ad medium Oculi.	1. 1½.
Ejusdem ad Pin. Pectorales.	2. 2.
Ventrals.	2. 6.
initium Pinnae dorsalis	2. 6. Ead.
Pinnae Ani vel finem	
dorsalis pinnae.	1. 6½.
Pinnae Ani finem.	1. 1.
Transversa in medio corpore	1. 2.

XVI. *CYPRINUS biuncialis*, iridibus rubris, pinna ani officulorum novem.
Madd. vel skitspigge Succorum.

1. Caput: Còrpus; Nares: Os: Dentes: Membrana branchioftega: Linea lateralis ad Ventrem flexa: Branchiæ; situs Pinnarum &c. ut in Congeneribus.
2. *Dorsum* convexum. *Venter* parum prominens.
3. *Mandibula* superior clauso ore, tantillum longior Inferiore apparet.
4. *Irides* oculorum *rubræ*.
5. *Pinnae* *dorsi* posteriorem situm habet quam *Ventrales*.
6. *Pinna Ani* ossiculorum *Novem* plerumque.
7. *Cauda* in extremo parum bifurca.
8. Longitudo fescuncialis, & biuncialis in majoribus.
9. Piscis marinus, littoralis, portus & sinus Maris Baltici ad Sundermanniam, Roslagiam &c. gregatim frequentans.
10. Cum hoc eundem puto esse *Cyprinum minimum*, qui in *Laponia* ad Templum *Lykselense*, ab Amico nostro Cel. *Linnaeo*, in itinere *Lapponico*, detectus est; perfectiorem autem ejusdem piscis descriptionem dedit laudatissimus Auctor in itinere suo *Dalekarlico* inter zoologica primo die observata, in quo curiosissimo itinerrario per totam *Dalekariam* in rivulis sæpe minimis repertus est.

CLUPEA, G. Pisc. 4.

1. *CLUPEA* maxilla inferiore longiore, maculis nigris carens. *Strömming.* Suecis.

1. Caput à lateribus compressum, antè subacutum.
2. Pars capitis superior inter rostrum, oculos & dorsum, cælata vel parum concava est.
3. *Rictus* amplius respectu corporis
4. Quando Os aperitur, rostrum parum assurgit, & ossiculum maxillare superioris mandibulæ, quod inferiorem Maxillam utrinque tegit, antrorsum valde protruditur.
5. *Mandibula* inferior ante superiorem satis prominet, & ore clauso ab osse maxillari superioris *Mandibulæ* ad latera utrinque cooperitur & tegitur.
6. *Nares* conspicuæ quidem, duplici apertura præditæ, quarum anterior nudis oculis non conspici potest, rostro quam oculis paulo propiores.
7. *Oculi* magni, ad latera capitis siti. Iris *argentei* coloris.
8. *Denticuli* aliquot exilissimi: (a) in apice maxillæ inferioris, in superiori vero adeo exiles, ut vix, a minus circumspectis animadverti queant, itidem in apice. (b) Os laterale quoque maxillæ superioris, quod inferiorem utrinque tegit & claudit, in ambitu leviter serratum est. (c) Area oblonga denticellis confita

sita medio in antica parte palati: vel duo ordines Denticulorum in linea recta secundum longitudinem, in parte palati rostro proxima, siti. (d) Lingua subacuta, infernè soluta, coloris nigrescentis denticulis exiguis, introrsum versis armatur.

9. *Macula* ut plurimum pulchra, rubra vel violacea utrinque in fine Operculorum branchiarum.
10. *Opercula branchiarum*, maculâ dictâ (9) excepta, argentei coloris sunt, ex tribus vel quatuor Laminis ossis & Octo ossiculis parum curvatis & membranâ junctis utrinque inferius constant.
11. *Linea lateralis* recta, dorso propior, sed parum conspicua.
12. *Squamae* magnæ respectu corporis, coloris argentei, facile deciduæ, imbricatum sitæ.
13. *Dorsum* obscure cæruleum, verno tempore autem magis cærulescit. Latera & venter argentei coloris.
14. *Venter* totus à branchiis ad Anum usque subasper est, & in carinam acutam contractus; dorsum vero convexum, sc. nec acutum nec planum.
15. *Branchiæ* quatuor utrinque, quarum tres exteriores vel majores simplici Apophysium Pectiniformium ordine, quæ in suprema seu maxima branchia admodum longæ sunt, haud aliter ac plumæ partes in pennis Avium. Branchia infima seu minima duplicem apophysium asperarum ordinem habet; quarum interiores, breviores sunt.
16. *Pinna* in medio dorso unica & albescens, radiorum novendecim, quorum quatuor primi simplices sunt, reliqui in apice parum ramosi: duo primi exigui sunt.
17. *Pinnae Pectorales* albescentes, ad ventrem sitæ, radiorum octodecim, quorum primus simplex, reliqui omnes in apice parum divisi; ultimi minimi sunt: primus cum proximis maximus.
18. *Pinnae Ventrals* albæ & exiguæ, radiorum novem, quorum primus simplex; cæteri in apice quadrifidi; primus cum proximis magnus est, ultimus vero minimus.
19. *Pinna Ani* alba, caudæ satis propinqua, radiorum 18 vel 19, si ultimum pro duobus sibi nimis contiguis placeat numerare, quorum duo vel tres primi simplices sunt, cæteri in apice parum ramosi: Primus & ultimi minimi sunt.
20. *Cauda* bifurca, canescens, radiorum octodecim longorum, quorum duo simplices sunt, præter extremos minores, reliqui vero medii in apice ramosi sunt.
21. *Locus*: Mare solum in Suecia. Oceanus. &c.
22. *Cor* quadrilaterum, acutis angulis præditum.
23. *Hepar* rubrum, exiguum, angulosum cum Vesica fellea subtus.
24. *Ovaria* duo, magna, simplicia & lata, per totum abdomen extensa,

tenſa, inferne cohærentia, innumeris albeſcentibus reſorta.

25. *Ventriculus* quaſi duplex, infra œſophagum diviſus, & quidem ad dextram partem ſeu Pylorum Appendices quædam vel Di-verticula chyli oblonga, numero circiter 16 vel 17, quæ infra Pylorum ſita ſunt ab uno tantum latere Intestini, quod dein-de recta ad anum tendit. Ventriculi altera pars vel ſiniſtra, cum priori, membrana quadam ad finem conjungitur, & du-ctum ſuum in Veficam Natatoriam habet. *Lien* exiguus, ob-longus ad initium inteſtini.
26. *Vefica aërea* longa & anguſta, per totum abdomen extenſa, ſimplex, coloris argentei, facile ſeparabilis à dorſo.
27. *Peritonæum* obſcurum vel nigreſcens.
Viſcus renale coloris ſanguinis coagulati, ſpinæ dorſi ſecun-dum longitudinem adhæret.
28. *Coſtæ* ſunt utrinque triginta quinque; *Vertebræ* in univerſum quinquaginta ſex vel ſeptem; in *Spratto* Anglorum, 48 verte-bras tantummodo numeravi. *Herring* vero Anglorum verte-bras 56 vel mavis 57 obtinet (& ſecundum ſpeciem unus, idemque eſt cum *Sill* & *Strömming* ſuecorum); in *Encraſt-holo* ſeu *Anchovies* *vertebræ* 45 ad 46 & *coſtæ ſpuriz* non con-cretæ 9.

Longitudo tota	unc. 5. lin. 3.
ad medium Oculi	5.
Pinnaſ Pectorales.	1. 2½.
pinnam dorſi.	2. 4.
Pinnaſ Ventrales.	2. 5½.
finem pinnae dorſalis.	2. 9.
Pinnam Ani.	3. 4.
Ejuſdem finem.	3. 9½.
initium caudam.	4. 3.
Latitudo perpend. juxta medium Oculi.	6.
Pinnaſ Pectorales.	8½.
maxima infra Pectorales.	9½.
Pinnam dorſi.	9.
Pinnaſ Ventrales.	8.
Pinnam Ani	6.
minima paulo ante caudam.	3.
initium Caudæ.	3½.

II. *CLUPEA quadriuncialis*; *maxilla Inferiore longiore, ventre acutiſſimo.*

Spratti. Raji ſyn. Piſc p. 105.

Sprat. Londini anglorum.

Artedi *Synonymia.*

E

1. Ca-

1. Caput, Corpus, Os, Mandibulæ, Nares, Oculi, Lingua, Opercula Branchiarum, Membrana Branchioſtega, ſquamæ, color, dorſuum & figura in omnibus præcedenti ſpeciei (1) reſpondent, ut & Partes inteſtinæ.
2. *Macula rubra* in operculis Branchiarum utrinque, omnino ut in præcedente ſpecie, & præterea in toto corpore nullæ.
3. *Pinna* dorſi offiſculorum 17; Pectorales offiſc. 17; Ventræles offiſc. 7 vel 8; Ani offiſc. 19.
4. *Venter* à branchiis ad *Pinnam* ani Acutiſſimus eſt & quidem multo magis quam in Harengo ſeu Herring, Siſſ & Ström-ming, nam extremitas ſquamarum, quæ in carina ventris hanc aſperitatem efficiunt, in Harengis tam minoribus quam maioribus angulum Trianguli rectanguli vel quadrati repræſentat, in Sprattis vero omnibus Angulum Trianguli acutanguli efficit, vel clarius: Cuspis ſquamarum Ventris in Spratto & Harengo ejusdem magnitudine præditis, diverſam figuram ſc. acutiorem in Spratto & obtuſiorem in Harengo obtinet.
5. *Coſtæ ſpurie* utrinque Novem.
6. *Verrebræ* in univerſum 48 tantum, tam in minoribus quam adultioribus.
7. Longitudo quadriuncialis tantum vel paulo major, & sæpe triuncialis tantum.

III. *CLUPEA apice maxilla ſuperioris bifido maculis nigris utrinque.*

Clupea & *Aloſa* Auſtorum.

Schad. Angliſ.

1. Caput, Corpus, Os, Nares, Oculi, Opercula Branchiarum, Membr. Branchioſtega 8 offiſculorum, Squamæ, & figura maximarum partium, ut in prima ſpecie ſeſe habent.
2. Mandibula inferior ſuperiore paulo longior, minus tamen quam in prima ſpecie. Maxilla ſuperior in apice bifida vel quaſi bifurca eſt. Cranium pellucidum ad partem.
3. *Denticulorum* minimorum; imo unus ordo in apice Maxilla ſuperioris & margine offiſis lateralis. Mandibula inferior vel lingua & totum palatum edentula & omnino glabra ſunt. Lingua ſubacuta, nigricans. 2^o denticuli aliquot utrinque ad fauces ſuperne juxta Branchiam minimam.
4. *Nares* medix inter oculos & roſtrum, duplici foramine utrinque præditæ, quorum poſterius amplum & ſubrotundum eſt, Anterior vero poſteriori admodum vicinum, exiguum & clauſum, unde non obſervari poteſt, niſi per ſetam vel aliud inſtrumentum aperiatur, à nullo Ichthyologo hucusque animadverſum.
5. *Irides* oculorum argenteæ, cute communi teſtæ, Pupilla vero nigreſcens, libera eſt & cute non tegitur.

6. *Macula* nigra, magna, subrotunda utrinque infra Opercula Branchiarum dorso satis vicina, & præterea 4, 5 ad 6 minores à prima illa, in linea recta paulo supra Lineam lateralem, caudam versus dispositæ.
7. *Linea lateralis* parum conspicua, recta.
8. *Color* in dorso ex cæruleo, viridi & argenteo mixtus, in superiore capitis parte flavescens, in toto reliquo corpore argenteus. *Squama* magnæ, subrotundæ, albæ, molles, facile deciduæ.
9. *Squamæ* Ventris à Branchiis ad Anum aculeatæ admodum, & robustæ, numero 37, 36 ad 35, non enim constans est numerus illarum, figura harum squamarum seu ossium singularis est, nam à lateribus in longam spinam sursum eriguntur, & inferna sui parte, tam antèrèus quoque posterius, in aculeum brevem definiunt; aculeus posticus brevior est & carinam ventris serratam & aculeatam imprimis efficit.
10. *Pinnæ* omnes albentes præter dorsalem. *Pinnæ* Pectorales ossiculorum 14 ad 15. Vent. 9; Dorsi 18 ad 19; Ani 22 ad 23 quorum duo prima brevia. Cauda inultum bifurca, ossicul. 19 longiorum præter extrema breviora. *Squama* magna, oblonga singularis ad Pinnas Ventræles & Pectorales.
11. *Figura corporis* latior paulo quam in prima specie & forte tenuior etiam. Dorsum tam ante quam pone Pinnam dorsi convexum est, paulo magis tamen subacutum ante quam pone, non tamen in acutum, sed convexum.
12. *Longitudo* ad Latitudinem magis quam quadrupla. *Magnitudo* major quam Harengi.
13. *Branchiæ* omnino ut in prima specie sese habent, sed Apophyses in parte concava, ossæ, albæ & satis robustæ sunt.
14. *Intestina* ut in prima specie sese omnino habent, sed Appendices Pylori multo plures sc. 80 circiter, longæ & graciles. Peritonæum albescens. Costæ utrinque 30. Vertebrae numero 55; quarum ultima utrinque à lateribus apophysin acutam obtinet. Dorsales anteriores præter costas, quinque ordines Apophysium habent.
15. Coit sine Maji vel initio Junii, dum flumina gregatim subit. In ventriculo vermes plurimos, albos, vivos inveni.

EXOCOETUS, G. Pisc. 6.

I. EXOCOETUS.

Mugil alatus. Rondeletti l. 9. c. 6. p. 267. Willoughby p. 233.
Hirundo. Salviani fol. 185. 186.
Pesce Rondine Ital.
Flying Fish. Anglia.

1. *Caput* superne admodum planum, postica tamen sui parte magis catheto quam plagioplateum, anterius vero, clauso ore magis plagioplateum est; corpore medio angustius, non magnum.
2. *Corpus* oblongum, magis catheto quam plagioplateum.
3. *Dorsum* totum admodum planum & latum. Venter à branchiis ad pinnas Ventrals planus est, deinde ad caudam convexus.
Anus caudæ satis vicinus. *Dorsum* à capite non assurgit.
4. *Os* parvum seu rictus non amplus. *Rostrum* subacutum.
Mandibula inferior aperto ore, superiore longior apparet.
5. *Nares* satis amplæ, oculis quam extremo rostro paulo propiores, mediante appendice in medio quasi duobus foraminibus utrinque prædita.
6. *Oculi* ad latera capitis siti, magni, rotundi, cute communi capitis non tecti, rostro quam extremitati Operculorum Branchiarum propiores.
Iris argentei coloris. *Pupilla* subrotunda.
7. *Membrana Branchiosfega* ossicula decem utrinque continet, quorum tria superiora lata sunt & maximam partem sub operculis branchiarum teguntur. Omnia vero difficilia numeratu sunt.
Aperturæ Branchiarum non magnæ.
8. *Denticulorum* exilissimorum unus ordo in utraque maxilla, qui tamen in mandibula inferiore imprimis adeo exiles sunt, ut vix conspiciantur.
9. *Squammæ* magnæ, duræ sed læves albescentes, semicirculares vel angulosæ; ad basin seu anteriorem partem striis 3. vel 4 pluribus magnis notatæ. Densæ & secundum lineas rectas quasi sitæ sunt;
Color in lateribus & Ventre ex argenteo albus, in dorso autem obscurus seu fuscus. Hæ non tantum corpus sed & opercula branchiarum & caput ad rostrum usque tegunt.
10. *Linea Lateralis* nulla in Lateribus, sed in infimo corpore ad latera Ventris vera illa *Linea Lateralis* seu squamarum perforatarum, à branchiis ad inferiorem caudæ partem, recta fere extenditur.
11. *Pinnae Pectorales* juxta extremum operculorum Branchiarum in lateribus magis ad dorsum elevatæ, ad basin non horizontaliter, sed ut planum inclinatum affixæ, longissimæ ad initium caudæ nempe pertingentes, non latæ, ossiculorum septendecim, nodis quasi insignitorum & omnium præter primum in apice multum ramosorum, 2dum 3. 4 & 5m longissima sunt, ultima minima, & brevia. Superna sui parte membrana conjunguntur, & inferna parte spatia magna concava inter ossicula illa reliquuntur, latitudinem enim perpendicularem ossicula radiata habent, quod non parum ad volatum facit.
12. *Pinnae Ventrals* in infimo Ventre non longe ab Ano, satis lon-

longæ, albæ, magna distantia à se invicem remotæ, officulorum sex, omnium in apice ramoformum. Primum minimum est, 3 & 4 longissima.

13. Pinna Ani alba, exigua, officulorum undecim brevium, mollium: Im indivisum, reliqua in apice bifida.

Pinna dorsalis non magna, caudam versus, Pinnae Ani è diametro, albescens, officulorum undecim mollium & brevium, im indivisum, reliqua in apice parum ramosa. 2m. 3m. & 4m. reliquis paulo longiora.

14. Cauda multum bifurca, officulorum 15 longiorum, præter aliquot extrema breviora. Ex longioribus unum utrinque extremum indivisum est, reliqua in apice multum ramosa. Inferior caudæ pars superiore multo longior est.

15. Branchiæ utrinque quatuor, omnes duplici ordine Apophysium tuberculosarum & subasperarum præditæ, (fere ut in perca) in concava parte, præter exteriores in Branchia suprema seu maxima quæ interioribus 5 vel sexies longiores sunt, pectiniformes & duræ. Vasa sanguifera foliiformia in parte convexa singulæ Branchiæ duplicia sunt.

COREGONUS, G. Pisc. 7.

1. *COREGONUS* maxilla superiore longiore, pinna dorsi officulorum quatuordecim.

Sik Suecorum.

1. Corpus oblongum. Caput subacutum, ad latera compressum, supernè quodammodo pellucidum.

Rostrum quoque subacutum, & ante mandibulam inferiorem parum procurrens.

2. Dorsum à capite ad Pinnam dorsi primam, parumper acutum & in acumen contractum est, ab hac pinna vero ad caudam latum & multo planius est.

Venter à branchiis ad caudam usque latus est, respectu ad molem piscis habito.

3. Mandibula superior inferiore longior, ita ut ore clauso maxilla inferior, tam in apice, quam à lateribus, ab osse maxillari partis superioris utrinque operitur & clauditur. Foramina exigua in Mandibula inferiore & juxta nares sunt.

4. Rictus respectu corporis angustus.

5. *Limbus* Maxillæ inferioris & Palatum glabra omnino & edentula sed. Denticulorum in apice Mandibulæ Superioris.

- a. Unus ordo gracilium, oblongorum & submollium.

- b. *Lingua* Denticulis plurimis, minutissimis armata, ut &

- c. Fauces infernè & supernè ad finem branchiæ minimæ.

6. *Nares* duplici aperturâ utrinque præditæ, quarum anterior exigua est & subrotunda, posterior vero multo major & oblonga. Medio loco inter oculos & rostrum sitæ sunt.
7. *Oculi* ad latera capitis siti, quorum Pupilla cærulescens & ovato-acuta, sc. parte anteriore in angulum acutum desinens.
Iris argentei coloris.
8. *Opercula branchiarum* coloris argentei cum paucis aureo admixto, ex quatuor circiter Laminis ossibus & octo vel interdum novem ossiculis paulisper latis & curvatis, membranaque junctis utrinque constant.
9. *Branchia* utrinque quatuor, singulæ duplici ordine Apophysium Pectiniformium & servatorum donatæ, quarum anteriores multo longiores sunt & verè pectiniformes, imprimis in branchia extrema seu maxima; interiores vero in omnibus admodum breves sunt.
10. *Pinna lateralis recta*, dorso quam ventri propior.
11. *Squama* mediocres, coloris argentei, præsertim ad inferiorem corporis partem, in dorso vero colore obscure cano obnubilatæ, imbricatim sitæ; In toto capite & operculis nullæ.
12. *Pinna in dorso* duæ: Prior cano-nigrescens, ossiculorum quatuordecim, quorum quatuor prima simplicia sunt, reliqua vero in apice ramosa; Tria prima admodum exigua & curta sunt, imprimis omnium primum; duo ultima sibi admodum vicina.
13. Posterior Appendix tantum cutacea est, ossiculis carens.
14. *Pinna Pectorales* albo-canæ vel canescentes, in extremitate nigrescentes, Ossiculorum sedecim, quorum primum magnum & simplex, cætera vero in apice ramosa: Ultimum admodum exiguum, primum, 2dum, 3tium & 4tum longissima.
15. *Pinnae Ventrals*, superne albescentes, in extremitate cæruleo nigrescentes, Ossiculorum duodecim, quorum duo prima indivisa sunt, reliqua in apice ramosa; Primum omnium minimum est & admodum curvum, secundum, 3tium & 4tum longissima. Nota. *Apophysis* alba & squamosa supernè juxta has Pinnae utrinque.
16. *Pinna Ani* ad radicem albescens, cæterum nigra, ossiculorum septendecim, quorum quatuor prima simplicia sunt, reliqua vero in apice ramosa; Tria prima admodum exigua & brevia, præsertim omnium primum: quartum vero, 5m & 6m longissima sunt.
17. *Cauda* bifurca, cano-nigrescens, ossiculorum viginti longiorum, præter extrema quæ curta, exigua & numeratu difficilia, quorum 18 media admodum ramosa in apice sunt cum uno utrinque simplici & longo.
18. *Locus*: Sinus maris Baltici & Ostia fluminum in Gothia, Sudermannia, Roslagia, Gestricia, Helsingia, Medelpadia, Angerum

gerumnia, Westro-Bothnia, & aliis provinciis Sueciz maritimis.

19. *Cor* quatuor lateribus præditum, cum Auricula magna & Arteria ad exortum albescente & conica.
20. *Hepar* indivisum, albescens vel carnei coloris, transversum in suprema abdominis parte, a latere sinistro magis situm cum Vesica fellis exigua ad dextram partem.
21. *Ventriculus* primo ad medium fere abdominis recta procedit, deinde reflectitur ad diaphragma & multo amplior fit, In hujus partis medio Pylorus est, infra quem Appendices plurimæ primo intestinum circumdant, & postea, ab uno latere tantum idem ornant vel investiunt idque in suprema intestini parte. Tertio Intestinum à diaphragmate ad anum usque recta procedit, & in inferiore parte latius fit ac parum rugosum, quemadmodum in Salmone.
22. *Lien* exiguus, niger & triangularis ad flexuram Ventriculi.
23. *Ovaria* duo in fœminis, unum utrinque, per totum abdomen extensa.
24. *Vesica ærea* longa magna & simplex per totam abdominis cavitatem extensa, spinæ dorsali & lateribus fixa, sed facile separabilis cum ductu pneumatico in antica vesicæ parte conspicuo, qui in œsophagum terminatur. Figura in medio crassior & utrinque acuta est.
25. In Ventriculo dissecto mucum albescentem inveni, in intestino vero fæces nigrescentes cum Arena marina & Cochlea exigua.
Viscus illud sanguinolentum dorsi spinæ affixum pro renibus inservit.
26. *Caro* candida, mollis & suavis.
27. *Coit* in Angermannia, ubi frequens, circa finem Septembris.
28. *Lapides Capitis* in hoc genere oblongi & plani sunt.

Longitudo tota.	unc. 10.	lin. 5.
ad medium Oculi.		7.
Pinnas Pectorales.	1.	8.
Pinnam dors. 1mam.	4.	
Pinnas Ventrals.	4.	6.
finem pinnæ dors. primæ.	5.	
Pinnam Ani.	6.	9.
Pinnam dors. Cutaceam.	7.	6.
Ejusdem & pinnæ Ani finem.	7.	8.
initium Caudæ.	8.	7.
Latitudo juxta medium oculi.		9.
juxta Pinnas Pectorales.	1.	6½.

Pin-

Pinnam dorſi primam.	anc. 2. lin. 1½.
Pinnaſ Ventrales.	2. 1.
finem pinnae dorſi primae.	1. 9.
Pinnam Ani.	1. 4.
Appendicem cutaceam.	1.
Initium caudae.	7.

II. *COREGONUS edentulus, maxilla inferiore longiore.**Siklöja* Suecorum ad lacum Melerum, & Norlandis.*Smäfik* Smolundis.*Strint* Angermannis dicitur, qui marino minor.*Moiku* Finlandorum, vide Linnæi *Iter Lapponicum*.*Blickta* Siliensium, secundum Linnæi itinerarium Dalecarlicum.

1. Caput; Nares; oculi cum iride argentei coloris; Linea lateralis recta dorſo propior; squamæ & branchiæ ut in præcedenti specie.
2. Dorſum ante & pone pinnam dorſalem convexum est; Venter a pinnis pectoralibus ad ventrales planus est & parum latus; spatium inter pinnaſ ventrales & anum convexum est.
3. Mandibula ambæ & palatum edentula sunt; Lingua autem denticulis minutis exasperata, quod vix niſi in piſce exſiccato conſpici poteſt. Mandibula inferior in apice ſubacuta & ante ſuperiorem prominens, quo imprimis ab antecedente ſpecie differt.
4. Riſtus ſatis amplius reſpectu ad ſpeciem antecedentem, ut apex digiti in adultis ſine incommodo intruſi poſſit.
5. Membrana branchioſtega utrinque ſeptem vel interdum ſex offiſcula latiuſcula continet.
6. Squamæ rotundo-oblongæ, læves, imbricatim ſitæ, facile deciduæ.
7. Color in toto corpore argenteus, ſed in dorſo æruleſcens.
8. Pinna dorſalis caneſcens, offiſculorum tredecim vel quatuordecim, ſi omnium primum vix notabile adnumeretur, reliquis, in omnibus ita comparata, ut in ſuecorum *Sik*, Appendix cutacea quoque ut in *Sik*.
9. Pinnae pectorales albeſcentes, in extremo nigreſcentes, offiſculorum ſedecim, quæ omnia ita comparata ſunt, ut in præcedente ſpecie.
10. Pinnae ventrales albæ, offiſculorum duodecim, quorum primum admodum exiguum eſt & cultro ſeparari debet, ut diſtincte videatur, quod una cum reliquis omnino ut in *Sik* ſeſe habet; primum omnino integrum eſt ut in *Thymallo*.
11. Pinna ani albeſcens, offiſculorum quindecim vel rectius ſedecim, nam omnium primum ſupra omnem modum exile & cur-

- curtum est, ita ut cultro separari oporteat, reliqua in omnibus cum priore specie conveniunt.
12. *Cauda* bifurca, officulorum novendecim longorum, præter extrema; in reliquis cum priore specie convenit.
 13. *Locus* in Lacu Melero Sueciæ, imprimis ad oppidum Sigtuna & alibi copiose in julio capitur.
 14. *Inieffina* ut in præcedente specie se habent.
 15. *Costæ* utrinque sunt triginta tria. *Vertebrae* in universum quinquaginta octo, vel si omnium ultimam numerare placet quinquaginta novem, quæ tamen supra modum exilis est.
 16. Singulare est, quod ultimæ vertebræ admodum exiguæ sint & ad superiorem partem flectantur, non vero in medio ad initium caudæ pinnatæ desinentes, ut alias in omnibus fere piscibus affolet.

Longitudo tota.	unc. 6.	lin. 6.
ad oculum.		3.
finem Oculi.		6.
Pinnas Pectorales.	1.	2.
Pinnam dorfi radiatam.	2.	5.
Pinnas Ventrates.	2.	6.
finem Pinnæ dorfi 1mæ.	3.	3.
Pinnam Ani.	4.	
Ejusdem finem.	4.	8.
Appendicem dorfi pinniformem.	4.	7.
Ejusdem finem.	5.	
Caudam	5.	8.
Latitudo perpendicularis ad medium Oculi.		6.
juxta Pinnas Pectorales.	1.	2.
Pinnam dorfi 1m.	1.	5.
Pinnam Ani.	1.	
initium Caudæ.		5.

III. *COREGONUS* maxilla superiore longiore, pinna dorfi officulorum viginti trium.

Harr Angermannorum, Medelpadum, Helsingorum, W-Bothnienfium.

1. *Corpus* oblongum. Caput cathetoplateum, supernè planum & in apice acutum. Dorsum convexum in antica parte subacutum; venter à branchiis ad Pinnas Pectorales planus.
 2. *Dentes* breves, acuti: 1mo in Maxilla superiore reliquis majores, unus ordo, figura horum dentium conica ferè est. 2do in maxilla inferiore unicus ordo denticulorum minorum. 3tio In anteriore
- Arctæ* *Synonymia.* F pala-

palati parte à lateribus denticuli aliquot satis exiles in linea recta siti. 4to in apice palati area exigua, subrotunda ex denticulis aliquot constans. Ceterum totum palatum glabrum est. 5to Areolæ duæ denticulis. asperæ ad fauces.

3. *Lingua* glabra.
4. *Membrana* tenuis & tenax inter ordinem dentium & palati initium transversim extenditur ab una parte, libera & soluta.
5. *Mandibula* superior inferiore paulo longior. Riçtus mediocri, rotundo-quadratus
6. *Nares* utrinque duplici foramine præditæ, medio inter oculos & rostrum sitæ, vel oculis paulo propiores.
Ductus aliquot seu foramina in capite supra oculos.
7. *Iris* varii coloris, primo lucidi argentei, tum nigrescentis & obscure viridescents, præsertim ad partem posteriorem.
8. *Pupilla* cæruleo-nigrescens, ovata & antè in angulum acutum desinens.
9. *Membrana branchiosfega* decem utrinque ossa plana continet.
10. *Branchiæ* utrinque quatuor, omnes duplici ordine Tuberculorum subacutorum præditæ in parte concava.
11. *Linea lateralis* recta, dorso quam Ventri paulo propior.
12. *Squamæ* semicirculares ferè, magnæ, benè ad hærentes, & duræ in ventre coloris omnino argentei; in lateribus ab argenteo ad obscurum & tantillum viridem inclinantis: in dorso vero obscurè canescentes. Hæ non omnino imbricatim sitæ sunt, sed recta lineas tenent, easque viginti circiter numero in utroque latere constituunt.
Ipsi caudæ quoque squamæ exiguæ innascuntur.
13. *Pinna in dorso* magna, capiti quam caudæ propior, radiorum viginti trium, quorum tres primi admodum breves & exigui sunt, ceteri præter 4tum, 5tum & ultimum unam unciam & 5. lineas circiter longi, in maximis: septem primi in apice indivisi sunt, reliqui vero omnes in summo bifidi & quadrifidi.
Membrana nigrescens intermedia punctis & lineis rubris vel rubescentibus, ad partem vero posteriorem sæpius viridescens notatur.
14. *Appendix cutacea & pinniformis* in extremo dorso, officulis carens.
15. *Pinnae Pectorales* fuscescentes, radiorum sedecim, quorum primus & quartus ejusdem longitudinis sunt, secundus vero tertius & quartus omnium longissimi, reliqui ordine minores & ultimus minimus: primus & duo ultimi in apice indivisi sunt, reliqui omnes in summo multum ramosi.

16. *Pin-*

16. *Pinnae Ventrals* subrubentes, officulorum duodecim, quorum duo prima in apice indivisa, reliqua multum ramosa sunt: Primum omnium minimum est, & non tantum in apice indivisum sed omnino simplex, non tamen aculeatum.
Ad has Pinnae apophysis utrinque squamosa seu ossea, cute tecta ex ventre prodit.
17. *Pinna Ani* subrubra vel rubescens, radiorum quatuordecim, quorum duo primi exigui admodum, 5tus & sextus maximi: quatuor primi & ultimus indivisi sunt, reliqui vero in apice multum ramosi. Ultimus non solum in apice indivisus est, sed etiam simplex quasi & concretus, robustus & tantillum aculeatus.
18. Cauda bifurca, itidem tantillum subrubens, radiorum novendecim longorum praeter extremos minores numeratu difficiles.
Ex officulis longis unum utrinque extremum in summo indivisum est, reliqua vero in apice admodum ramosa sunt.
Coit Medio Maji, in Angermannia.
19. Costae utrinque sunt triginta & quatuor, quarum quae capiti proximae apophysin in superiore parte ad basin habent, Vertebrae vero sunt numero quinquaginta & novem.

Longitudo tota.	unc. 13. lin. 4.
ad oculum.	7½.
Ejusdem finem.	1. ferè.
Pinnae Pectorales.	2. 3.
earundem finem.	2. 5.
Pinnae dorsi primam.	4. ½.
Pinnae Ventrals.	5. 6.
finem Pinnae dorsi primae.	6. 6.
Pinnae Ani.	9.
Pinnae dorsi Adiposam.	9. 6.
Ejusdem finem.	9. 9½.
finem Pinnae Ani.	9. 9.
initium Caudae.	11. 2. cir.
Latitudo perpendicularis juxta medium Oculi.	1. 2.
Pinnae Pectorales.	2. 3.
Pinnae dorsi primam.	2. 7.
Pinnae Ventrals.	2. 5. f.
finem Pinnae dorsi primae.	2. 2.
Pinnae Ani.	1. 7. f.
Pinnae Adiposam.	1. 4.
Ejusdem & Pinnae ani finem.	1. 2.

44 *Malacopterygii.*

Coregoni.

Minima juxta Caudam.
seu Apertura inter extremi-
tates caudæ

unc. lin. 8½.

3. 8. cir.

IV. *COREGONUS amboinensis.*

Coregonoides vel Albulæ ad Amboinam India Orientalis.

1. Caput & Corpus cathetoplatea.
Caput breve, obtusum. Corpus latum & satis tenue.
2. *Dorsum* ante pinnam dorsalem & Venter subacuta sunt.
3. *Os* seu rictus mediocres. Mandibula inferior ore aperto longior, sed clauso æquales ferè sunt.
4. *Nares* satis amplæ, duplici foramine utrinque præditæ, medio fere inter oculos & rostrum.
5. *Oculi* à lateribus capitis siti, subrotundi, mediocres. Iris rubescens.
6. *Membrana Branchioflega* officula 5 vel 6 gracilia, latiuscula & numeratu difficilia utrinque continet. Aperturæ Branchiarum mediocres.
7. *Dentium* brevium sed crassorum & robustorum unicus ordo in Maxilla Inferiore. In superiore vero, duo ordines ejusmodi dentium. Lingua, palatum & fauces glabræ.
8. *Squamæ* magnæ, albescentes, semicirculares, tenues & molles, imbricatum fitz.
Color totius corporis albo-argenteus, dorsum vero obscurius.
9. *Linea lateralis* supra pinnas Pectorales deorsum parum flexa, deinde recta ad caudam descendens in medio fere corpore vel dorso tantillum propior.
10. *Pinna* in medio fere dorso unica, offic. 12 mollium, quorum posteriora in apice parum bifida; 2m, 3m, 4m & 5m longissima. In extremo dorso versus caudam *Appendix* membranacea, officulis destituta adest.
11. *Pinnae* Pectorales ventri vicinæ ut planum inclinatum fitz, oblongæ, offic. 13 gracilium, quorum 1m satis magnum & indivisum, reliqua in apice parum bifida.
12. *Pinnae Ventræ* angustæ & oblongæ, offic. 9 ad 10, quorum duo prima in apice indivisa, reliqua tantillum bifida. 1m admodum breve ad radium 2di.
13. *Pinna Ani* longa ad caudam usque extensa, offic. 34, quorum 3 prima in apice indivisa, reliqua bifurca. 1m admodum exiguum & breve est, 3m, 4m & 5m longissima, reliqua brevia.
14. *Cauda* satis lata & multum bifurca, offic. longiorum præter extrema breviora, ex longioribus, præter utrinque extremum, media ramosa sunt.
15. *Branchiæ* utrinque quatuor, quarum duz inferiores duplici apo-

apophysum exilissimorum ordine donantur, superiores unico tantum in exteriore latere; sunt autem apophyses exteriores in branchia imprimis suprema oblongæ & pectiniformes.

16. Longitudo 3 unc. Latitudo max. 1 unc. 5 lin.

Figura Corporis omnino ut in Braxenpanka Uplandorum.

OSMERUS, G. Pisc. 8.

I. *OSMERUS.*

Nors Suecorum.

a. *Slom* (qui major est) Suecis.

1. *Caput* oblongum & subacutum. *Rictus* amplus.
2. *Dorsum* totum convexum. *Venter* parum planus. *Corpus* oblongum & benè habitum.
3. *Mandibula* inferior ante superiorem prominens.
4. *Nares* duplici aperturâ conspiez, medio inter oculos & rostrum sitæ
5. *Oculi* ad latera capitis siti, satis magni subrotundi, cute communi capitis non tecti, quorum *Pupilla* nigra & subrotunda (non ovalis ut alias in Truttaceo Genere). *Iris* coloris argentei, ad superiorem vero partem pulchre cærulescens.
6. *Caput* totum superne canescens cum punctis nigris minimis & virore quodam admixto, adeo pellucidum ut *Cerebrum* & ejus lobi optime transpareant.
7. *Opercula branchiarum*, quæ coloris argentei splendentis sunt, ex duabus laminis osseis constare videntur (cum tamen quatuor ad minimum utrinque adsint) & præterea infernè ex septem & interdum spinis curvatis & membranâ junctis utrinque componuntur.
8. *Branchiæ* quatuor utrinque, quarum duæ superiores simplici, duæ inferiores duplici *Tuberculorum* ordine donantur. Hæc *Tubercula* in *Branchiis* duabus inferioribus admodum exigua, acuta, aspera, & propemodum æqualia sunt, tantum quoad exteriora, præsertim in secunda branchia paulo longiora. *Tubercula* vero illa in *branchiis* duabus superioribus simplicia, longa, pectiniformia & aspera existunt, præsertim in branchia suprema.
9. *Dentes* (a) in utraque maxilla, & quidem in limbo maxillæ superioris unus ordo *Denticulorum* gracilium, intra vero vel supra hos (b) in antica parte palati *Dentes* aliquot magni & robusti numero 4, 5 ad 6, qui utrinque à lateribus interius in palato ordinem quandam ex tribus vel pluribus dentibus minoribus constantem habent; inter hos vero in medio palato duo ordines *Dentium* in linea recta dispositorum & longorum.

In maxilla inferiore duo ordines Dentium quorum exterior minor & ex denticulis minimis, interior vero ex dentibus majoribus numero, 9 circiter constat. Lingua in apice tres, quatuor vel 5 dentes robustos & magnos habet, in postica parte vero duo vel tres ordines Denticulorum minimorum conspicitur.

10. *Linea lateralis* recta, dorso admodum propinqua.
11. *Color* in dorso varius, nam in supremo dorsii maximam partem canus est, paulo infra canum pulchre viridis, infra viridem vero linea angusta caerulea extenditur, quam color argenteus excipit paulo supra lineas laterales, qui color latera & ventrem investit, in inferiore vero laterum parte, aliquid Violacei conspici potest.
12. *Squamæ* albæ, ovales, molles, mediocres, facile deciduæ, omnino imbricatim sitæ.
13. *Pinnæ* omnes præter caudam albescentes.
14. *Pinnæ* in dorso duæ; Prior cano albescens, radiorum Undecim, quorum primus & ultimus minimi; duo primi indivisi, reliqui in apice admodum ramosi. Pinna posterior vero est Appendix cutacea, radiis carens.
15. *Pinnæ Pectorales* albæ, radiorum undecim, & sæpe 12decim, quorum unus indivisus, cæteri vero in apice ramosi; Primus, 2dus & 3tius maximi sunt, ultimi vero minimi.
16. *Pinnæ Ventræles* albæ, radiorum octo, quorum omnes (excepto primo) in apice valde ramosi. Primus exiguus & ad radicem omnino simplex est, non tamen aculeatus.
17. *Pinna Ani* alba, radiorum septendecim, quorum tres vel 4 primi simplices, reliqui in apice ramosi; ultimi duo, qui sibi admodum vicini, & primi minimi sunt.
18. *Cauda* bifurca, canescens, radiorum 19 longiorum & parum in apice ramosorum, præter extremos laterales vix numerabiles.
19. Totum fere corpus, imprimis dorsum versus, pellucidum est, & male olens.
20. *Locus*: Lacus, fluvii & sinus etiam Maris Baltici.
21. *Cor* pallescens tribus vero 4 lateribus præditum.
22. *Ovarium simplex*, longum, totam abdominis cavitatem implens, ovis flavo-albescentibus innumeris refertum.
23. *Hepar* rubrum à sinistro latere magis situm, superne in duos vel 3 lobos exiguos divisum, ubi Vesica fellea obscure lutea & interdum pellucidissima ei jungitur.
24. *Ventriculus* exiguus cum longo & crasso Processu infra Pylorum extenso. Circa medium Ventriculi Pylorus egreditur, qui ad superiora reflectitur & deinde recta ad Anum tendit. Ad initium Intestini Appendices vel Diverticula chyli quatuor vel plura curta & crassa adnata.

25. *Vesica aërea simplex*, in medio amplior, ad extremitates angusta & acuta, præcipue ad posteriorem partem. Ad anteriorem vero, Canalis pneumaticus eam ingreditur, qui ortum suum in œsophago, supra ventriculum sumit: In unico hujus generis, Vermiculos longos albos in vesica observari.
26. Peritanzum coloris argentei punctulis nigris irroratum, ad dorsum vero nigrescens est.
27. *Vertebra* in universum quinquaginta novem. Costæ utrinque triginta quinque.
28. Duo Lapides candidi & figurâ lati in capite.
29. *Coitus* fit Martio & Aprili unde & tunc temporis magna copiâ capitur, gravemque ac quibusdam intolerabilem de sese spergit odorem
- Nota.** *Eperlani Minores*, proprie *Nârs* Suecis dicti, in nulla re essentiali à *majoribus Slom* differunt, nam quoad rostrum, dentes, branchias, Pinnae, numerum ossiculorum Pinnarum, proportionem, colorem, & Intestina attinet, omne sibi simile atque unum idemque sunt. Differentia a. illa à magnitudine desumta, frivola & nauci est, quod quilibet à plurimis exemplis contrarium evincenitibus facillimè perspiciat.

Latitudo tota.	unc.	lin.	Item Ead. Long in Slom.	unc.	lin.
	3.			7	6.
ad medium oculi.			ad nares.		4.
		2½.		7.
Pinnae Pectorales.	6.		1.	6.
Ventrales.	1.	3.	3.	5½.f.
Pinnam dorsi					
1mam.	1.	3½.	3.	5.
Ejusdem finem.	1.	5.	4.	
Pinnam Ani.	2.		4.	9.
Ejusdem finem.	2.	3.	5.	7.
Pinnam dorsi.					
2dam.	2.	1.	5.	3.
Ejusdem finem.	2.	2.	5.	6.
initium Caudæ.	2.	6.	6.	4. cir.
Latitudo juxta medium				6½.
Oculi.	3.				
Pinnae Pectorales.	4.		1.	
Ventrales & Pinnam dorsi primam.	4.		1.	2.
			finem Pinnae dorsi. 2dæ.	1.	2.
Pinnam Ani.	2½.			7½.
Ejusdem finem.	1½.			4.

SALMO,

S A L M O, G. Pisc. 9.

I. *SALMO* rostrum ultra inferiorem maxillam sæpe prominente.*Lax* Succorum.

1. Piscis tam mariniis quam fluviatilis est.
2. Caput acutum & exiguum respectu molis corporeæ, clausoque ore quodammodo conicum.
3. Rictus, respectu corporis, satis amplius.
4. Rostrum clauso ore ante inferiorem Mandibulam prominet.
5. Nares duplici foramine præditæ, oculis quam rostro paulum propiores.
6. Oculi ad latera capitis siti, rotundi; Iris argentei coloris, cum paucis viridescens admixto. Pupilla nigrescens, posterius rotunda, ab anteriore parte in angulum subacutum protensa.
7. Opercula branchiarum coloris argentei, ex duabus vel rectius quatuor Laminis ossibus & duodecim ossibus latiusculis & parum curvatis, membranaque junctis utrinque constant.
8. Maculæ nigræ subrotundæ vel irregulares in Operculis vel Laminis branchiarum (7).
9. Linea lateralis rectissima, dorso quam ventri propior.
10. Maculæ nigræ & irregulares supra & paulo infra Lineam lateralem (9), sed raræ.
11. Squamæ mediocres, imbricatim sitæ, in dorso majores & nigrescentes, alias argentei coloris.
12. Dorsum convexum, Venter vero parum latus.
13. Dentium acutorum unus ordo: 1mo in limbo maxillæ tam inferioris quam superioris, inter quos sunt quidam dentes minores & mobiles. Nota In maxilla superiore Dentes plures sunt: 2do Duo ordines Dentium robustorum ad latera palati lineâ rectâ secundum longitudinem dispositorum, inter quorum interstitium in antica parte duo, tres vel plures dentes sunt minores. Cetera totum palatum medium glabrum est. In initio faucium circa superiorem & inferiorem partem branchiæ minimæ, dentes aliquot acuti, introrsum versi, ad sunt.
- 3tio. Lingua crassa, duplici quasi ordine quatuor, 5, 6, vel septem &c. dentes acutos introrsum curvatos habet.
- 14 Branchiæ utrinque quatuor, singulæ, parte cava, duplici tuberculorum dentiformium & subasperorum ordine donatæ, quæ Tubercula vel apophyses à parte interiori minores sunt, ab exteriori vero majores. In maxima seu extrema branchia, apophy-

phytes exteriores admodum longæ & acutæ sunt; interiores admodum paucæ & exiles.

Plumæ in parte convexa omnium branchiarum duplices sunt.

15. *Pinnae* in dorso duæ: Prior radiorum quindecim, quorum tres primi exigui & simplices sunt, cæteri in apice ramosi: 4tus & 5tus longissimi; duo ultimi sibi admodum vicini. Posterior pinna dorsi, nigra, pinguis, membranosa & officulis destituta est.

16. *Pinnae* Pectorales in extremitate nigrescentes, officulorum quatuordecim, quorum primum maximum & simplex, cetera & in apice ramosa: ultimum minimum est.

17. *Pinnae* Ventrals albescentes cum paucis nigro superne admixto, ossium novem, interdum vero 10, quorum primum cum secundo longissimum, cetera admodum ramosa in apice & robusta: ultimum minimum est. Officulum primum seu minimum omnino simplex est in exortu; non tamen in apice aculeatum.

Nota. Apophysis magna, squamosa & alba juxta hanc Pinnam, ad superiorem ejus partem semper adest.

18. *Pinna* Ani alba & subpinguis, officulorum duodecim vel tredecim, quorum duo vel tria prima exigua sunt & simplicia, 4tum & 5tum longissima, cum reliquis sequentibus in apice ramosa.

19. *Cauda* nigrescens, parum bifurca vel segmento circuli quasi excavata, ossium novemdecim longorum, præter extrema breviora.

20. *Locus*: Mare Balticum & fluvii omnes majores in mare Balticum fluentes.

21. *Cor* quadrilaterum.

22. *Hepar* magnum, rubrum, simplex, à latere sinistro situm, superne convexum & glabrum, inferne inæquale, in nullas apophyses magnas, sed exiguas saltem quasdam divisum. Vesica fellis subtus est obscure viridis.

23. *Ventriculus* primo recta ad medium abdominis circiter descendit, tum reflectitur ad diaphragma fere, & in medio hujus partis reflexæ, ubi Pylorus est, Appendices numerosissimæ, pinguedine circumseptæ adsunt, quæ ad finem usque hujus partis continuant; tandem à diaphragmate ad anum usque intestinum recta procedit, quod in media inferiore parte amplius est superiori & rugosum.

24. *Ovaria* duo, simplicia, ovis rubris & magnis referta, unum sc. utrinque. Nota. In anteriore parte juxta diaphragma primum Ovis implentur, & sic consequenter.

25. *Diaphragma* robustum.

26. *Peritoneum* carnei coloris.

Artedi Descriptiones.

27. *Vesica nœrea* longa, per totam abdominis cavitatem juxta spinam dorsi extensa & facile separabilis
 28. *Reues* duo, magni & longi, secundum dorsi spinam extensi.
 29. *Vertebrae* in universum quinquaginta sex: *Costae* utrinque 33 circiter.

Longitudo Tota;	unc. 28.	lin. 7.
ad Oculum.	1.	9.
Ejusdem finem.	2.	3½.
Pinnas Pectorales.	5.	3.
Pinnam dorsi primam.	12.	3.
Ejusdem finem.	15.	9.
Pinnas Ventrals.	14.	4.
Pinnæ Ani.	20.	
Ejusdem finem & Pinn. adiposam.	22.	1.
initium Caudæ.	27.	
Latitudo juxta medium Oculi.	2.	8.
Pinnas Pectorales.	5. f.	
Pinnam dorsi primam.	6.	9.
Ejusdem finem.	6.	2.
Pinnam Ani.	4.	8.
Ejusdem finem.	3.	3.
Finem Pinnæ Adiposæ.	2.	8.
Minima prope Caudam.	2.	
Seu Apertura in extrema Caudæ bifurcatæ,	2.	7: 8.

II. *SALMO minor, vulgari similis,*

Laxunge Elfkarlis.

1. *Piscis* fluviatilis.
2. *Salmoni* descripto omnibus partibus & colore similis admodum est.
3. Sed Caput, respectu corporis habito, majus est, magis angulatum, rostrumque minus acutum, quam in *Salmone*.
4. *Iris* argenteo aurei coloris.
5. *Nares*, mandibulæ, *Opercula* branchiarum & maculæ tam *Operculorum*, quam laterum & dorsi, omnino ut in *Salmone nigra*, sed crebriores, imprimis in lateribus, & sæpe cruciformes, ossicula branchiostega decem vel duodecim.
6. *Pinna dorsi* cana, maculis nigris punctata, radiorum 14 v. 15; ut in *Salmone*.
7. *Pinnæ Pectorales* ad radicem albescentes, in extremitate nigræ, radiis

radiis 14. *Ventrales* Albæ, radiis 10. *Ani* itidem radiis 12 constant.

8. *Cauda* nigra, parum furcata.

9. *Linea lateralis* recta.

10. *Dentium* unus ordo in *Maxillis* ut in *Salmone*, quorum quidam in *gingiva* latent absconditi, qui mobiles sunt.

Duo ordines *dentium* in *lingua*, quorum quinque ut plurimum fixi sunt, horum vero alterni, qui pauciores, mobiles sunt.

Palatum non tantum duos ordines *dentium* ad sui latera in *linea recta* dispositos habet, sed etiam in medio *palato* arcem oblongam *denticulis acutis* constitam, prioribus paulo breviorrem obtinet.

11. *Longitudo* pedalis sæpe quidem 12 unciarum & major.

12. *Côr* quadrilaterum.

13. *Hepar*, *Lien*, *Ventriculus*, *intestinum*, *Ovaria*, *Vesica aërea* &c. omnino ut in *salmone*.

14. *Ventriculus* dissectus mucum albescentem viscidum & cutem insecti *Onisco* similis continebat.

III. *SALMO latus, maculis rubris & nigris, cauda equali.*

Superior lamina operculorum branchiarum in *Salmone* (primo) *Willughbeji* in *cuspidem* vel *apophysin* desinit, ut & *inferior* in quibusdam, maioribus præcipue: sed in hoc pisce *laminæ* utraq̃ue ambitu sunt *rotundo* vel *semicirculari*. Hic dein plures *nigras maculas & rubras* gerit, sed proxime præcedens (*Laxunge*) plerumque solum *maculis nigris* aspersus est. *Coi-tus Salmonis* in *Suecia* fit *media ætate*, at *hujus* serius, ut & proxime præcedentis.

IV. *SALMO maxilla inferiore paulo longiore, maculis rubris.*

Stenbit & Bäckrö Angermannorum.

Forrell & Rösik Aliis

1. *Vertebræ* in universum 60, *costæ* utrinque 30 circiter.

2. *Dentium* tres ordines in *palato*, omnes *longitudinales & fere paralleli*, quorum *medius maximus* est, sed non omnino in *recta linea* procedens; unus ordo *dentium* utrinque in *mandibulis*.

3. *Mandibula inferior* superiore paulo longior apparet.

4. *Cauda* non *bifurca*, sed potius *segmento circuli* quasi in *extremitate* exarata.

5. *Maculæ rubræ* infra *lineam lateralem* & *nigræ* in *laminis hypophthalmicis*.

Hæc 1-5, ex pisce Stenbit Helsingorum fluvii Liusna.

V. *SALMO vix pedalis, pinnis ventralibus rubris, maxilla inferiore paullo longiore.*

SALMO Lapponicus Alpinus Linnæi, in itinere Lapponico descriptus, *Roedfish* Novaccolis Lapponiz & *Roeding* dictus; de quo Cl. Linnæus loco citato: In lacubus summis Alpium Lapponicarum frequentissimus, & in his fere solus hic occurrit piscis sat magna in copia, qui a Lapponibus per æstatem piscatur, assatur ante focum recens, editur absque butyro sale, & pane, palato gratissimus; suspicatur, & eundem reperiri sub nomine *Torgoch* in alpibus *Wallia*, inque Actis Anglicanis descriptum esse, cum caro ejus sit ruberrima, color argenteus, locus alpinus; miratur, nec sine causa, quod piscis hic in alpium lapponicarum lacubus vitam sustentare queat, cum in istis nec vegetabilia, nec pisces alii, nec insecta facile reperiantur ulla; putat & eundem sub diluvio universali eo delatum fuisse, cum horrendæ cataraetæ ubique impediunt, quo minus ullus piscis alpes ascendere possit. Merentur & omnino reliqua evolvi, cum prodierit desideratissimum diu opus Auctoris Lapponicum.

Longitudo tota.	unc. 7.	lin. 5.
ad Oculum.		5.
Ejusdem finem.		8.
Pinnas Pectorales.	1.	5.
Ejusdem finem.	1.	7.
Pinnam dorsi primam.	3.	
Pinnas Ventrals.	3.	5.
Finem Pinnæ dorsi primæ.	3.	8.
Pinnam Ani.	4.	9.
Pinn. dorsi secundam.	5.	2.
Finem Pinnæ Ani.	5.	4.
Initium Caudæ.	6.	1.
Latitudo juxta medium Oculi.		9.
Pinnas Pectorales.	1.	3.
Pinnam dorsi primam.	1.	5½.
Pinnas Ventrals.	1.	4.
Finem Pinnæ dorsi primæ.	1.	3.
Pinnam Ani.	1.	1.
Ejusdem finem.		8.
Pinnam dorsi secundam.		9.
Initium Caudæ.		7.

E S O X, G. Pisc. 10.

1. *ESOX* roſtro plagioplateo.
Lucius, Auſonii in Moſella, verſu 120.
Giadda Suecorum.
1. *Caput* longum & ſingularis figuræ; antica enim pars ob oculis ad apicem roſtri plagioplatea eſt, poſtica vero, quæ paulo longior, ab oculis ad dorſum eathetoplatea exiſtit.
2. *Corpus* oblongum & quodammodo quadrangulare; dorſum enim à capite ad pinnam in extremo dorſo, caudam verſus, planum & rectum eſt, latera plana ferè, & *Venter* a branchiis ad Anum uſque planus exiſtit.
3. *Mandibula* inferior ante ſuperiorem prominens.
4. *Rictus* magnus, & incifura oris ad oculos ferè pertingens.
5. *Nares* magnæ, patulæ, duplicem aperturam utrinque habentes, cum diſtantia notabili inter duo illa foramina, mox ante oculos ſitæ.
6. *Oculi* à lateribus capitis plani. Iris luteſcens, vel ex colore albo, nigreſcente, obſcure luteo & fæpe virideſcente conſtans.
Pupilla ovalis & cæruleſcens.
7. *Ductus* ſeu Foramina duodecim circiter in capite, quorum ſex ſunt pone oculos, duo inter oculos, duo inter Nares, & duo ante nares in ipſo roſtro. Præter hæc vero in limbo mandibulæ inferioris & juxta collum tredecim circiter vel plura foramina utrinque conſpiciuntur.
8. *Membrana branchioſtega* quatuordecim offacula utrinque continet.
9. *Dentium* α . Ordo unicus in maxilla inferiore, quorum anteriores minores ſunt, poſteriores magni & robuſti.
Omnes vero alternatim mobiles & fixi ſunt.
In limbo maxillæ ſuperioris à lateribus nulli omnino dentes ſunt, circa roſtrum vero utrinque denticulorum exilium ordo adest.
- β . Tres ordines *Dentium* in Palato, ſecundum longitudinem ſiti & ſibi paralleli, quorum medius ex denticulis exilibus conſtat, Ordines laterales autem ex dentibus magnis, introrſum verſis & ſingulis mobilibus conſtant.
- γ . *Lingua* in extremo parum bifida & denticellis aſpera, ut & partes pone linguam.
- δ . Ad fauces Offacula denticellis aſpera, quorum duo oblonga inferius ad minimam branchiarum, ſupernè vero quatuor offacula exigua, denticellis conſita adſunt.

10. *Linea lateralis recta.*
11. *Squamæ rotundo oblongæ.*
12. *Color in dorso nigrescens.*
13. *Pinnæ dorsæ, Ani & caudæ obscure lutescentes, & maculis nigrescentibus notatæ. Pinnæ Ventræles & Pectorales unius coloris sunt, sc. albo-flavescentis vel fuscescentis.*
14. *Pinna in dorso unica, in extremo dorsæ, caudam versus, è regione Pinnæ Ani sita, ossiculorum Viginti & unius, quorum tria prima & ultimum minima sunt, media maxima & longissima; horum sex prima in apice indivisa, reliqua omnia, ut & ultimum, in summo bifurca sunt Omnia vero ad exortum duplicia & ex duobus ossiculis, arcte adhzrentibus, componuntur.*
15. *Pinna Pectorales oblongæ, ossiculorum quindécim, quorum ultima admodum exigua sunt, media reliquis longiora; Primum & ultimum in apice indivisa, reliqua omnia in summo ramosa sunt. Singula ad exortum duplicia.*
16. *Pinnæ Ventræles ossic. undécim, quorum ultima minima sunt, & media longissima; primum (quod satis robustum) & ultimum in summo indivisa, reliqua omnia in apice ramosa sunt, vel plerumque in tres surenlos divisa.*
17. *Pinnæ Ani ossiculorum octodécim, quorum tria prima & tria ultima minima sunt, 5tum 6; 7, 8; 9, longissima; quinque prima & ultimum in apice indivisa sunt, reliqua vero in summo bifida & trifida. Omnia verb ad exortum duplicia existunt.*
18. *Cauda bifurca, ossiculorum novendécim longorum, quorum utrinque extremum in apice indivisum est, reliqua intermedia ramosa sunt, sed penultimum utrinque, & omnium medium, bifida solum in extremo existunt. Præter hæc ad latera caudæ ossicula aliquot curta & exigua, numeratu difficilia & vix digna.*
19. *Branchiæ utrinque quatuor, parte concava aculeis dentiformibus creberrimis munitæ.*
20. *Cor oblongum, quadrilaterum cum basi plana pro 5to latere, supernè Aortam habens, cujus venter oblongus & albus est. Auricula vero ad basin cordi inseritur.*
21. *Hepar à sinistro latere situm, simplex seu indivisum, oblongum & planum, ad medium abdominis protensum, utrinque glabrum seu nullis inæqualitatibus præditum. Vesica fellis subtus ad superiorem partem sita est. Ventriculus angustus & longus; ad medium abdominis descendens, ubi Pylorus incipit, nullis Appendicibus præditus; huic vero Intestinum annectitur, quod primo sursum ascendit ad diaphragma usque, deinde recta ad Anum descendit.*
22. *Ovaria duo in fœminis, unum sc. utrinque ad latera Vesicæ*
Aëreæ

Aëreæ, per totum abdomen extensum. In maribus Vesicæ duæ feminales eodem modo se habent.

23. *Lien* triangularis & ferè æquilaterus coloris obscure rubri, ad Pylorum situs.
24. *Vesica aërea* simplex, oblonga & robusta, per totum abdomen extenditur, dorsoque adhærescit, ita tamen, ut facile separari possit. Canalis pneumaticus in apice seu suprema parte orificium Ventriculi ingreditur.
25. *Viscus* illud sanguinolentum, secundum totam dorfi spinam extensum, Renes sunt; nam in infima abdominis parte, Vesica urinaria oblonga conspicitur.
26. *Peritonæum* albidissimum & splendens.
27. *Vertebrae* sunt sexaginta & una. Costæ vero utrinque 39.
28. *Caro* alba, subdura, sapida & salubris.
29. Cibus hujus piscis, sunt præter Clupeas minores, omnes ferè generis pisces, ut & Esores minores, Angues, mures & aves aquaticæ, nam supra modum vorax est. *Cottum capite polyachanto*, Nobis sumpta dictum, semel in ejus ventriculo inveni.

AMMODYTES, G. Pisc. 13.

I. AMMODYTES.

Sand Eels dicuntur majores Anglis.

Grigs vero minores audiunt.

1. *Caput* cathetoplateum, seu ad latera compressum, corpore ipso multo angustius, & antè acutum.
2. *Corpus* longum & gracile, parum cathetoplateum seu ad latera compressum.
3. *Mundibula* Inferior angusta, acuta & satis longe ultra Superiorem prominens. Quando inferior multum premitur deorsum, pars maxillæ superioris, pari modo ac in Cyprinis, deorsum nutat. Rictus satis amplus.
4. *Nares* duplici utrinque foramine præditæ, medio inter oculos & rostrum.
5. *Oculi* ad latera capitis, subrotundi, nulla membrana communi tecti: Iris argentei coloris.
6. *Laminæ* branchias tegentes magnæ, ossæ. Aperturæ branchiarum amplæ.
7. *Membrana branchiostega* 7. utrinque ossicula continet, quæ magnam partem sub laminis branchiarum (b) delitescunt.
8. *Linea lateralis* recta medio inter dorsum & Ventrem decurrens, quæ tamen non est vera linea lateralis, sed Linea illa, quæ

quæ interstitia muscutorum indicat; Præter hanc *Linea utrinque recta* à capite ad caudam extensa, & dorso admodum vicina, ex figura squamularum orta, quæ est *vera Linea lateralis*, respectu ad alios pisces habito.

9. A Pinnis Pectoralibus per medium Ventrum tres Lineæ prope modum rectæ extenduntur, quarum media ad Anum terminatur, reliquæ duæ laterales ad caudam usque pertingunt.
10. *Squamæ* admodum exiguæ, in dorso canescentes, infra lineas laterales & in ventre coloris argentei. *Squamæ* hujus piscis antea non observatæ sunt.
11. *Pinna Pectorales* oblongæ, angustæ & exiguæ, mox infra branchias in infimo latere ad Pectus, perpendiculariter sitæ; ossiculis duodecim, quorum extrema admodum exigua, media reliquis longiora & in apice parum bifida. Membrana ossicula jungens tenuis & gracilis est, ut in Percis.

Pinnis Ventralibus carent.

12. *Pinna in dorso* unica largissima, non longe à capite incipiens, & ad caudam usque extensa, ubi minimo spatio à cauda terminatur; ossiculorum 53 ad 54, in apice indivisorum, admodum mollium, tamen Membrana tenui junctorum, cum notabili distantia inter unum quodque ossiculum.
13. *Pinna Ani* longa, ab ano ad caudam fere extensa; ossiculorum 27 ad 28, in apice indivisorum, sed mollium, in omnibus ita comparatorum ut ossicula in pinna dorfi.
14. *Cauda* non longa, in medio parum bifurca; ossiculorum longorum 15 circiter, præter aliquot extrema breviora; media ex longis in apice ramosa sunt.
15. *Anus* caudæ quam capiti multo propior.
16. *Dentes* nulli in maxillis observari possunt. Palatum quoque totum glabrum.
In faucibus vero superne duo ossicula oblonga denticulis minimis obsita adsunt.
17. *Lingua* oblonga, angusta infernè magnam partem soluta, glabra.
18. *Branchiæ* utrinque quatuor, quarum duæ superiores uno tantum ordine apophysium longarum in concava parte donantur, duæ Inferiores vero seu minores duplicem ordinem apophysium brevium obtinent.
19. *Cor* exiguum, triquetrum seu quatuor lateribus præditum.
20. *Hepar* oblongum, simplex, œsophago & Ventriculo adnatum.
21. *Ventriculus* oblongus, ab uno latere in appendicem seu processum magnum terminatus; ad finem hujus Appendicis lien oblongus & exiguus situs est.

Appen-

Appendix unica, sed majuscula, ad pylorum seu initium intestini.

Intestinum convolutum, gracile & longum.

22. *Vesicula seminalis* marium conica, sed quasi bifida, magna, longa & per totum abdomen extensa.
23. Viscus sanguinolentum, per totam dorfi spinam, pro *Renibus*.
24. *Peritonaeum* nigrescens seu punctis nigris, creberrimis irroratum.
25. *Vertebrae* in universum sexaginta tres. Costae *Vertebrae* affiguntur per levem inarticulationem, mediante cartilagine, sed leviter tantum. Officula exigua in carne à lateribus, in interstitiis musculorum sita, quae spinam dorfi, leviter tangunt.

PLEURONECTES, G. Pisc. 14.

I. *PLEURONECTES* utrinque glaber, *Tuberculis* sex à dextra capitis.

1. *Caput* & corpus cathetoplateum, & ad latera valde compressum. Dorsum à capite assurgens & acutum, ut & Venter.
2. *Os* parum oblique situm, respectu ad dorsum. *Rictus* angustus.
3. *Mandibula* inferior tantillum longior superiore apparet.
4. *Dentium* obtusorum 1°. Unicus ordo in utraque maxilla. 2°. ad Fauces superne duo officula, ejusmodi dentibus granulosis confita, & singula ex tribus partibus constantia, & totidem officula minora & oblonga etiam infernè. Palatum totum & Lingua glabra.
5. *Nares* utrinque duplici foramine praeditae, cum valvula exigua ad foramen anterius; mox ante oculos sitae.
6. *Oculi* à dextra capitis parte non magni, sibi admodum vicini, vix protuberantes.
7. *Tubercula* sex ossea, inter oculos & lineam lateralem dextri lateris, in linea recta fere disposita; quorum quintum ab oculis maximum est.
8. *Membrana branchioslega* officula sex teretia utrinque continet, & medio inter illa, subtus, duo ejusmodi officula in extremo concreta. Officulum utrinque supremum maximam partem à laminis capitis contegitur.
9. *Linea lateralis* recta fere, medium corpus dividens.
10. Totum corpus glabrum est. Squamae exiguae glabrae in lateribus & capite, tenacissime adhaerentes.

Artedi Descriptiones.

H

II. Co.

11. *Color* in dextro latere fuscescens, maculis rotundis pallide rubris seu miniatis varie aspersus, ut & Pinna dorsalis & Ani. Latus sinister totum albus est.
12. *Pinna* in dorso unica ab initio oculi ad caudam ferè extensa, ossiculorum 76 ad 77, in apice indivisum, non tamen simplicium.
13. *Pinnae Pectorales* in lateribus infra lineam lateralem, ossiculorum 12, quorum media longissima & in apice bifida, extrema minima & indivisa.
14. *Pinnae Ventrals* directè sub Lateralibus, vel paulo antè sitæ, Ossiculorum sex in apice indivisum; media longissima sunt.
15. *Spina* robusta, acuta, crassa & antrorsum inclinata ad initium Pinnæ Ani. Anus medio inter hanc spinam & Pinnam Ani.
16. *Pinna* Ani longissima, ad caudam ferè extensa, ossiculorum 55, in apice indivisum; media longissima sunt.
17. *Cauda* oblonga, in extremo non omnino æqualis, sed in medio productior, ossiculorum 20 ad 21, quorum 16 longa & horum media omnia præter duo extrema ad mediam ferè sui partem bifurca sunt.
18. Branchiæ utrinque quatuor, quarum 3 superiores simplici apophysium oblongarum ordine donatæ, infima vero seu minima duobus.
19. *Cor* oblongum, quadrilaterum cum Aorta alba & Auricula maxima.
20. *Hepar* oblongum, indivisum, à sinistro latere situm, Ventriculo incumbens. Vesica fellis magna, subtus in superiore parte.
21. *Ventriculus* non amplius, oblongus, Appendices curvæ & crassæ tres, 2 vel 4 ad Pylorum.
Intestinum in gyros convolutum, & Mesenterio connexum. Lien obscure ruber ad Ventriculum, angulato subrotundus, una parte planus.
22. *Ovaria* vel Vesiculæ dux seminales, oblongæ in maribus.
23. *Viscus* sanguinolentus magnus, spinæ dorsi adhærens, loco Renum est.
24. *Peritonæum* à latere dextro nigrum, à sinistro album.
25. Conchæ minutissimæ in extrema parte intestini sæpe inveniuntur.
26. *Vertebrae* in universum 43. Costæ utrinque 13.

II. *PLEURONECTES squamis asperis, Spina ad Anum.*
Limande Gallis.
A Dab. Anglis.

1. Caput, corpus, dorsum, Venter, Os, Mandibulæ, Dentes, Nares, situs oculorum, Membrana branchiostega, Spina ad initium pinnæ Ani, situs Pinnar, &c. ut in præcedente specie sese habent.

2. Ri-

2. *Rictus oris* paulo amplior. *Dentes* plures in maxilla superiore, in inferiore pauciores, & viginti circiter, quorum quidam mobiles. *Oculi* protuberantes. *Iris* aurea vel lutescens.
3. *Linea lateralis* ad *Pinnas Pectorales* in Arcum, dorsum versus inflexa; reliquum lineæ rectum est & latus æqualiter dividit.
4. *Squamæ* satis grandes, respectu ad congeneres, ad margines spinulis minimis asperæ, imprimis in latere dextro; alias nulli aculei in toto corpore. Ipsa ossicula pinnarum dorsalis & Ani squamulis utrinque vestita.
5. *Latus dextrum* cinereo-fuscum, maculis exiguis flavicantibus sed pallidis varium, sinistrum vero totum album.
6. *Pinna dorsi* ossiculorum 78 ad 79, in apice indivisum:
Pinna Pectorales vel *Laterales* ossiculorum 12: *Ventrales* oss. sex: *Pinna Ani* ossiculorum 60 ad 61, indivisum in apice; in reliquis hæc pinnae ut in præcedente specie comparatæ sunt.
7. *Cauda* oblonga, in extremo ferè æqualis, ossiculorum 18, quorum duo extrema exigua, cetera longa, media vero ad medietatem vel ultra bifurca sunt.
8. *Branchiæ*, & partes intestinæ, ut in præcedente, sese habent.
9. In intestinis cancellos inveni.
10. *Vertebræ* in universum triginta & novem.

IV. *PLEURONECTES linea laterali aspera, Spinulis ad radices pinnarum in latere oculato.*
Flesus & Fleteletus. à Flounder.

1. *Caput*, corpus, dorsum, Os, mandibulæ, *Dentes*, *Nares*, situs oculorum, *Membrana branchiostega*, spina acuta ad initium pinnae Ani, situs pinnarum &c. ut in præcedentibus.
2. *Rictus* satis angustus. *Mandibula inferior* tantillum longior. Dentium obtusorum unicus ordo utrinque.
Oculi protuberantes in *dextra Capitis parte*; unicum tamen hujus speciei vidi, qui oculos in *sinistra* parte habebat.
3. *Latus dextrum* coloris sordidi est vel obscurè olivacei, maculis & lituris nigris, magnis sæpe aspersum, vel marmorei coloris. *Sinistrum* latus album est, maculis pallide flavicantibus interdum varium.
4. *Linea lateralis* infernâ & maxima sui parte, recta est, supra pinnas Laterales vero parumper in Arcum, sursum inflexa.
5. *Squamæ* admodum exiguae, cuti glabræ & crassæ benè & profunde inhærentes, ita ut totum fere latus sinistrum, & maxima pars lateris dextri glabra sint.
Squamæ ad lineam lateralem dextri lateris proximæ, tuberculis in superficie exasperatæ, imprimis sub curvatura lineæ ad *Pinnas Pectorales*; ubi multæ ejusmodi squamæ tuberculosæ adsunt, ut & aliquos minores in *Laminis capitis dextræ partis*.

6. *Tubercula* ossea, parum plana, aculeis multis retrorsum spectantibus munita, ad radices Pinnarum dorfi & Ani, in dextra seu supina parte, in prona vero nulla tubercula adfunt. Inter singula duo Officula Pinnarum Unum Tuberculum Spinulis asperum reperitur.
7. *Pinna* dorfi officulorum 60, 61 ad 62. Ani offic. 42 ad 43. Pectorales 12. Ventrals sex: Cauda oblonga quadrata, in extremo æqualis, officulorum 18 ad 19: In omnibus officula ita sese habent, ut in præcedentibus. Signum lineæ lateralis in ipsa cauda conspicitur.
8. *Branchiæ* & partes Intestinæ ut in præcedentibus sese habent. Appendices duæ admodum breves ad Pylorum.
9. *Vertebrae* in universum triginta quinque, quæ præter apophyses dorsales & ventrales, ad latera etiam aculeatæ sunt. Costæ utrinque 11.

V. *PLEURONECTES oblongus, maxilla superiore longiori, squamis utrinque asperis. A.*
Buglossus & Solea Auctorum. Anglis *Sole & Soul.*
Tunga Suecis.

1. Os, Nares, Oculi & Membrana Branchiofega ut in reliquis Memb. Branchiofega 6 officula utrinque quidem continet, quæ tamen maximam partem ab Operculis conteguntur.
2. *Caput* obtusum. Corpus cathetoplateum, tenue, oblongum seu longitudine ad latitudinem plus tripla. Dorsum & Venter acuta.
3. *Maxilla* superior inferiore multo longior, imprimis clauso ore. Os satis profunde incisum, figuræ singularis. Rictus non magnus.
4. Oculi à dextra capitis parte, sibi invicem non adeo vicini ut in Congeneribus, non protuberantes.
5. *Denticulorum* gracilium, acutorum & flexilium plures ordines
 1º in parte Maxillarum ab oculis versa, tam superne quam infernè, nulli vero in eadem parte, qua oculi siti sunt.
 2º ad fauces ossa duo subrotunda & majora superne, & inferius duo minora, oblonga, denticulis confita.
6. Pili quasi albi, brevissimi, innumeri, tam supra quam infra Os, in latere albo tantum.
7. Unum latus album, alterum cano-nigrescens seu fuscescens.
8. *Linea lateralis* rectissima, dorso quam ventri paulo propior, in ipso capite vero supra branchias, ad perpendicularum fere sursum affurgit.
9. *Squammæ* parvæ, albæ, quadrato-oblongæ, spinulis minimis plurimis in apice exasperatæ, tam in dextro quam sinistro latere. Tubercula nulla ad radices pinnarum.
10. *Anus* sub Pinnis Ventralibus ad ipsa opercula Branchiarum collocatur.

11. *Pinnae laterales* admodum exiguae, una alba, altera ad dimidium nigra & saepe nigerrima, ossiculorum 8 ad 9. *Ventrals* antè sitæ, exilissimæ, ossiculorum 5 tantum.
12. *Pinna dorsalis* ab ipso rostro ad caudam usque extensa, ossiculis 91, caudam versùs inclinatis, in apice indivisis. Maculae saepe exiguae in membrana harum pinnarum.
13. *Pinna Ani* longissima ab Ano ad ipsam caudam extensa, ossiculorum 74, in apice non divisorum. Squamæ quoque ipsas pinnas dorsi & ani ad partem utrinque vestiunt, omnia ad caudam inclinatae.
14. *Cauda* parum oblonga, in extremo subrotunda, ossiculorum 14 longiorum præter extrema media in apice bifurca.
15. *Abdomen* infra Anum 3 vel 4 uncias extenditur, & duplex est, seu ductu suo utrinque à lateribus ossiculorum, ad basin pinnae Ani sitorum, procedit.
16. Longit. 8. 9. 10. uncias; latit. 3 & ultra uncias.
17. Cor, Hepar, Lien, Renes, Ventriculus &c. ut in congenere-
ribus.
Intestinum duplex longius quam piscis, ter reflexum. Appen-
dix nulla ad Pylorum.
Ovarium vel Vesica feminalis longa & teres instar lumbrici, una
utrinque, à lateribus ossiculorum, basin pinnae ani sustentantium.
18. *Spina* exigua ad initium pinnae Ani, quæ tamen externe vix
videtur, nec acuta est. Vertebrae quadraginta octo.

VI. *PLEURONECTES asper canescens, Pinnis Lateralibus vix conspicuis.*

1. Caput, corpus, dorsum, Venter, Anus, Os, Nares, situs
oculorum in dextro latere, Membrana Branchiostega, Aper-
turae branchiarum, squamæ exiguae utrinque asperæ, Linea la-
teralis recta &c. ut in quinto.
2. *Maxilla* superior, clauso ore, inferiore paulo longior est.
Dentes ob exilitatem non conspici possunt.
3. *Oculi* sibi satis vicini, & asperitates quædam mediz inter illos.
4. Pilos nullos ad os, in latere albo, observare potui.
5. *Color* in latere oculato obscure canus vel fuscus, maculis obscu-
rioribus quasi varius, in altero latere cano-albescens.
6. *Pinna dorsi* à vertice ad caudam usque extensa, ossiculorum
quinquaginta trium circiter, quorum media longissima & in
apice parum bifida.
7. *Pinnae laterales* adeo exiles, ut minus accuratè insipientibus ob-
servari possint, ex quatuor tantum ossiculis piliformibus, &
supra omnem modum exilibus in latere oculato constant, in
altero vero latere non nisi unicum ossiculum piliforme, exi-
lissimum & vix conspicuum observavi, ita ut pro pinna vix
haberi possit.

8. *Pinnae Ventrals* off. 5, ad inferiorem partem cum pinna Ani concretæ.
9. *Pinna Ani* ad caudam extensa, officul. 43, quorum media longissima.
10. *Cauda* in extremo acuto-rotunda, offic. 16, quorum media longissima & in apice ramosa, extrema brevia.
11. Longitudo tota in descripto 2 unc. 5 ad 6 lineas continet; latitudo maxima 1 unc.
12. *Locus*: Amboina ad Ind. Orientalem.

G A D U S, G. Pisc. 16.

1. *GADUS* dorso tripterygio, ore imberbi, corpore albo, maxilla superiore longiore.
Hwitling Succis.
1. *Caput & corpus* cathetoplateum; antica vero capitis pars clauso ore, magis plagioplatea est.
2. *Dorsum* convexum. *Anus* Capiti admodum vicinus seu longissime à cauda distans.
3. *Color* totius pisces argenteo-albus, dorsum vero obscurius seu canescens. Squamæ exiguæ, subrotundæ, albæ.
4. *Mandibula superior* ultra Inferiorem prominens, ita ut dentes *Superiores*, clauso ore, ultra Inferiorem cadant.
5. *Nares* duplici apertura utrinque conspicuæ, oculis quam extremo rostro paulo propiores.
6. *Oculi* magni à lateribus capitis, laxa & pellucida membrana tecti. Iris argentei coloris.
Pupilla magna cœrulescens.
7. *Membrana branchiostega* officula septem utrinque continet.
8. *Dentium* imo in Maxilla Superiore plures ordines, quorum extremus maximus est; sed dentes 1. ordinis etiam magnitudine inæquales. In maxilla Inferiore unus imprimis ordo, sed dentes inæquales magnitudine.
2do. In antica parte Palati officulum Denticulis asperum, duo latera trianguli constituens.
3tio. In Faucibus duo officula superne, rotundiora, & duo oblongiora, inferne denticulis obfita. Lingua & totum palatum medium glabra sunt.
9. *Puncta* 9 vel plura utrinque in mandibula Inferiore.
10. *Cirrus* nullus.
11. *Linea lateralis* nigrescens vel obscura, curvâ, dorso quam ventri multo propior.
12. *Macula* nigrescens utrinque ad exortum Pinnarum Pectoralium.

13. *Pinnae Pectorales* canescentes, officulorum 21, quorum media longissima & in apice bifurca; duo prima & ultima in apice indivisa sunt.
14. *Pinnae Ventrals* situ anteriore quam Pectorales, coloris albi, officulorum sex, quorum 2dus longissimus, medii bifurcati.
15. *Pinnae in dorso* tres, quarum prima triangularis, officulorum 21, quorum prima longissima, media in apice parum bifurca.
16. *Pinna Ani* duæ, albescentes. Prima longa, officulorum triginta trium, quorum media in apice bifurca, extrema utrinque exigua. Secunda minor, officulorum 23; quorum media in apice bifurca.
17. *Cauda* in extremo æqualis & nigrescens, officulorum 31 circiter longorum, præter extrema media bifurca.
18. *Hepar* albescent in duos lobos majores divisum, quorum dexter exiguus brevis, sinister longissimus per totum abdomen extensus.
Lien triangularis sub Ventriculo.
19. *Ovaria* duo longa in fœminis, ovis luteis plena.
20. *Vesica atria* longa glutinosa, simplex, spinæ dorsi adnata. Canalis pneumaticus in suprema parte originem suam sumit, & Oesophago inseritur.
21. *Cor* quadrilaterum, angulis admodum obtusis, Auricula magna & Aorta magna donatum.
22. *Ventriculus* oblongus, satis crassus, in infimo reflexus. Appendices perplurimæ in Pyloro, coronæ instar.
Intestinum 1mo ad diaphragma reflexum, 2do ad Anum extensum, 3tio ab Ano ad oesophagum & demum 4to ad Anum recta descendens. Infima pars intestini admodum ampla. Cum Ventriculo extensum intestinum pisce ipso paulo longius est.
23. *Vesica felle* uno ductu hepatis, altero, & quidem majori, intestino ad appendices adhæret.
24. *Renes* sanguinolenti, longi, secundum spinam dorsi extensi. Vesicæ urinariz duæ, oblongæ ad Anum, aqua clara plenæ.
25. *Vertebrae* in universum quinquaginta & quatuor.

IV. *GADUS dorso tripterygio, ore cirrato, colore vario, maxilla superiore longiore, cauda æquali.*
Afellus striatus. Schoneveldii.
Små Torsk Suecia.

1. Caput, Corpus, Dorsum, Nares, Oculi, Membrana Branchiostega, Situs Dentium &c. ut in prima specie sese habent.

Venter parum prominens.

2. *Mandibula* Superior inferiore longior.
3. *Cirrus semiuncialis* in apice inferioris maxillæ.

4. *Dent.*

4. *Dentium* imo. Plures ordines in Maxilla Superiore, ejusdem fere magnitudinis, vel exteriores paulo longiores.
2do. In inferiore unicus imprimis ordo, vel duo in antica parte.
3tio. In antica parte palati Officulum lunatum, denticulis oblitum.
4to. In faucibus duo officula rotundiora superne, & duo oblongiora inferius denticulis obsita, fere ut in prima specie.
5. Canalis seu sulcus inter caput & primam dorsi pinnam, in majoribus præsertim bene conspicuus.
6. *Linea lateralis* lata, albida, dorso multo propior quam Venti, non tamen recta.
7. *Squamæ* exiguæ, subrotundæ, vel ovales, albæ, Maculæ exiguæ, plurimæ, nigre vel nigro-fuscæ vel lutescentes, in capite, dorso, lateribus &c.

Venter albidus cum punctulis interdum nigris.

8. *Pinna in dorso* tres, nigrescentes: Ima officulorum 14. 15. secunda 18. 19. & 20. Tertia 17 & 18. Horum ultima semper minima sunt. Officula vero media omnium pinnarum in apice bifida sunt.
9. *Pinna Ani* duæ; *Prima* officulorum 18. 19 & 20. Secunda off. 16 & 17, vel 18. quorum Media in apice bifurca. Ultima minima.
10. *Pinnae Pectorales* officulorum 20. Ventræ offic. sex, in omnibus ita comparatæ ut in prima specie.
11. *Cauda* non magna, in extremo æqualis.
12. *Branchiæ* utrinque quatuor. Duplex ordo Tuberculorum in concava parte Branchiarum: Tubercula exteriora, in brachiis maxima, longa sunt, cetera vero exigua.
13. Partes intestinae ut in Prima specie sese habent.
14. *Vertebra* 53, & *Costæ* 18 circ. in *Coddo* seu *Cod. fish* Anglorum, qui idem omnino piscis est cum *Torsk* Suecorum.

V. *GADUS cirratus albicans, maxilla Superiore longiore, cauda parum bifurca.*

Anglis *Hadock*. Eglefinus Auctorum.
Kollin Suecis.

1. Caput, Corpus, Nares, Oculi, Dentes, Membrana branchiostega, Branchiæ &c. ut in præcedentibus speciebus sese habent.
2. Mandibula superior ultra inferiorem prominens.
3. *Cirrus* admodum brevis in apice inferioris maxillæ.
4. Spatium inter caput & Pinnam dorsi primam in Aoumen contrahitur.

Venter

Venter convexus.

5. *Linea lateralis nigra*, dorso propinqua, fere recta.
6. Totum corpus ex argenteo-albicans, dorsum vero canescens & unicolor.
7. *Pinnae* in dorso tres: ima triangularis.

VI. *GADUS* dorso tripterygio, ore cirrato, longitudine ad latitudinem tripla, *Pinna Ani prima* Officulorum triginta. *Afellus mollis*, latus. Listeri in Appendice ad Ichthyol. Will. p. 22. Raji p. 55.

Afellus barbatus Charletoni p. 121.

Anglis à *Pouting*, Pont & *Whiting* Pont.

1. Caput, Corpus, Nares, Oculi, Dentes, Branchiae &c. ut in specie quarta vel in prima. Membrana Branchioftega item similis, quæ tamen sæpe Officula utrinque octo continet.
2. *Mandibula* Superior inferiore paulo longior.
3. *Cirrus* unicus 6 vel 7 lineas longus in apice Maxillæ inferioris.
4. Dorsum convexus. Corpus reliquis Gadis simile quidem, sed secundum proportionem omnium reliquorum corporum latius, longitudo enim ad latitudinem tripla tantum est.
5. *Macula* nigro-cærulescens utrinque ad radices Pinnarum Pectoralium.
6. *Cauda* & sæpe Pinnæ dorsi in extremo nigricant. *Pinna Ani* prima sæpe cærulescit. Color corporis albescens sed nigredine quadam obfuscatus, & nunquam adeo albus ut in *Hwittingo*, dorsum pallide fuscescit.
7. *Linea lateralis* fusca vel nigrescens, admodum curva, dorso tamen quam Ventri propior. *Squamae* satis magnæ, albæ, angulares seu oblongo-rotundæ.
8. Rictus oris, respectu congenerum, paulo angustior.
9. *Pinnae Pectorales* ex pallido rufescentes, officulorum 19. *Ventrals* albæ officulorum 6, quorum 2dum cum primo longissima indivisa.
Pinna in dorso tres. Ima reliquis altior, triangularis fere officulorum 13. secunda reliquis longior, officulorum 24. Tertia offic. 20 ad 21. *Pinna Ani duæ*: prima longa, officulorum triginta unius. Secunda priori admodum continua & pinnæ dorsali tertiz exacte è regione, officulis 21. ita comparatis ut in congeneribus.
10. *Cauda* in extremo æqualis seu officulorum ejusdem longitudinis.
11. *Anus* capiti admodum propinquus, sc. 3 unciis à rostro, in medio Ventre. Longitudo vero piscis est 9 unciarum, Latitudo 3 unciarum, sunt etiam quidam majores. Hujus officula

Arredi Descriptiones.

I

cula

cula media longissima sunt hinc diducta, pinna semicirculum fere describit.

12. Puncta 9 vel plura utrinque in maxilla inferiore.

MURÆNA, G. Pifc. 18.

1. *MURÆNA unicolor*, maxilla inferiore longiore.

Al Suecis. *Aal* Germanis.

Eel Anglis. *Ael* Belgis.

1. *Capitis* anterior pars plagioplatea est, posterior ad branchias ambitu fere subrotunda, vel magis cathetoplatea. Respectu corporis parvum & anterius acutum est caput.
2. *Figura Corporis* longa, parum cathetoplatea, imprimis ab Ano ad caudam. *Corpus* lubricum seu muco obductum & quasi alepidotum; squamæ enim non nisi in cute arida conspici possunt.
3. *Mandibula* inferior ante superiorem prominens.
4. *Tubuli* duo in apice Rostri, unus utrinque, foramine pervius, qui tamen nihil aliud est, quam *Foramen Narium* anterius, figura tubulosum. *Posteriora* duo longe à rostro remota, mox ante oculos, unum sc. utrinque foramen, foraminibus tubulosis seu anterioribus majoribus. (Hoc Auctoris inventum est.)
5. *Oculi* à lateribus capitis, rotundi, exigui, cuticula satis crassa & parum pellucida tecti. Iris rubescens sed obscure. *Pupilla* nigrescens, exigua, rotunda.
6. *Ductus* seu foramina exigua in ambabus maxillis, in inferiore sedecim circiter, in superiore vero multo plures, satis exigui.
7. *Membrana Branchioflegma* 10 ossicula gracilia & curvata utrinque continet, quæ tamen ob crassitiem cutis non conspici possunt.
8. *Denticulorum* 1°. Plures ordines in mandibula inferiore, ut & Superiore.
 2°. Ossiculum in antica parte palati longitudinaliter situm & denticulis mandibulæ contiguum, denticulis oblitum. Palatum ceterum glabrum est.
 3°. Duo Ossicula oblonga, denticulis oblitata, superne ad fauces, & totidem inferne ad Branchias, magis oblonga & minus aspera.
Lingua glabra, infernè parum soluta, sed immobilis sc. per medium osse duro sustentata.
9. *Opercula Branchiarum* neque superne, neque inferne aperta, sed tantum ad Pinna Pectorales ab anteriore sc. latere, unico exiguo

exiguo foramine 3 vel 4 lineas unius uncie longo & perpendiculariter sito, prædita.

10. *Linea lateralis* recta, in parte anteriore, dorso paulo propior, ab Ano ad caudam corpus medium dividit. Unicus præcipue ordo foraminum seu punctorum ad lineam lateralem inferiorem partem imprimis.
11. *Color* in dorso, lateribus & pinnis nigrescens vel cano-nigrescens, in quibusdam vero viridescens, in pinguioribus imprimis. *Venter* ex luteo albescens.
12. *Anus* capiti quam caudæ propior.
13. *Pinnæ* tres in toto pisce; sc. *Pinnæ Pectorales* duæ ad foramen Branchiarum, una utrinque, exigua & nigrescentes, ossiculorum 18 ad 19, quorum extrema exigua, media longiora, in apice ramosa.
14. *Pinna dorsi* unica, satis longe à capite incipiens & totum fere corpus ambiens, à cauda ad Anum usque extensa, 3. 4 vel 5 lineas unius uncie in descripto subjecto alta, ossiculis plurimis in apice bifurcis prædita, quæ tamen ob crassitiem membranæ & multitudinem suam vix numerari possunt, nec forte necessarium est.
15. *Cauda* seu extremitas *Pinnæ dorsalis*, nec rotunda, nec quadrata in apice, sed potius subacuta.
16. *Branchiæ* utrinque quatuor, parte convexa vasis sanguiformibus præditæ, parte concava autem nulla Tubercula seu Apophyses continent.
17. *Cor* quadrangulare & parum conicum cum Aorta magna alba.
18. *Hepar* pallide rubescens, in duos lobos divisum, quorum sinister major. *Vesica Fellea* magna, distantia quadam ab Hepate separata.
19. *Gula* longa. *Ventriculus* infra Hepar non longus, ad superiora reflexus, sed inferiore parte; processu longo & crasso ad Anum usque reflexus. *Intestinum* ab Hepate ad Anum usque recta descendens. Appendix nulla ad Pylorum.
20. *Lien* oblongus & triangularis sub Ventriculo.
21. *Vesica aërea* oblonga, simplex, spinæ dorsi adnexa, Ductu magno pneumatico ad superiorem partem instructa; quem aliqui pro secunda parte Vesicæ natatoris habuerunt.
22. *Renes* magni, secundum spinam dorsi extensi, ad Anum crassiores, ut & infra Anum in pelvi quasi.
23. *Vertebra* in universum centum & sedecim, à lateribus compressæ, infirmæ, ad caudam satis exiguæ. *Costæ* admodum breves apophysibus Vertebrae lateralibus leviter adhaerentes.
24. Ossicula exilia in carne.

Longitudo tota.
ad medium Oculi.

unc. 20. lin. 1.

6.

I 2

ad Pinnas

ad Pinnae Pectorales.	3.	7.
ad initium Pinnae dorsalis.	6.	8.
ad Anum.	9.	fere.
Pinnam Ani.	9.	1.
ad finem corporis seu initium caudæ.	19.	8.
Latitudo ad Oculum.		6.
ad Pinnae Pectorales.	1.	2. f.
Initium Pinnae dorsalis, eadem Latitudo vel ad lineam semis differens.		
ad Pinnam Ani.	1	1.

O R D O II.

A·CANTHOPTERYGII.

S C O M B E R, G. Pisc. 25.

- I. *SCOMBER* pinnulis quinque in extremo dorso polypterygia, aculeo brevi ad Anum.
Scomber Ovidii, Plinii, Bellonii, Rondeletii, Willughbesii & omnium fere Auctorum.
A Mackrell or *Macarell* Anglis.
Makrill. Suecis, Germanis, Danis.
1. Caput & Corpus cathetoplatea. Corpus à lateribus non multum compressum est, sed latera satis carnosæ & convexa. Dorsum totum convexum. Venter nec planus nec acutus, sed convexus, minus tamen quam dorsum.
Corpus à Pinnis Ventralibus, ad caudam usque, sensim gracilescit & angustius evadit; Ambitus corporis proxime supra caudam rotundus est.
2. Os magnum, medioeriter incisum, seu Riçtus satis amplius.
3. Maxillæ ejusdem exacte longitudinis sunt ore clauso, sed ore aperto inferior longior apparet.
Rostrum seu Antica capitis pars subacuta est, parum cathetoplatea. Caput superne planum, rectum, glabrum, nigrescens.
4. Nares duobus foraminibus utrinque præditæ, oculis quam rostro propiores; foramen anterius rotundum, apertum & bene conspicuum est, medio fere inter oculos & apicem rostri situm: Posterius vero foramen longa satis distantia ab anteriore sed

sed transversim scissum seu oblongum, rimæ instar, & plerumque clausum; unde à nullo Ichthyologo hucusque observatum fuit. Magna cavitate subtus in capite hæc nares præditæ sunt.

5. *Oculi* mediocres ad latera capitis siti, subrotundi, rostro quam fini Operculorum Branchiarum propiores; Pupilla rotunda; Iris ex colore argenteo nigrescente & viridescente inmixta. Oculi in medio nudi sunt, sed ad anteriorem & posteriorem partem, cute communi seu velo ad partem teguntur.

6. *Opercula Branchiarum* longa, magna, coloris argentei, postice non in rotundam nec acutam, sed figuram rectam vel æqualem desinentia.

Aperturæ Branchiarum amplissimæ:

Membrana Branchiostega septem utrinque officula gracilia continet, quorum supremum seu maximum sub ipsis Operculis maximam partem tegitur.

7. *Denticulorum* rectorum fere imo unicus ordo in limbo utriusque maxillæ. 2do. Lineæ duæ longitudinales, una sc. utrinque ad latera palati, duobus ordinibus ejusmodi denticulorum constantes, & præterea in antica parte palati duæ lineæ exiguæ, denticulis aliquot consti. 3tio ad Fauces superne quatuor officula oblonga, denticulis confertissimis oblongis prædita, quorum duo posteriora multo majora; inferne vero duo officula oblonga denticulis plurimis, longis, sed molliusculis prædita. Palatum medium & tota ejus postica pars glabra sunt. Lingua glabra, antè subacuta, inferne parum soluta, albescens.
8. *Linea lateralis* dorso quam Ventri propior, non tamen recta, sed hinc inde varie flexa seu curvata, longe supra lineam musculorum sita.

9. *Squamæ* satis exiguæ, imbricatim fere sitæ, albescentes, à cute externa vix separabiles.

10. *Color* in Ventre & imis lateribus infra lineam interstitialem pulchre argenteus est, supra hanc lineam maculæ seu lituræ nigro-cæruleæ curvæ & varie flexuosæ adsunt, magis transversim quam longitudinaliter sitæ; spatia inter has maculas ex argenteo & cæruleo-viridescente mixta sunt.

Cutis exterior cuticulæ quadrupedum respondens, in hoc pisce ut & aliis multis, crassior est cuticula interiore. *Color* autem nec à squamis, nec à cute exteriori, sed ab interiore admodum tenui & à musculis vix separabili provenit.

11. *Pinne Pectorales* nigrescentes, a lateribus sitæ, dorso quam Pectori propinquiores, officulorum viginti, quorum duo prima in apice indivisa, reliqua parum ramosa: 3m, 4m & 5m longissima, ultima minima.

12. *Pinne Ventræles* albæ, sibi admodum vicinæ, paulo longius à rostro sitæ quam Pectorales, officulorum sex quorum primum simplex, sed ob gracilitatem non aculeatum, reliqua

admodum ramosa; 2m & 3m longissima, membrana tenuissima conjuncta.

13. *Pinnæ dorsii* duæ majores: *Anterior* non longe à capite sita, officulorum 11 vel 12, interdum versò 10, omnino simplicium & parum aculeatorum; 2dum longissimum; ultima admodum brevia. Nota: Ad radicem hujus pinnæ *Sulcus* quidam dorso insculptus est (aliis non observatus). Hæc officula sive aculei radice lata prædita sunt cum foramine in media radice.

Pinna dorsii posterior in extremo dorso sita, officulorum 11 vel 12, quorum prima duo indivisa, reliqua parum bifida in apice; Membrana crassa & squamis oblongis, exiguis ac altis tecta; hæc officula conjungit.

Pinnule quinque admodum exigue inter pinnam dorsii 2dam & initium Caudæ, paribus intervallis inter se sitæ, quarum quatuor anteriores unico tantum officulo ramosissimo constant, ultima vero duobus itidem ramosis; à postica tamen sui parte, membranâ tenuissima & subtilissima ad partem inter se conjunguntur, ita ut potius pro una pinna cum *Pinna dorsii* secunda communi haberi debeant: nam ad ultimum officulum *Pinnæ dorsii* 2dæ membrana quoque exilis, ubi planum inclinatum ad partem *Pinnulæ* primæ extenditur.

14. *Pinna Ani* albefcens, officulorum 13, quorum 1m breve, robustum & aculeatum, reliqua mollia: duo aut tria prima indivisa, reliqua in Apice parum bifida, membranaque crassiori conjuncta sunt. *Pinnulæ* quinque exiles inter *Pinnam Ani* & caudam, in omnibus ita comparatæ, ut superiores illæ ad *Pinnam dorsii* 2m (13) & potius pro continuatione *Pinnæ Ani* habendæ. *Annus* caudæ quam capiti multo priorior.

15. *Cauda* Lunæ crescentis instar bifurca, officulorum septemdecim longiorum, præter externa breviora, utrinque extremum in apice indivisum est, reliqua ramosa.

Eminentie duæ, longitudinales, sed breves utrinque in lateribus ad initium caudæ pinnatæ.

16. *Branchiæ* utrinque quatuor, omnes duplici Tuberculorum ordine præditæ in concava parte, quæ tubercula in Branchiis tribus inferioribus æqualia, brevissima & piliformia sunt. In suprema seu maxima Branchia Tubercula inæqualia sunt: interiora enim brevissima ut in prioribus, exteriora vero longissima, dura & omnino pectiniformia.

17. Longitudo piscis pedali major, interdum bipedalis.

18. Hepar indivisum, à sinistro latere magis situm.

19. *Ovaria* duo in fœminis, & totidem Vesiculæ seminales in Mâribus ad inferiorem partem concretæ. Coit mense Junio ad Angliam.

20. *Vertebra* magnæ, oblongæ, ambitu fere rotundo, numero triginta & una tantum.

Cofia

Costæ longæ, *Vertebriis* per cartilagineas leviter affixæ, numero 11 ad 12. *Apophyses Vertebrearum dorsales* è media fere *Vertebrearum* parte oriuntur.

Nota: *Vertebra ultima seu caudæ proxima*, à lateribus utrinque *apophysin acutam*, exiguam obtinet, pari modo ac in *Cyprinis*.

MUGIL, G. Pifc. 26.

Mugil.

Cephalo Romanorum.

Cubor Gallis sec. Rondel.

A Mullet. Anglis.

	unc.	lin.	1. ad 2.
ongitudo tota.			6.
ad medium oculi.			6.
finem Operculorum branchiarum.	2.		
initium Pinnarum Pectoralium.	2.	3.	
Pinnas Ventrals.	3.	6.	
Pinnam dorfi primam.	4.	4.	
Ejusdem finem.	5.		
Pinnam dorfi secundam.	6.	5.	
Ejusdem finem.	7.	4.	
initium Pinnæ Ani.	6.	3. à 4.	
Ejusdem finem.	7.	3.	
initium caudæ pinnatæ.	9.	3. à 4.	
titudo capitis ad medium Oculi.		9.	
initium Pin. Pectoralium.	2.	7. à 8.	
Pinnas Ventrals.	2.	1.	
Pinnam dorfi primam.	2.	2. f.	
ad Anum.	2.		
in extremo corporis ad initium			
Caudæ pinnatæ.	1.		

Corpus oblongum; cathetoplateum imprimis caudam versus.

Caput ambitu fere angulato rotundo, sc. in postica parte, pone oculos magis cathetoplateum, antica vero Capitis pars *plagioplutea* est.

Caput supernè latum & satis planum, à rostro ad dorsum non assurgens.

Dorsum inter pinnas & caudam versus, convexum; inter caput vero & 1m dorfi pinnam non omnino convexum, sed parum angulatum est, imprimis versus caput.

Venter à branchiis ad Pin, Ventrals planus, à Ventralibus ad Anum convexus.

2. *Os* exiguum seu *Rictus* admodum angustus & nihil fere à lateribus incisus.
3. *Mandibula* superior clauso ore, tantillum longior est Inferior. Superior per pressionem deorsum nutat. Inferior in apice à modum tenuis est & rubescens. In apice maxillæ inferiori prominentia ossea sursum prominet, & in maxilla superiori recipitur, quæ ex concursu ossium maxillarum oritur.
4. *Narium* foramina utrinque à lateribus duo, medio inter oculos & rostrum, vel oculis paulo propiores. Foramen anterior minus est & rotundum; posterius vero majus & oblongo-rotundum, idque transversum.
5. *Oculi* subrotundi à lateribus capitis, rostro satis vicini, nulli cute communi tecti. Iris argentea. Pupilla nigra, ovata.
6. *Opercula Branchiarum* ossea & robusta sunt. Apertura branchiarum utrinque satis ampla: spinæ Tru Asperitates nullæ in exitu Officulorum.
Membrana Branchioslega officula curva, & parum plana, nullo modo sex utrinque continet, quorum supremum latum est, & ab Operculis Branchiarum contegitur, ita ut vix quinque conspici possint.
7. *Officulum* utrinque in maxilla superiore directe sub Naribus, quod infernâ sui parte denticulis quasi serratum est.
8. *Squamæ* admodum amplæ, non tantum Corpori, sed Operculis Branchiarum & toto capiti ad rostrum usque innascuntur, Pinnis Pectoralibus, Ventralibus, Ani, dorsali & caudæ ad partem quoque innatæ, imbricatæ & distinctæ siccæ, glabræ & subduræ, sed minime asperæ; coloris in Ventræ & lateribus argenteo-albi, in dorso obscurioris vel cani Basi & latera illarum plerumque rectilinea sunt, apex vero subrotundus; ad basin longitudinaliter striatæ sunt.
9. *Linea lateralis*, proprie sic dicta, nulla, sed lineæ utrinque 10 vel 11 longitudinales, parallelæ & nigrescentes per medium squamarum à capite ad caudam ductæ.
10. *Pinnæ* in dorso duæ: Prior in medio fere dorso exigua, aculeorum 5, interdum 4, quorum duo primi maximi sunt & robusti, ultimus fere flexilis.
Posterior longe à priori remota, & medio inter illam & initium caudæ pinnatæ, pariter exigua, officulorum 10, interdum 11, quorum primum & 2dum indivisa sunt, reliquæ in apice ramosæ: Primum brevissimum & aculeatum, 3tium & 4tum longissima. Omnia ossa hujus pinnæ caudam versus spectant & perpendiculariter erigi non possunt.
11. *Pinnæ Pectorales* transversim fere infra Opercula in mediis lateribus sitæ, officulorum 18, quorum 1m indivisum, reliquæ in apice parum divisa; 1m, 2m, 3m & 4m maxima sunt, ultimum admodum exigua.

- Ventrales* albæ *Pectoralibus* quam *Ano* propiores, ad basin membrana alba firmiter conjunctæ sunt, & ad perpendicularum erigi non possunt, ossiculorum sex, quorum 1^{mo} reliquis brevius & aculeatum, reliqua longiora & in apice multum ramosa. Nota: *Appendix* squamosa utrinque ad has pinnas adest.
12. *Pinna Ani* alba, ossiculorum 12 vel interd. 13, quorum duo vel Tria prima simplicia & tantillum aculeata sunt, reliqua in apice parum ramosa. Ad perpendicularum erigi non possunt. Anus caudæ quam capiti multo propior.
 13. *Cauda* bifurca semicirculi instar, ossiculorum 14 longorum, præter extrema breviora; ex longis extremum utrinque indivisum est, reliqua admodum ramosa.
 14. *Denticuli* exiles: 1^{mo} utrinque in *Lingua*, quæ cartilaginea est. 2^{do}. Ossiculum subrotundum denticulis asperum utrinque a lateribus medii palati. 3^{tio}. Intus in Apice *Maxillæ* superioris, postquam sinuata est, apparent quasi villi brevissimi; *Palatum* medium, fauces & *maxilla* inferior omnino glabra sunt.
 15. *Branchiæ* utrinque quatuor, omnes duplici apophysium pectiniformium, sed brevium ordine donatæ in concava parte Apophyses exteriores in suprema interioribus longiores sunt.
 16. *Cor* satis magnum, triquetrum vel 4 lateribus præditum cum *Auricula* & *Aorta* magna.
Hepar à latere sinistro magis situm, non magnum, vix divisum, cum *Vesica* fellis magna.
 17. *Gula* à *Ventriculo* optime distincta. *Ventriculus* singularis figuræ, non magnus, durus, musculosus & subrotundus, omnino ut in *Avibus* granivoris; cum Processu tamen ad latus sinistrum.
Appendices Pylori 6 ad 7, breves & admodum crassæ.
Intestinum ipso pisce ter longius, in spiras quasi convolutum, & ultra decies flexum.
Lien oblongus, angulatus, niger ad *Intestinum*.
 18. *Peritonæum* totum nigrum est.
 19. *Vesica aërea* magna, simplex, per totum abdomen extensa, & spinæ dorsi adhærens, sed quæ inde continua non separari potest, itidem nigra.
 20. *Renes* oblongi spinæ dorsi adhærent.
 21. In fine Aprilis nec ova nec semen habebat.
 22. In *Ventriculo* dissecto nihil inveni. Membrana intus rugosa & facile separabili vestitur, omnino ut in *Avibus* granivoris.
 23. *Caro* alba, dulcis, crassis musculis constans, nullis omnino spinis referta.
 24. *Vertebræ* magnæ & oblongæ, numero viginti quatuor tantum; omnium ultima apophysin acutam utrinque continet. ut in *Cyprinis*. Costæ magnæ, longæ, à lateribus parum compressæ, numero 9 circiter utrinque. Apophyses dorsales anteriores *Vertebrarum*

brarum admodum latæ sunt. Apophyses Vertebrarum laterales ad abdomen, latæ & magnæ sunt, superne excavatæ & in apice illarum superius Costæ per cartilaginem affiguntur ut in Gadis.

Vertebræ dorsales posteriores duas apophyses obtinent, quarum una antrorsum admodum brevis, altera vero retrorsum spectans multo longior est, & in medio Vertebrarum oritur.

25. Figura seu facie externa Thymallo satis similis est.

P E R C A, G. Pisc. 30.

I. *PERCA lineis utrinque sex transversis nigris, pinnis ventralibus rubris.*
Abbor Suecorum.

Longitudo tota.	unc. 7.	lin. 5.
ad medium Oculi.		7.
Pinnas Pectorales.	1.	9.
Ventrales.	2.	2.
Earundem finem	2.	5.
Pinnarum dorfi primam.	1.	9.
Ejusdem finem.	3.	9.
Pinnam dorfi secundam;	4.	1.
Pinnam Ani.	4.	4.
Ejusdem finem.	5.	
finem Pinnæ dorfi secundæ;	5.	2.
initium Caudæ.	6.	2.
Latitudo juxta medium oculi.		9½.
Pinnam dorfi primam & Pectorales.	1.	8.
Pinnas Ventrales.	1.	9.
Pinnam dorfi 2dam & Anum.	1.	4½.
Pinnam Ani.	1.	9½.
finem pinnæ dorfi secundæ.		7.
initium Caudæ.		6.
minima ante caudam.		5.

1. *Dorsum* à capite assurgens & parum acutum; *Venter* totus à capite ad anum latus & planus est.
2. *Caput* cathetoplateum. *Mandibulæ* ejusdem ferè longitudinis, nisi quod superior ore clauso tantillum productior videtur, sed nullius momenti est.
3. *Rictus* amplius admodum.

4. Den-

4. Denticuli plurimi ossibus maxillaribus utriusque mandibulæ innati;
5. In Palato tres areolæ dentium asperæ & exiguæ, quarum media minor & triangularis, laterales vero oblongæ sunt.
6. Officula quatuor denticellis aspera in faucibus, quorum duo supernè majora, totidemque infernè minora & quasi in unum equalita,
7. *Lingua* glabra & infernè parum soluta.
8. *Nares* magnæ, patulæ, oculis quam rostro propiores, duplicem aperturam cum distantia magna inter se invicem utrinque habentes. Foramen antè valvulâ exigua tegitur.
9. *Ductus* quatuor exigui utrinque in capite inter oculos & rostrum, mucum forte fecernentes.
10. *Iris* saturatè lutea, vel ex luteo, obscuro & nigrescente mixta. Pupilla ovalis & viridescens.
11. *Opercula branchiarum* ex duabus vel 4 laminis ossis & septem spinis latiusculis & curvatis, (quarum suprema maxima) membrana conjunctis utrinque componuntur; quorum lamina superior tota in ambitu serrata est, inferior vero in apophysis aculeatam definit.
Nota: His Laminis (11) Squamæ exiguæ innascuntur.
12. *Clavicule* utrinque ex quatuor ossibus constant, supra Pinnae Pectorales corpori adnatæ, quorum primum & tertium in ambitu parum serrata sunt.
13. *Branchiæ* utrinque quatuor, hæc omnes duplici Tuberculorum ordine donantur, quæ in branchiis tribus inferioribus, utrinque ferè æqualia sunt, vel exteriora paulo majora; in suprema vero seu maxima branchia nodi exteriores interioribus triplo vel quadruplo longiores sunt, acuti & ossi, sursum porrecti. Interiores in branchia minima vix videntur.
14. *Pectus* squamis exiguis tectum, non vero nudum, uti plerique Ichthyologi habent.
15. *Linea lateralis* curvata, dorso propinqua & ad illud flexa, longè supra interstitia musculorum sita.
16. *Linea interstitialis* musculorum recta est, medio inter dorsum & ventrem.
17. *Lineæ* vel *Zonæ* transversæ & nigrescentes in lateribus, numero sex, quarum caudæ proxima, minima est.
18. *Squamæ* magnitudinis mediocris, arctissimè adhærentes & admodum duræ, in ventre plerumque albæ, in lateribus flavescentes, cano-albescentes &c. Anteriore parte, quæ sub cute tegitur, rectæ sunt seu latus rectum habent, & crenis notantur, glabræ tamen; posteriore sui parte & lateribus semicirculum quodammodo describunt, & in extremo limbo uncinulis exilibus & asperis retrorsum vergentibus armantur, unde squamæ manum antrorsum ducenti asperæ sentiuntur.
19. *Pinnae in dorso* duæ. Prior radiorum quatuordecim, rarè 15, omnium Aculeatorum, quorum ultimus minimus est.

Nota: Macula nigra & magna in hujus pinnæ (19) membrana ad finem conspicitur, alias vero membrana cano - cærulescens vel obscura est.

20. *Pinna dorsi* posterior radiorum sedecim, quorum primus exiguus & aculeatus, ceteri longiores & in apice parum ramosi.
21. *Pinnae Pectorales* non in imo ventre, sed in lateribus sitæ, *canescentes*, radiorum quatuordecim, quorum primi seu supremi duo & tres ultimi exigui sunt & indivisi; ceteri seu medii extremis longiores & in apice ramosi, membrana conjungantur admodum debili.
22. *Pinnae Ventrals* coloris ruberrimi, radiorum sex, quorum primus aculeatus, & simplex, ceteri admodum ramosi in apice, sc. in furculos 6 & 8 divisi, omnes vero ad exortum robusti sunt. Ad Perpendicularum elevari non possunt, sed ultimum ossiculum membrana ventri adjungitur.
23. *Pinna Ani* saturate rubra, radiorum duodecim interdum 11 quorum duo primi aculeati, ceteri in apice ramosi; ultimi admodum exigui sunt, 3tius & 4tus longissimi.
24. *Cauda* aliquantum furcata, ad extremitates rubescens, radiorum 17 longorum, quorum unus utrinque extremus in apice indivisus, medii in apice multum ramosi.
25. *Ovarium* in fœminis longum, cylindraccum & simplex, totam fere abdominis cavitatem implens. Vesica seminalis vero in maribus duplex est; seu ex duabus partibus infernè conjunctis constat.
26. *Hepar* pallide rubrum, in duos lobos divisum, quorum *sinister* major est. Cystis fellea in medio infra collocatur.
27. *Peritonæum* argentei coloris.
28. *Ventriculus* satis amplus, ab intestinis bene distinctus, tres magnas Appendices lumbricorum instar infra Pylorum habens.
29. Intestinum semel reflexum & pinguedine obvolutum, ad quod Lien oblongus & ruber.
30. *Vesica aërea* magna simplex, dorso secundum totam abdominis longitudinem adnata.
31. *Costæ* utrinque novendecim, quæ à vertebra spon te abscedunt. Vertebra vero in universum quadraginta & una.

- II. *PERCA* pallide maculosa, dentibus duobus utrinque majoribus. *Piscis, quem Schilum Germani vocant, alii Nagemulum.* Generi Paralipom. p. 28. edit. Francof. & 1288, ed. *Schilus sive Nagemulus Germanorum.* Aldrovandi lib. 5. c. 59. p. 667. Tab. 30. Fig. 15. *Lucioperca.* Schoneveldii p. 43. Willughbeji l. 4. Sect. 5. p. 293. Raji Syn. p. 98. *Gids, Succorum.*

Acanthopterygii.

Perca. 77

Longitudo Tota.

ad Narem 1mam $7\frac{1}{2}$ lin. 2dm.
 initium Oculi.
 Ejusdem finem.
 finem Opercul. branchiarum.
 Pinnas Pectorales.
 Ventrals.
 pinnam dorfi primam.
 Ejusdem finem.
 Pinnam dorfi secundam.
 Anum & Pudendum.
 Pinnam Ani.
 Ejusdem finem.
 finem Pinnæ dorfi 2dz.
 initium Caudæ.

unc. 21. lin. 2. à 3.

$9\frac{1}{2}$.
 1. $2\frac{1}{2}$.
 2. f.
 5. $1\frac{1}{2}$.
 5. 4.
 6.
 5. 8.
 10. 4.
 11. 1.
 11. 4.
 11. 7.
 13. 5.
 15.
 18. f.

Latitudo perpend. juxta initium

Oculi.
 Ejusdem finem.
 transversa ad medium Oculi.
 Perpend. ad finem Operculo-
 rum branchiarum vel Pin.
 Pectorales.
 transversa ibidem.

1. 3. à 4.
 1. 9.
 1. 4.
 3. 8. à 9.
 2. 5.

Lat. perp. juxta Pinnam dorfi pri- mam.

Perp. juxta Pin. Ventris.
 Perp. juxta finem Pinnæ dorfi
 primæ.
 transversa ibidem.
 Perp. juxta Pinnam dorfi 2dam
 Perp. juxta Pin. Ani.
 transversa ibidem.
 Perp. juxta finem Pinnæ Ani.
 transversa ibidem.
 Perp. juxta finem Pinnæ dor-
 fi 2dz.
 Transversa ibidem.
 Perp. minima paulo ante Cau-
 dam.
 Transversa ibidem.
 Perp. maxima in Ventre.

4. 1.
 4. $1\frac{1}{2}$ vel 2.
 4. 5.
 2. 4.
 4. 1.
 3. 5. à 6.
 2. f.
 2. 4.
 1. 5. à 6.
 1. $8\frac{1}{2}$.
 1. 3.
 1. 6. f.
 1. $\frac{1}{2}$ vel 1.
 4. 8.

1. *Caput* cathetoplateum, *Pectus* planum, sed *venter* magis convexus.
2. *Corpus* in medio *Ventre* circiter maximam latitudinem habet. Respectu *Perca fluvialis* Bellonii. *Caput* in hoc angustius, acutius & longius est; *dorsum* à capite multo minus assurgens; *Pars corporis* versus caudam gracilior & longior; *Rictus* amplius quidem, respective tamen multo minor quam in *Perca fluviali* Bellonii.
3. *Nares* ut in Specie antecedente.
4. *Oculi* magni rotundo-oblongi, ad latera capitis siti; *Pupilla* subrotunda; *Iris* ex colore argenteo, nigro & lutescente mixta.
5. *Mandibula* superior ore clauso ante inferiorem tantillum prominens, ita tamen ut vix notabile sit.
6. *Opercula branchiarum* longa, ex quatuor laminis offeosis (quæ tamen duas majores quasi constituunt) & septem officulis curvatis membranâ conjunctis constant. Lamina oculis proxima ex majoribus, in ambitu suo inferiore, serrata & aculeata est; postrema quoque in ambitu paulisper serrata, non in apophysin aculeatam procurrens ut in *Perca fluvi.* Bellonii. Tres laminæ utrinque squamis exiguis vestiuntur, quod in piscibus adultioribus bene conspicuum est.
7. *Claviculae* utrinque ex quatuor ossibus constant, quorum inferum seu maximum infra vel sub exortu Pinnarum Pectoralium situm est. Primum seu supremum & tertium in ambitu perum acuta sunt.
8. *Caput* supernè nigrescens; à naribus ad dorsum ferè Sulco lato parum excavatum; inde ad Pinnam dorsî primam sulcus quidam angustior extenditur, qui tamen ignotis non adeo conspicuus est.
9. *Linea lateralis* recta, dorso quam Venti multo propinquior.
10. *Squamae* duræ & asperæ, posticâ parte quasi striatæ, anticâ vero in ambitu asperæ vel leviter serratæ. Harum Color in Ventre albus; in lateribus ex argenteo, albo & flavicante mixtus; in dorso vero obscure canus vel in fuscescens cum maculis oblongis, magnis, nigrescentibus, partim transversis, partim nullo ordine sitis.
11. *Dentes* æ. in utraque maxilla magnitudinis inæqualis, sc. in Superiore duo dentes magni utrinque ad apicem rostri cum spatio medio vacuo, vel duobus denticulis interpositis, qui ore clauso extra mandibulam inferiorem propendent, pone hos mandibula utrinque unico ordine Dentium, prioribus multo minorum, armatur. Mandibula inferior, superioris modo, ad apicem duos utrinque Dentes magnos, interdum vero unicum tantum cum spatio medio vacuo habet, qui in maxilla superiore cavitates sibi formarunt, post hos in mandibulæ ambitu unicus ordo Dentium minorum sed inter se inæqualem sequitur.

β. Palatum in antica parte duos magnos Dentes cum duobus 3bus vel pluribus exiguis intermediis, & unicum ordinem Dentium minorum, utrinque in extremis lateribus palati habet, alias totum palatum glabrum & concavum est.

γ. In Faucibus insuper ad Gulam ossa sunt denticellis confecta, quorum duo inferius oblonga juxta branchiarum minimam, & sex minora supernè in duo majora oblonga & distincta quasi coalita sunt.

2. *Branchie* utrinque quatuor, quarum tres superiores duplici Tuberculorum aculeatorum ordine donantur, infima vero simplici tantum. Tubercula exteriora in branchia suprema inæqualia sunt, sc. quædam longiora, quædam multo breviora.
3. *Liugua* alba, glabra, infernè soluta.
4. *Pinne Pectorales* albescentes, radiorum sedecim, quorum duo extremi utrinque indivisi & minores, ceteri in apice ramosi, medii longissimi sunt membrana admodum debili & tenui conjunguntur omnes. Respectu corporis exigue quoque sunt.
5. *Pinne Ventrals* albæ cum punctulis cano-nigrescentibus & tantillo rubri adnixtis: radiorum sex, quorum primus aculeatus & simplex, reliqui ad medium & ultra admodum ramosi; Omnes crassissimi sunt & admodum robusti ad exortum.
6. *Pinna dorsi prima* ex maculis oblongis nigris & cano-luteis pulcre variegata; radiorum quatuordecim, quorum omnes aculeati & robusti; duo ultimi minimi sunt.
7. *Pinna dorsi secunda* canescens cum maculis nigris minoribus (16) & flavescens; radiorum viginti & trium, quorum duo primi aculeati, ceteri in apice ramosi. Primus omnium minimus est, secundus & ultimus magnitudine huic proximi.
8. *Pinna Ani* alba, cum punctulis exilibus nigrescentibus, radiorum quatuordecim, quorum duo primi Aculeati, ceteri præter 3tium in apice ramosi; Primus, secundus & ultimus minimi sunt, septendecim longorum, præter radiorum extremos numeratu difficiles.
9. *Cauda* bifurca.
10. *Pectus* squamis tectum, non vero nudum secundum quosdam.
11. *Hepar* rubrum à sinistro latere magis situm, in duos lobos majores & aliquot apophyses minores divisum, cum Cystide fellea flava.
12. *Ventriculus* mediocris, oblongus, cum sex Appendicibus magnis & rubris infra Pylorum, chylo crasso & albo, viscidoque, sicuti & Ventriculus; refertis. In Gula vero *Percam fluviatilem* Bellonii biuncialem inveni.
13. *Intestinum* semel quidem reflexum, sed tamen varie convolutum & tortum, adipe contextum.

24. *Lien* obscure ruber, oblongus & triangulatus ad Intestinum.
25. *Ovaria* in foeminis quasi duo, utrinque à lateribus unum, sed ad partem inferiorem in unum coalita; ductum suum seu vulvam infra Anum habentia; Ovis albo-flavescentibus innumeris referta.
26. *Vesica aërea* magna & crassa secundum totam spinam dorsi extensa, in antica parte in duos ventres divisa uti Cor Pictorum. Ex membranis crassis constat, & ad totam superiorem partem dorso arcte adhæret, ita tamen ut studio adhibito inde separari possit, licet difficulter hoc fiat, quatenus extimam membranam cum Peritonæo communem habet.
Ductus pneumaticus in suprema parte inseritur.
27. *Peritonæum* coloris argentei splendentis & pulcherrimi.
28. *Caru* candida & sapida.

III. *PERCA dorso monopterygio, capite cavernoso.*

Giers. Suecorum.

1. *Caput* Cathetoplateum ab oculis ad rostrum parum declive, inter oculos vero quodammodo planum, plurimis cavitatibus seu foveis superne, inferne & à lateribus repletum.
2. *Dorsum* subacutum; Venter & pectus quodammodo plana sunt. Pectus, nudis oculis, squamis omnino destitutum & glabrum videtur.
3. *Mandibula* ambz ejusdem longitudinis. Riçtus mediocris.
4. *Membrana branchiostega*, Nares, & Claviculæ ut in prima specie sese habent, sed Nares in hac specie, liquore quodam mucoso repletæ sunt; quo hic piscis totus obducitur.
5. *Oculi* magni & discolors.
6. *Denticulorum* exilium 1°. aliquot ordines in limbo maxillæ utriusque.
2° In antica parte palati seu rostro proxima denticuli aliquot adeo exigui ut vix videantur, alias totum palatum glabrum est.
3°. In Faucibus superne duo utrinque officula denticellis aspera, quæ ob vicinitatem in unum quasi coalita esse videntur. Inferne quoque infra branchias duo officula oblonga denticellis aspera & sibi admodum vicina.
7. *Linea lateralis* parum curvata, ceteræ omnino ut in prima specie;
8. *Maculæ* nigrescentes variz figuræ in dorso & superiore laterum parte, quæ in cute substrata sitæ sunt, non in squamis.
9. *Squamæ* & *Branchiæ* omnino ut in prima specie sese habent.
10. *Pinna* in dorso unica, officulorum viginti & octo, interdum vero 27, rarius 26, quorum quindecim anteriora, interdum vero 14 tantum aculeata & simplicia sunt, ex quibus iterum duo prima exigua, 4m vero 5m & 6m longissima, reliquæ ordine minora.

Officula

Officula vero Posteriora tredecim mollia sunt, quorum priora longiora, ultima duo autem minima sunt. Omnia hæc officula mollia in apice parum bifida sunt, præter primum.

1. *Pinnæ Pectorales* officulorum 15, & *Ventrales* officulorum sex, in omnibus exacte ut in prima specie se habent, præter colorem.
2. *Pinna Ani* officulorum octo, quorum duo primæ aculeata & firma sunt, reliqua vero mollia & in apice ramosa; duo prima æqualia & maxima vel 3tio & 4to paria longitudine sunt, ultimum admodum exiguum.
3. *Cauda* parum bifurca, ceterum ut in prima specie.
4. *Membrana Pinnarum Pectoralium*, dorsalis & caudæ, maculis nigris plurimis notatur, imprimis *Pinnæ dorsalis*.
5. *Locus*: Fluvii, lacus & sinus maris in Suecia.
6. *Ventriculus* amplus, cum tribus plerumque *Appendicibus* curtis & crassis infra *Pylorum*.
7. *Ovarium* in fœminis duplex & magnum, in infima tamen parte cohærens, ovis pallide luteis repletum. *Vesiculæ seminales* in maribus item duæ albiissimæ.
8. Reliqua *Intestina* ut in prima Specie sese habent.
9. *Vesica aërea* punctis nigris quasi irrorata, sed peritonæum argenteum.
10. *Vertebræ* numero triginta quinque. *Costæ* utrinque quindecim, quæ in Piscibus coctis sponte abscedunt.
11. Coit in fine Maji.

ongitudo tota.	unc. 4. lin. 5.
ad Oculum.	3.
Ejus finem.	6½.
ad Pinnas Pectorales & Ventrales.	1. 1½.
Pinnam dorsi.	1. 2.
Pinnam Ani.	2. 6.
Ejusdem finem.	3. ½.
finem Pinnæ dorsalis.	3. 2.
Initium Caudæ.	3. 8. cir.
atitudo ad medium Oculi.	6½.
ad initium Pinnæ dorsi, Pectora-	
lium & Ventralium.	1. f.
Pinnam Ani.	7.
Finem Pinnæ dorsi.	3½.
Minima ad caudam.	2½.

C O T T U S, G. Pisc. 34.

I. *COITUS alepidotus glaber, capite diacantho.**Stensimpa. Suecis.*

1. *Caput* Plagioplateum, corpore ipso latius, supernè quam inferius magis convexum & inæquale.
2. *Corpus* à capite ad caudam sensim decrescens, & terminè coniteres, vel caudam versus parum cathetoplateum, tres vel quatuor uncias longum.
3. *Rostrum* paulisper sursum reflexum. Mandibulæ ejusdem fere longitudinis.
4. *Nares* observari non possunt, an duplices vel simplices sint; additamen utrinque vel Valvula vel Cirrus quidam brevissimus, & vix conspicuus eo loco, quo Nares esse solent.
5. *Oculi* non à lateribus, sed supernè in media capitis parte, sibi multum vicini; Pupilla viridis; Iris obscurè flava.
6. *Laminarum* Capitis unica utrinque in aculeum aduncum & recurvum definit.
7. *Membrana Branchiosfega* convexa & aëre quasi sufflata est, & ossicula curva utrinque continens.
8. *Os* satis amplum & dentatum, & quideum
 - α. Denticuli multi, pluribus quam unico ordine siti, utrinque in limbis maxillarum.
 - β. In antica parte palati ossiculum denticellis asperum.
 - γ In Fauibus supernè sunt duo ossicula rotunda denticellis aspera, & inferius infra branchias itidem duo minora & oblongiora denticulis confita. Palatum medium, & lingua glabra sunt.
9. *Linea lateralis* bene conspicua, ferè recta, vel parumper in parte anteriore ad ventrem flexa.
10. *Cutis* alepidota, lubrica & admodum mucosa.
11. *Color* obscurus vel fusco-flavescens in dorso & lateribus, sed maculis seu lituris aliquot magnis & nigris, jam transversis, jam irregularibus, in posteriore corporis parte, notatus. Caput supernè nigrescens. Venter albescens est.
12. *Pinne* Pectorales, Anæ, dorsi & caudæ ex nigro & flavescunt variz sunt.
13. *Pinne in dorso* duæ, sibi ferè contiguz. Anterior exigua est, ossiculorum septem brevium, in apice indivisorum, non tamen simplicium. Membrana hujus pinne in supremo margine rubescit.

Pinna

- Pinna dorsi* secunda priori fere continua, maculis nigris varia, ossiculorum septendecim, interdum 16, in apice indivisorum; media longissima sunt.
14. *Pinnae Pectorales* maculis nigris variae, magnae, extremitate subrotunda, ossiculorum quatuordecim, quorum media longissima sunt, extrema brevissima. Omnia in apice indivisa praeter duo vel tria in quibusdam subjectis. Membrana ad summum ossiculorum non pertingit, unde pinnae hae in ambitu quasi serratae sunt.
15. *Pinnae Ventrals* albescentes, exiguae, inferiore situ, ut pectorales, ossiculorum quatuor, quorum duo media longissima, ultimum & in apice indivisum, reliqua in apice bifida sunt.
16. *Pinna Ani* itidem maculosa, ossiculorum 13, interdum 14, in apice indivisorum, media longissima sunt ut in reliquis.
17. *Cauda* maculis nigricantibus & fuscis varia, ossiculorum octo longorum & in apice multum ramosorum, praeter extrema minora & indivisa. In extremo non omnino aequalis est, sed parum subrotunda.
18. *Branchiae* utrinque quatuor, quarum duae mediae duplici Tuberculorum subasperorum ordine in concava parte donantur.
19. *Hepar* magnum & indivisum, cujus major pars a sinistro latere sita est, coloris lutei.
20. *Ventriculus* magnus & rotundus sacculi instar, infectis aliquot coleopteris exiguis refertus. Appendices quatuor oblongae ad Pylorum.
21. *Intestinum* semel reflexum, deinde recta ad anum tendens.
22. *Vesiculae seminales* marium seu Ovaria foeminarum duplicia quidem videntur, sed in infima parte cohaerent, & membrana nigerrima includuntur.
23. *Renes* & *Vesica urinaria* satis magna, in parte abdominis infima conspiciuntur.
24. *Peritonaeum* nigrescens.
25. *Vertebrae* in universum triginta & una, a lateribus satis compressae sunt. Costae utrinque 10 circiter, Vertebrae leviter per cartilagineam affixae.

Latitudo tota.	unc. 2. lin. 9.
a rostro. ad medium oculi.	2.
ad aculeos capitis laterales.	5½.
ad initium Pinnarum Pectoral.	6.
Pinn. Ventrallium.	6½.
ad init. Pinnae dorsi primae.	7½.
Ejusdem finem.	1. 2.
initium Pinnae Ani.	1. 3. f.

Ejusdem finem.	1.	f.
ad finem Pinnæ dorsalis 1dæ.	2.	2.
ad initium Caudæ.	2.	3.
Latitudo Capitis maxima.		7½.
ad Pinnas Pectorales,		6. f.
perpendicularis ad Anum.		4. f.
perp. ad Caudam.		2. f.

II. *COTTUS scaber*, *tuberibus quatuor corniformibus in medio capite.*

Horn-finpa. Succorum.

1. *Caput* Plagioplateum, corpore ipso latius, polyacanthum seu plurimis aculeis & tuberculis scatens, ad latera imprimis.
2. *Corpus* à capite ad caudam sensim decrescens, cetera ut in præcedenti specie. Ab ano ad caudam parum cathetoplateum.
3. *Mandibula* superior paulo longior inferiore.
Rictus admodum amplus.
4. *Nares* oculis paulo propiores quam rostro extremo, utrinque duplici foramine præditæ, cum satis longa distantia inter se invicem, sed non adeo bene conspicuæ.
5. *Oculi* non ad latera, sed in suprema capitis parte sibi satis vicini. *Iris* exigua flavo-rubra. *Pupilla* viridis ut plurimum, interdum ad cæruleum vel colorem flavescens vergens, figuræ non omnino rotundæ sed parum ovatæ.
6. *Tubercula* quatuor insignia, cornuum modo, in media parte capitis, situ quadrato, locata, quorum duo anteriora majora & sæpe rotundiora sunt, posteriora magis oblonga seu rotundo-oblonga; superficies horum Tuberculorum admodum scabra, inæqualis & porosa est.
Præter hæc Tubercula, Apophyses ossæ & aculeatæ, viginti & ultra, ex laminiis & ossibus maxillæ tam superioris, quam inferioris protenduntur, tenui tanquam cuticulâ tectæ; harum sunt duæ utrinque ad superiorem partem membranæ branchiostege; tres utrinque magnæ ad latera cornuum supra membranam branchiostegam; duæ ad Nares; una utrinque ad superiorem partem Pinnarum Pectoralium, & duæ latiores infra cornua ad initium dorsi, præter minores obtusas & vix notabiles.
7. *Membrana Branchiostege* Ossicula sex, teretia ferè sed curvata utrinque continet, omnino ut in priorè Specie.
8. *Denticulorum* exiguorum imo plures ordines in ossibus maxillaribus utriusque Mandibulæ.
2do. In Antica parte Palati ossiculum figura semilunari; & 3tio. supernè & infernè ad Fauces omnino ut in præcedenti specie.
9. *Linea lateralis* recta, dorso quam Ventrì propior.

10. *Supra* hanc lineam (9) secundum dorsum, à capite ad caudam usque, utrinque *Tubercula* aspera, minora, rotunda & depressa in duabus quasi lineis longitudinalibus sita sunt; in quarum superiori sunt ultra quadraginta, in inferiori vero linea, quæ brevior, quatuordecim circiter inveniuntur, quoad substantiam Tuberculis capitis (6) simillima, sed minora; Variant tamen numero, ut sint jam plura, jam pauciora. Intra lineam lateralem sunt etiam Tubercula ejusmodi aspera, minora, oblongiora & lunata, numero quadraginta circiter, jam plura jam pauciora.
11. *Cutis* reliqua, inter hæc Tubercula (10), alepidota & glabra est.
12. *Color* jam canescens, jam obscurus cum lineis nigris transversis in lateribus. Venter albus est. Pinnæ maculis nigrescentibus sæpe notatæ.
13. *Pinna in dorso* duæ, quarum Prior minor & humilior, officulorum novem, interdum vero 8. 7. vel 10, simplicium, & reliquis paulo rigidiorum, vix tamen aculeatorum. Pinna dorsi Posterior longior & altior, officulorum quatuordecim, interdum 15, duas uncias ferè longorum, in apice indivisorum; Primum & ultimum minima; hæc officula externe scabra sunt.
14. *Pinna Pectorales* admodum latæ & amplæ, officulorum 17 & sæpe 16, duas uncias longorum in adultis, in apice indivisorum. Extrema utrinque, imprimis infima, brevia sunt, media vero longissima, ut in priore specie; externè hæc officula scabra sunt.
15. *Pinna Ventrals* directæ sub Pectoralibus, ano paulo propiores officulorum quatuor brevium, in apice indivisorum; quorum primum minimum est, & 2do arcte adhærens, ut unum quasi constituent, duo ultima vero reliquis longiora; 1m omnino simplex est, sed non aculeatum.
16. *Pinna Ani* officulorum quatuordecim, in apice fere æqualis.
17. *Guda* in extremo fere æqualis, officulorum duodecim longiorum, præter extrema minora; ex longioribus media in apice bifida sunt, duo extrema vero utrinque fere indivisa; sæpe maculosa est hæc pinna.
18. *Branchiæ* utrinque quatuor, quarum tres majores seu superiores duplici, & infima seu minima simplici Tuberculorum subrotundorum, asperorum, æqualium & inter se rarorum ordine in concava parte donantur.
19. *Ventriculus* amplius & robustus ac subrotundus cum Appendicibus septem plerumque ad Pylorum.
20. Reliqua Intestina ut in priore specie sese habent.
21. *Vertebra* in universum quadraginta. Costæ utrinque 10 ambitu rotundæ, vertebri per cartilagine affixæ.

22. Cibus: Insecta, Afelli marini dicta; &c. inveni quoque semel in ejus faucibus Lampetram minorem, nondum adultam.
23. Locus: Littora maris Balthici & sinus Botnici ad Westrobotniam, Angermanniam, Medelpadiam, Helsingiam, Gestriciam, Roslagiam, Sudermanniam, Ostrogothiam & insulam Gotlandiam.
Coit mense Decembri, circa finem.
24. Hepar magnum, indivisum, flavescens, à sinistro latere magis situm.
Vesica felle subtus hæret.
25. Intestinum primo ad inferiora descendit, deinde ad Ventriculum iterum adscendit, & tertio ad anum descendit, sed parum tortum.
26. Vesiculae seminales vel Ovaria duo, unum utrinque.
27. Vesica urinaria quasi bifida ad Anum. Renes longi ad spinam dorsi.
28. Peritonæum ad dorsum, nigrescens. Membrana ova includens pariter obscura vel nigrescens.
29. Cor oblongum, quatuor lateribus præditum.
30. Figura hujus accurata habetur in Cel. *Linnei* itinere Lappónico, delineata inter Finlandiam & Alandiam in insulis, ubi etiam frequens occurrit.

III. *COTTUS alepidotus*, capite polyacantho, maxilla superiore paulo longiore.

Röfsimpa & Skialrysa. Angermannis, W-Botnis, Norlandis.
Skrabba Roslagis ad insulam Sandhamn.

Ulk seu *Ulka* ad fretum Oresundense. *Wulk* Holsatis.

1. Caput & corpus ita se habent ut in præcedente specie, sed Venter paulo amplior & sæpe magis prominens. Extrema pars magis cathetoplatea videtur.
2. Mandibula superior paulo longior, rictus amplius, Nares, Membrana branchiostega, Denticuli & Linea lateralis omnino ut in præcedenti specie, secundum situm & figuram, magnitudine tantillum majora.

Cirris caret ut species præcedens.

3. Oculi in superna capitis parte, majores quam in præcedenti, cute capitis communi tecti; Pupilla viridescens & ovata; Iris obscure rubra; Locus inter oculos elatus.
4. Aculei capitis iidem fere numero & figura sunt: scilicet duo ad nares; quatuor vel tres utrinque infra oculos ad memb. branchiostegam; duo utrinque superne juxta memb. branchiostegam; unus utrinque superne ad pinnas Pectorales. Reliqui differunt, nam duo illi lati aculei ad dorsum in priore specie hic absunt, & unus utrinque acutus & angustus ad latera dorsi retrorsum spectat.

Cor.

Cornua in hac specie defunt, sed horum loco quatuor exiguae apophyses, cute tectae & quadrato situ itidem locatae conspiciuntur.

5. *Tubercula* illa supra & infra lineam lateralem in hac specie pauciora, multo minora, nec adeo aspera & minus conspicua sunt, quam in priore specie.
6. *Cutis* glabra & alepidota est.
7. *Caput* supernè, dorsum, latera, pinnae & cauda maculis & lituris nigris atque flavescens vel canis varia sunt, interdum vero rubescunt, & interdum partes magis albeant. Venter & mandibula inferior albicant.
8. *Pinnae Pectorales* officulorum 17: in apice indivisum; Ventrals 4; quorum 1m omnino simplex est, sed 2do adeo arcte adhæret, ut non pungat, nec satis robustum est; Basis lata, bifida. Ani 11 vel duodecim.
Cauda in extremo æqualis fere, officulorum 12 longiorum præter minora. Pinnae omnino ita comparatae sunt, ut in præcedente specie; Primum officulum in Pectoralibus minus est, quam in præcedenti specie.
9. *Pinna in dorso* duæ sibi fere contiguae: Prior officulorum 9: 10. vel 11, simplicium & parum aculeatorum, extrema minima sunt; Pinna dorsi Posterior longior & alterior est, officulorum 14. 15. vel 16, in apice indivisum, sed mollium & minimè simplicium.
10. *Branchiae* ut in præced. specie omnino se habent.
11. Duo foramina ad Anum, quorum urethra infra est.
12. *Partes intestinae* fere ut in priore specie sese habent.
13. *Coit* circa brumam.
14. Longitudo tota à rostro ad extremam caudam in pisce descripto. 7 unc. 6 lin.
Latitudo maxima in medio capite, 2 unc. 2 à 3 lin.
15. *Locus* totus sinus Botnicus.

IV. *COTTUS cirris plurimis, corpore octagono.*

Cataphractus. Schoneveldii p. 30.

Jonstoni p. 77. & Tab. 46. fig. 5 & 6.

Will. p. 211. Raji p. 77.

1. *Caput* plagioplateum, superne convexum & angulosum, inferne planum.
2. *Corpus* tereti - angulosum, & ab Ano ad caudam valde gracilescit.
3. *Dorsum* à capite ad finem pinnae dorsalis 2da concavum vel sulco quasi exaratum est, in extremo vero subacutum.
Venter ejusdem figurae vel paulo planior.
Anus in medio Ventre pinnis Ventralibus, quam Pinnae Ani multo propior.

4. *Os* non magnum; non in apice capitis, sed magis subtus situm, figura semicirculari vel lunata quasi incisum.
Maxilla superior inferiore multo longior.
Cirri duo in *Maxilla* superiore; In inferiore vero ad *Os*, ut & in ipsa membrana *Branchiostega*, plurimi *cirri* adsunt.
5. *Narium* duo utrinque foramina, quorum posterius admodum exiguum est, anterius vero tubulosum, non longe à rostro, satis remotè à posteriori sita.
6. *Oculi* subrotundi ad latera capitis, sed superne tantum sibi satis vicini, rostro quam extremitati *Operculorum* paulo propiores.
7. *Aperturæ Branchiarum* mediocres.
Membrana Branchiostega ossicula sex teretia curva & satis distincta utrinque continet.
8. *Denticulorum* plures ordines: 1°. in utraque maxilla.
2°. ad Fauces; tam superne quam inferne *Ossicula* subrotunda denticulis aspera; in palato nulli observantur.
9. *Caput* osseum, durum & inæquale est, ac 8 aculeos imprimis continet, quorum 4 in ipso rostro conspiciuntur, duo sc. utrinque, quorum posterior retrorsum versus. Spatium inter aculeos rostri concavum est & apex ipse antè bifurcus evadit.
Reliqui 4 aculei ad latera capitis sunt: duo nempe utrinque breves, robusti, retrorsum versi ad extremum marginem *Laminarum*.
Postrema capitis pars bifida est, & in duas protuberantias non tamen aculeatas definit.
10. *Color* corporis obscure canus, maculis transversis 4 vel 5 superne positis. Venter ex flavo albescit.
Totum corpus, quod à capite ad finem pinnae dorsalis secundæ, octagonum est, inde vero ad caudam sexangulare, *Laminis* ossis duris contegitur, quæ in medio in prominentiam retroversam desinunt, imprimis dorsales, unde corpus angulosum evadit. In antica corporis parte *Laminæ* hæc octo ordinibus secundum longitudinem disponuntur.
11. *Linea lateralis* in medio corpore, recta fere vel supra *Pinnas* *Pectorales* ad dorsum paulum flexa.
12. *Pinna in dorso* unica, in medio ad basin ferè incisa, unde speciem duarum *Pinnarum* representat; Anterior pinnae pars *Ossicula* quinque simplicia & paulisper aculeata continet.
Posterior est *ossiculorum* 7 mollium, in apice indivisorum & anterioribus longiorum.
13. *Pinnæ Pectorales* amplæ, maculis nigrescentibus variez, ventri seu *Pectori* vicinæ, in ambitu subrotundæ, *ossiculis* 15 in apice indivisis; media longissima sunt.

Pinnæ

Pinnae Ventrals admodum exiguae & sibi vicinæ, paulo infra Pectorales ex 3. ossiculis in apice indivisis constant, quorum brevissimum est simplex & aculeatum, sed tenaciter secundæ adhæret.

Pinna Ani è regione posterioris partis Pin. dorsalis, ossiculis sex in apice indivisis.

14. *Cauda* in extremo subrotunda offic. 11 vel 12, in apice non ramosis.

Longitudo Tota.	unc. 4. lin. 3. circ.
ad medium Oculi.	4. f.
Pinn. Pectorales.	8½.
Ventrals.	9.
Pinnam Ani.	2.
initium Pinn. dorsalis.	1. 4.
Ejusdem finem.	2. 7½.
initium Caudæ	3. 7. f.
Latitudo horiz. maxima ad finem capitis.	1. 1. f.
Pinnam Ani.	2½.
pend. ad initium Caudæ.	1½.

CHÆTODON, G. Pisc. 36.

1. *CHÆTODON lineis longitudinalibus variis, cauda bifurca utrinque aculeata.*

1. *Caput & corpus cathoplatea. Corpus Latum & tenue.*
2. *Dorsum acutum. Venter antèrius parum planus.*
Anus medio inter Pinnas Ventrals & Pinnam Ani.
3. *Os admodum exiguum. Maxilla superior clauso ore, inferiore tantillum longior est. (Cirrus nullus.) Caput ab oculis ad rostrum admodum declive. Labium in apice maxillarum, & retrorsum, & antrorsum manu duci potest.*
4. *Nares duplici foramine utrinque præditæ, quorum antèrius majus est; oculis admodum vicinæ.*
5. *Oculi, superne ad latera capitis, subrotundi, cute capitis comuni non tecti. Iris ex cœruleo albescens.*
6. *Membrana Branchiofleget ossicula 3 vel 4, adeo exilia ut vix numerari possint, continet, quæ latiuscula sunt & ab Operculis Branchiarum omnino conteguntur.*
Aperturæ Branchiarum non magnæ, sed potius angustæ.
7. *Dentium subulorum, alborum, contiguorum & apice ferrato præditorum unus ordo in utraque maxilla. Lingua & palatum glabra.*

8. *Squamæ* obtuso, quadrangulæ, uncinulis vix conspicuis in inferiore limbo exasperatæ, ad anteriorem partem levissimè striatæ.

Totus piscis lineis longitudinalibus variis; sc. novem lineæ angustæ, cæruleo-albescentes, in utroque latere, quæ à latere utrinque lineam fuscam habent, ita ut lineæ fuscæ sint circiter no. 18; inter lineas fuscas vero sex vel septem lineæ albæ latiores, in utroque latere adsunt. In Vertice quoque lineæ aliquod. cærulescentes adsunt.

9. *Linea lateralis* admodum curva & dorso propinqua.

10. *Pinna dorsi* obscure cana, per totum dorsum extensa, officulorum 36, quorum 9 aculeata, reliqua mollia in apice bifurca; ima brevissima sunt.

11. *Pinnae Pectorales* Ventri quam dorso propiores, ut planum inclinatum sitæ, officulorum 16, quorum 2 prima indivisa, reliqua in apice ramosa; 2m, 3m & 4m longissima.

12. *Pinnae Ventrals* oblongæ, in extremo nigræ, Ano viciniores quam *Pinnae Pectorales*, ad basin membrana ventri junctæ, unde ad perpendicularum non erigi possunt, off. sex, quorum 1m aculeatum, reliqua ramosa; 2m & 3m longissima.

13. *Pinna Ani* nigrescens, ad basin vero albens, officulorum 29, quorum 3 prima aculeata; primum minimum est, penultima longissima, in apice bifida.

14. *Cauda* magna, bifurca, officulorum sedecim longiorum, quorum utrinque extremum indivisum, reliqua in apice ramosa; Præter hæc vero utrinque aliquot brevia sunt.

Macula magna, lunulata, albens in extremo caudæ.

15. *Aculeus* magnus & acutus in utroque latere versus caudam, postica parte corpori affixus, qui in sulco quodam lateribus insculpto reconditur, plagioplateus est.

16. *Branchiæ* utrinque quatuor, omnes duplici apophysium, minutissimarum & mollium ordine donatæ, in concava parte,

II. *CHÆTODON nigrescens, cauda albescente, æquali utrinque aculeata.*


1. Caput, Corpus, Dorsum, Venter, Anus, Os, Maxillæ, Dentes, Nares, Oculi, Iris, Membrana Branchiostega, Aperturæ Branchiarum, squamæ subasperæ & Linea Lateralis curva, ut in præcedente specie.

Squamæ vero, respectu ad magnitudinem æqualem, multo minores sunt in hac, quam in illa specie.

2. *Color* corporis unicus pallide nigrescens, vel fuscus.

Pinnae Pectorales canæ, *Pinna dorsi* & *Ani* nigricantes, ad basin vero albæ, *Pinnae Ventrals* nigræ sunt.

Linea Nigra latissima Corpus inter pinnas Ventrals &
tem dorsi partem transversim dividit, quæ tamen infra
 Branchiarum in anteriore parte lineam albescentem,
 curvam, transversalem utrinque habet.
 alba lata corpus in medio transversim dividit.
 igma satis lata corpus inter medium pinnarum dor-
 transversim secat.



scens corpus ad initium caudæ secat &
 primo linea lata, nigra & posterius lunulata
 mum vero caudæ albescens est.

is alta, posterius admodum humilis, offi-
 rum 7 anteriora parum aculeata sunt, duo
 qua mollia & in apice bifida, præter pri-

Ex aculeatis duo prima supra modum
 longissimum & in setam quasi longam,

laterum fere, vel ventri paulo pro-
 in apice ramosorum, præter duo pri-
 am 3m & 4m longissima.

sex, quorum 1m aculeatum.

osterius humilis, officulorum 36,
 'iqua in apice bifida, media lon-

culorum 16 longiorum, præ-
 a multum ramosa.

lici ordine apophysium ad-
 natæ in concava parte, non

apucia subtus.

leo latum, ut latitudo in medio corpore aliquot li-
 neis tantum minor sit, quam tota longitudo.

Fauces glabræ, sed ad orificium Ventriculi superne ad fauces
 officulum secundum longitudinem, acuta carina præditum.

CHÆTODON canescens, aculeo utrinque ad os, officulo ter-
 tio pinne dorsalis setiformi longissimo.

Corpus, Os, Nares, Oculi, figura corporis, Arcus, Dentes,
 Membrana Branchiofega, Squamæ & linea lateralis omnino
 ut in præcedente specie.

Rostrum seu Os anterius productum, minus tamen quam in
 præcedente.

Aculeus acutus, retrorsum versus & ad basin serratus utrinque
 in superiore maxilla ad angulos oris, quo prior (4) caret.

Officula tria, longitudinalia, utrinque supra oculos, parum
 conspicua, sed aculeus nullus ut in priore.

Color canescens vel in medio corpore ex argenteo albescens,
 linea tamen obscura vel nigrescens posteriorem corporis par-

ata Initium caudæ cingit, à lateribus extenditur, extremitatem caudæ quoque ambit. Præter has maculas
sto Ad Os linea utrinque transversa adest, & alia longitudinalis & recta in Vertice.

7. *Pinna dorsi* admodum alta, & in medio in cornu quasi producta, officulorum quadraginta & unius, quorum 10 vel 9 anteriora aculeata sunt breviora & robusta, reliqua mollia & maximam partem in apice bifurca, apicibus brevibus ultra membrana extensis.
8. *Pinnae Pectorales* nigrescentes offic. 19. vel 20, quorum omnia præter duo prima in apice ramosa, 3m, 4m, 5m & 6m longissima.
9. *Pinna Ani* magna, in medio in eminentiam producta, officulorum 27, quorum 3 prima aculeata & robusta, reliqua mollia & in apice bifida; media longissima sunt.
10. *Pinna dorsi & Ani* membrana crassa & robusta conjunguntur, & ad apices usque officulorum squamis subasperis contexta sunt.
11. *Cauda* in extremo æqualis fere vel parum convexa, officulorum 17 longiorum, præter extrema admodum breviora. Ex longioribus media in apice ramosa sunt, præter unum utrinque extremum, membrana crassa & parum squamosa conjunguntur. Apophyses Branchiarum non asperæ.
12. *Longitudo* 4 unc. 4 lin. *Latit.* max. 2. unc. 7. lin. major quoque invenitur.

IV. *CHÆTODON aculeis duobus brevibus supra oculos, officulo tertio pinnae dorsalis longissimo.*

1. Corpus, Dorsum, Venter, Anus, Os, Nares, Oculi, Aperturæ Branchiarum, Linea Lateralis &c. ut in præcedentibus.
2. *Rostrum* longum & admodum productum. Mandibula inferior paulo longior videtur, sed dentes in superiore longiores sunt.
3. *Officulum* ferratum in antica parte utrinque supra oculos, & supra hoc aculeus utrinque brevis, crassius, retrorsum parum flexus.
4. *Membrana Branchiosfega* officula 4 gracilia utrinque continet.
5. Dentium longorum & contiguorum fere duo ordines in utraque maxilla. Dorsum à capite admodum assurgens. Palatum lingua & Fauces glabræ.
6. Squamæ admodum exiguæ, confertæ, duræ & asperæ.
7. *Color* totius ex nigro & albescente variat; nam primo anterior capitis pars albescens est cum linea nigra in vertice, ut & subtus ad mandibulam inferiorem.

2°. Linea Nigra latissima Corpus inter pinnas Ventrals & anteriorem dorsi partem transversim dividit, quæ tamen infra Opercula Branchiarum in anteriore parte lineam albescentem, angustam, curvam, transversalem utrinque habet.

3°. Linea alba lata corpus in medio transversim dividit.

4°. Linea nigra satis lata corpus inter medium pinnarum dorsalis & Ani transversim secat.

5°. Linea albescens corpus ad initium caudæ secat &

6°. Cauda ipsa primo linea lata, nigra & posterius lunulata insignitur, extremum vero caudæ albescens est.

8. *Pinna dorsi* antèrùs alta, posterius admodum humilis, ossiculorum 46, quorum 7 anteriora parum aculeata sunt, duo verè aculeata, reliqua mollia & in apice bifida, præter primam admodum brevia. Ex aculeatis duo prima supra modum brevia sunt, 3m vero longissimum & in setam quasi longam, ultra caudam productum.

9. *Pinnae Pectorales* in medio laterum fere, vel ventri paulo propiores, ossiculorum 18, in apice ramosorum, præter duo prima, 1m admodum breve. 2m 3m & 4m longissima.

Pinnae Ventrals nigrae, oss. sex, quorum 1m aculeatum.

10. *Pinna Ani* antèrùs lata, posterius humilis, ossiculorum 36, quorum 3 prima aculeata, reliqua in apice bifida, media longissima.

11. *Cauda* lata, parum bifurca, ossiculorum 16 longiorum, præter 2 vel 3 utrinque brevia; media multum ramosa.

12. *Branchiae* utrinque 4, omnes duplici ordine apophysium admodum brevium & exiguarum donatæ in concava parte, non asperæ sunt. Folia duplicia subtus.

13. *Corpus* adeo latum, ut latitudo in medio corpore aliquot lineis tantum minor sit, quam tota longitudo.

Fauces glabræ, sed ad orificium Ventriculi superne ad fauces ossiculum secundum longitudinem, acuta carina præditum.

V. *CHÆTODON canescens, aculeo utrinque ad os, ossiculo tertio pinnae dorsalis setiformi longissimo.*

1. Corpus, Os, Nares, Oculi, figura corporis, Arcus, Dentes, Membrana Branchiostega, Squamæ & linea lateralis omnino ut in præcedente specie.

2. *Rostrum* seu Os antèrùs productum, minus tamen quam in præcedente.

3. *Aculeus* acutus, retrorsum versus & ad basin ferratus utrinque in superiore maxilla ad angulos oris, quo prior (4) caret.

Ossicula tria, longitudinalia, utrinque supra oculos, parum conspicua, sed aculeus nullus ut in priore.

4. *Color* canescens vel in medio corpore ex argenteo albescens, linea tamen obscura vel nigrescens posteriorem corporis partem

tem inter medium Pinnarum dorsalis & Ani transversim secat, & alia obscura & transversalis oculos, & partes oculo vicinas transcurrit.

5. *Pinna dorsi* omnino ut in priore specie, off. 46. quorum duo prima vix aculeata. *Pinna Ani* off. 36. *Pectorales* 17 vel 18. *Ventrales* off. sex, omnino ita comparatæ, ut in priore.
6. *Cauda* in extremo parum bifurca, officulis 16 longioribus. *Branchiæ* ut in priore.

VI. *CHÆTODON macrolepidotus*, lineis utrinque duabus nigris, officulo quarto pinnae dorsalis longissimo setiformi.
De Tafelfisch H. Ruyschii Theatr. Tab. 1. Fig. 1. p. 1.

1. Caput, Corpus, Os, Nares Oculi, Dorsum, linea lateralis &c. ut in prioribus speciebus. Iris alba.
2. Caput productum, angustum. Maxilla inferior superiore paulo longior apparet. Orbita Oculorum superne subacuta est.
3. Lamina Operculorum media in ambitu infernè parum serrata est.
Apertura branchiarum ampliores & magis incisæ quam in precedentibus.
Membr. Branchiosæga off. 5. utrinque continet.
4. *Dentium* flexillum & contiguorum plures ordines dense siti in utraque maxilla, & duæ prominentiæ in antica palati parte.
5. *Squamæ* amplæ, imbricatim sitæ, tenues, ad basin rectiliniæ & parum striatæ, posterius vero subrotundæ & ambitu subaspero præditæ.
6. Color ex lineis nigris & albescentibus transversis: est enim varius, totum fere Caput albescens, sed linea nigra superne inter oculos, & macula nigra ad rostrum.
 Linea nigra, lata, transversalis, inter Pinnas Ventrales & initium pinnae dorsalis.
 Linea albescens, lata, extremitatibus curvis in medio corpore.
 Linea lata, nigra inter medium pinnae dorsalis & finem pinnae ani; & reliquum pinnae dorsalis & tota cauda albescentia sunt.
7. *Pinna dorsalis* Officulis 37, quorum 11 aculeata & robusta, reliqua mollia & in apice ramosa; ex aculeatis 4m longissimum est, & setæ instar ultra ipsam caudam longe extenditur, reliqua satis brevissima sunt.
8. *Pinnae Pectorales* albæ Ventri quam dorso multo propiores, officulis 18, quorum duo prima in apice indivisa, reliqua parum ramosa.
Pin. Ventrales nigerrimæ, off. sex, quorum primum aculeatum, latiusculum & robustum, reliqua multum ramosa.
9. *Pinna Ani* lata & in medio alta, officulorum 23, quorum 3 anteriora aculeata & robusta, reliqua mollia in apice ramosa; media omnium longissima.

10. *Cauda* albescens, in extremo æqualis fere, officulorum 17, ut in præcedentibus comparatorum.
11. *Anus*, pinnæ Ani, quam Ventralibus multo priorior. Branchiæ ut in præcedente.
12. *Longitudo* piscis 4 unc. circiter. *Latitudo* maxima 3. unc. 4 ad 5 lin.

VII. *CHÆTODON macrolepidotus*, lineis utrinque tribus nigris latis: linea quarta in cauda.

1. Caput, Corpus, Os, Nares, Oculi, Lamina Operculorum Media, Aperturæ Branchiarum, Membr. Branchioftega, Squamæ, Linea lateralis, situs Ani, Venter &c. ut in præcedente specie.
2. *Dorsum* minus à capite assurgens, quam in præcedente specie.
3. *Maxilla* longitudine æquales, sed aperto ore inferior paulo longior apparet. Rostrum productum.
4. *Dentium* plures ordines in maxillis omnino ut in præcedente specie. Protuberantia satis magna in antica palati parte.
5. Color ex nigro & albescente varius, nam
 - α. tota anterior Capitis pars alba est,
 - β. Linea nigra curva utrinque regionem oculorum transversim transit.
 - γ. Hanc linea alba lata excipit.
 - δ. Linea utrinque nigra inter Anum & initium pinnæ dorsalis.
 - ε. Linea albescens lata in medio corpore.
 - ζ. Linea nigra lata inter medium pinnarum dorfi & Ani.
 - η. Reliquum corporis extremum & caudæ dimidiæ albescencia sunt paucio nigro tamen admixto. Margo exterior in posteriore parte pinnarum dorfi & ani quoque nigricat.
 - θ. Linea nigra transversalis in medio fere caudæ.
 - ι. Extremum vero caudæ albescit.
6. *Pinna dorfi* non adeo alta, ut in quibusdam ex præcedentibus, officulis 33, quorum 12 aculeata & admodum robusta, reliqua mollia & in apice ramosa; media longitudine fere æqualia sunt & nullam in appendicem setiformem desinit.
7. *Pin. Pectorales* flavescentes, off. 16. *Ventrals* ad dimidium nigerrimæ, off. sex omnino ut in præcedente (6).
8. *Pinna Ani* off. 21, numeratu difficilium ob squamas quibus teguntur, quorum 3 prima aculeata, crassa & robustissima imprimis adum, reliqua ut in præcedente.
9. *Cauda* in extremo subrotunda vel convexa, officulorum 17 longiorum.

GASTEROSTEUS, G. Pisc. 37.

I. *GASTEROSTEUS aculeis in dorso tribus.*

1. *Corpus* Cathetoplateum, ad posteriora satis compressum.
2. *Caput* magnum, longum & compressum seu cathetoplateum, ab oculis ad rostrum declivè; rostrum subacutum; *Rictus* vero satis amplius est. Caput supernè cano-nigrescens, durum, osseum & leviter striatum.
3. *Mandibula* inferior prominentior est superiore.
4. *Oculi* magni ad latera capitis siti, quorum *Iris* argentei coloris est.
5. *Nares* exilissimæ, medio inter rostrum & oculos sitæ, quæ unicuique tantum foramen utrinque habere videntur.
6. *Opercula branchiarum* magna, ex duabus quasi laminis ossibus magnis, & ad inferiorem partem ex membrana branchiostega tribus ossiculis longis & gracilibus facta, utrinque constantia.
7. *Denticuli* plurimi in limbo utriusque maxillæ; palatum vero & lingua glabra.
8. *Branchiæ* utrinque quatuor duplici apophysium seu Tuberculorum exilissimorum ordine donatæ; Exteriora Tubercula in Branchia suprema longa & pectiniformia sunt.
9. *Linea lateralis* parum flexa, dorso vicina, eique parallela, quæ juxta caudam in prominentiam pinniformem definit, ita ut corpus, caudæ proximum, quadratum quasi sit.
10. Totum corpus argentei coloris, sed dorsum & caput supernè nigrescentia.
11. *Pectus* duobus ossibus duris & oblongis armatur seu tegitur, quæ in antica parte coeunt.
12. Supra hanc pectoris armaturam (11) musculus magnus & cutis glabra tectus, ante pinna Pectorales adest, cum adjuncto osse claviculæ magno, simplici, in antica parte.
13. *Venter* osse duplici, oblongo, duro & scutiformi ad Anum fere extenso tegitur; ad anteriorem vero partem hujus ossis, aliud os oblongum & planum, ad angulos rectos, utrinque erigitur, quod latera firmat, & suo quoque latere continuum est cum osse Ventrali prædicto.
14. Præter hæc (11. 12. 13.) Totum corpus infra pinna pectorales ad caudam ferè, Loricis seu ossibus transversis, numero 26 vel 27, tegitur, quorum media maxima sunt, capiti vero & caudæ proxima admodum exigua existunt.

15. *Pinna dors*i unica, magna, per totum ferè dorsum extensa, officulorum quindecim, quorum tria anteriora aculeata & longè à se invicem disjuncta sunt; posteriora vero mollia & in apice parum bifurca. Duo anteriora ex aculeatis magna, longa, æqualia & à lateribus serrata sunt, tertium reliquis triplo minus: omnia tria autem membranâ ad partem conjuncta sunt, non vero omnino discreta, ut quidam scribunt. Ultima officulorum mollium minima sunt.
16. *Pinnae Pectorales* vel laterales albescentes, oblongæ, & in extremo æquales, officulorum decem in apice indivisorum, quæ omnia ejusdem ferè longitudinis sunt.
17. *Pinnae Ventrals* officulis duobus utrinque constant, quorum anterius magnum, aculeatum & plerumque à lateribus serratum est; *Inferius* vero molliissimum, exiguum, breve, album & non adeo conspicuum, à nemine hucusque observatum.
18. *Pinna Ani* albescens, officulorum novem, quorum primum admodum-breve & aculeatum, reliqua mollia, longa & in apice parum bifida; ultima minima sunt.
19. *Cauda* oblonga, in extremo æqualis, officulorum duodecim longorum, quæ omnia præter duo extrema, in apice bifida sunt.
20. *Partes Intestinae* ut in sequenti specie sese habent.

II. *GASTEROSTEUS aculeis in dorso decem.*

1. Caput ad structuram, mandibula inferior longior, Denticuli minimi maxillarum cum lingua & palato glabris, Nares, Opercula branchiarum, branchiæ, linea lateralis, caudam versus in prominentiam pinniformem producta, ossa duo Pectoris, musculus magnus & glaber cum adjuncto osse claviculæ simpliciter ad pinnae pectorales, Os Ventris scutiforme cum osse laterali sibi continuo, & respectu ossis ventralis ad angulos rectos producto, Pinnae Pectorales, Ventrals & cauda, ut in priore specie sese habent.
2. Caput longius respectu ad Speciem priorem, & ab oculis ad rostrum parum vel nihil declive, secus quam in priore specie.
3. Iris ex colore argenteo & aureo mixta.
4. *Latera* & venter coloris argentei splendentis, cum paucolaceo admixto, & punctulis nigris minimis; dorsum obscure canum, cum maculis majoribus, irregularibus & nigrescentibus.
Latera & venter glabra sunt, nec ullæ squamæ oculis nudis conspici possunt.
5. *Ossa* seu Loricæ transversæ laterales in hac specie omnino desunt. Reliqua ossa Pectoris sc. & Ventris minus quoque conspicua sunt in hac, quam in priore specie.
6. *Linea lateralis* vix conspicua, recta, dorso propior.

7. Aculei dorſi & ventris admodum difficile deprimuntur, quando erecti ſunt; & oriuntur è ſulco quodam.
8. Aculeus Pin. Ventralium exteriori latere leviter ferratus eſt. Membrana harum pinnarum albiffima eſt.
9. *Pinna dorſi* unica, offiſculorum viginti, quorum 9 & interdum 10 anteriora aculeata, robuſta & brevia ſunt, alterno ordine ſita, quatuor utrinque extrorſum ſpectant, ultimum vero perpendiculariter erigitur, omnia vero membranâ exili dorſo affiguntur, ad partem inferiorem. Reliqua undecim offiſcula mollia ſunt & multo longiora, quorum media in apice bifida ſunt.
10. *Pinna Ani* offiſculorum undecim, quorum primum aculeatum, breve & robuſtum; reliqua mollia, quorum media in apice bifida ſunt.
11. *Locus*: Rivi, foſſæ, lacunæ &c. ſinus maris per totam fere Sueciam.
12. *Hepar* reſpectu corporis maximum, coloris carnei, in tres lobos diviſum, quorum duo breves ſunt, tertius vero, à latere dextro, longiſſimus, ad Anum ferè extenſus. Veſica fellis exigua ad initium lobi tertii ſeu longiſſimi, membranis ſolum Hepati affixa.
13. *Cor* ſemine cannabino minus, triquetrum cum baſi plana, ſeu quatuor lateribus præditum, cum Aorta magna & albeſcente.
14. *Lien* exiguus, ruber & obtuſe triangulatus, ad ſiniſtrum Ventriculi latus.
15. *Ventriculus* longus & craſſus, nullis appendicibus præditus. Inteſtinum infra Pylorum parumper ſurſum reſlectitur, ſed mox recta ad Anum tendit, pinguedine omnino involutum.
16. *Veſica aërea* magna, craſſa & ſimplex, ſpinæ dorſi affixa, ſed ſeparabilis.
17. *Veſicæ ſeminales* marium duæ, albæ, unum utrinque in inferna abdominis parte.
18. *Corpus* rubeſcens, oblongum, in infima abdominis parte ad ſpinam dorſi, quod *Renum* officium procul dubio præſtat.
19. *Peritoneum* punctis nigris aſperſum.

Longitudo tota.

unc. 1, lin. 6.

ad Aculeos dorſi.

4.

eorundem ſinem.

8.

ad Pinnam dorſi mollem.

8½.

Ejuſdem ſinem.

1. 2.

Pinnas Pectorales.

5. f.

Aculeos Ventris.

6.

Aculeum Ani & ejus pinnam.

9. f.

huius pinnæ ſinem.

1. 2.

ad Caudam.

1. 4. f.

Latitudo maxima.

3.

CHON.

CHONDROPTERYGII.

PETROMYZON, G. Pisc. 42.

I. PETROMYZON unico ordine denticulorum minimorum in limbo oris, præter inferiores majores.

Nætting dicitur in Angermannia, Medélpadia, W-Botnia: provinciis Sueciæ.

Neunögon aliis in Suecia Australiori.

Lamprey-Eel & Lampern Anglis.

Longitudo tota.	unc. 9.	lin. 4.
ad medium Oculi.		7.
finem Foraminum Branchialium.	1.	9.
Pinnam dorfi primam.	4.	9.
Ejusdem finem.	6.	2.
Pinnam dorfi secundam.	6.	4½.
ad Anum.	6.	9.
finem Pinnæ dorsalis 2dæ seu tota		
Longitudo.	9.	4.
Latitudo ad medium oculi.		4.
ad Pinnam dorfi primam.		6.

1. *Corpus* longum, teres ferme vel tantillum cathetoplateum, imprimis caudam versus, omnino Alepidotum, Cartilagineum seu exos & lubricum.
2. *Dorsum* totum & venter convexa sunt. Color in dorso unicus, cæruleo-nigrescens: in ventre albo-argenteus & splendens.
3. *Maxilla* nullæ, h. e. *Caput* à reliquo corpore non benè distinctum, sed paulo gracilius & angustius, quam reliquum corporis est, inter oculos & Anum. Figura Capitis oblonga & ferme teres.
4. *Os* non in extremitate, sed in prona parte capitis, amplum, planum, rotundum, quod sugendo contrahitur & dilatatur; maxillis enim destituitur.
5. *Dentium* minutissimorum α . ordo unicus in circumferentia seu extremo oris limbo.
 β . In superna oris parte, sub hoc limbo, ordo sex circiter dentium minutissimorum.

γ. à lateribus oris tria utrinque officula vel dentes, quorum supremum bifidum, 2dum trifidum vel bifidum, infimum fere bifidum,

δ. Inferne ad introitum oris, os oblongum transversum, 7 denticulis ferratum, superne vero os semilunare & crassum adest.

ε. Porro in ipso oris recessu, inferne quoque adest Os oblongum, septem denticulis exasperatum, quod facile avellitur.

ζ. Ad fauces infernè Officulum cartilagineum bifolium, & singularis figuræ adest.

6. *Oculi* rotundi, exigui, à lateribus capitis siti, cuticula cæci, & à rostro satis longè remoti.

Iris argentei coloris, punctulis aliquot nigrescentibus obscurata. Interdum iris rubra est, sed hoc fit à violentia externa & pressione in detergendo muco.

Punctula seu ductus aliquot exigui utrinque in suprema parte capitis, & ad oculos & sub ore observantur, ex quibus tamen nihil exprimere potui.

7. *Nares* nullæ, sed *Foramen unicum* in medio capite paulo ante regionem oculorum, cujus ductus ad posteriora vergit, & aperturam suam non in os habet, ut vulgo scribitur, sed ductu continuo, membranaceo, inter corpora pulmonum longitudinaliter extenso, procedit, & cum aperturis pulmonum interius procul dubio communicat.

8. *Foramina Septem* subrotunda vel ovalia, in linea recta longitudinali utrinque infra oculos sita, quæ aperturis Operculorum Capitis in aliis piscibus respondent: Per hæc enim & aquam excipit & expuit.

9. *Macula* albescens, & sæpe rubescens in medio capite inter oculos.

10. *Venter* seu tota prona pars aptera est, h. e. Pinnis Pectoralibus, Ventralibus & Ani carens.

11. *Pinna* in extremo dorso duæ, membranaceæ & molles, quarum Anterior minor est & brevis; secunda vero seu posterior, longior & altior existit; nam in medio satis attollitur, deinde sensim decrescit, & paulo ante caudam humillima evadit; mox vero paullulum attollitur, & caudam circumiens, eandem, vel illius pinnam, tam infernè quam superne constituit, ita, ut nulla sit cauda à Pinnis dorfi omnino distincta. A terminatione inferioris partis caudæ, Eminentia quædam rubescens, fili tenuis instar, ad Anum usque extenditur.

Ambæ dorfi pinnae, non officulis, sed cartilaginibus creberrimis, ceu radiis sustentantur, quæ cartilagines seu radii cartilaginei inferne omnino simplices sunt, medii vero in apice bifurci existunt, quod non nisi in Lampetra, pelle detracta, conspici potest.

12. *Linea lateralis* nulla, sed punctula aliquot longe à se distantia ad anteriorem corporis partem, in recens captis observantur.
13. Intestinum unicum simplex, gyris carens, gracile, ejusdem latitudinis ubique ferè, rectissimâ lineâ à Ventriculo ad Anum extensum, colore rubro-albescens, quod foeminis in medio Ovarii occultatur: Ovarium enim Spinæ dorsii propius est. Juxta Anum Intestinum hoc latius fit, & membranâ dorso adjungitur, in anteriore parte, Hepati quoque subtus & Pericardio valide affixum est.
14. *Ovarium* unicum quidem & cohzrens, sed in plurimos & numerosos lobos divisum, qui omnes, membranâ quadam satis robusta, Spinæ dorsii affiguntur, ovis innumeris albescentibus refertum, ab Hepate ad Anum usque extensum. *Vesicula seminales* in Maribus rubræ, longæ per abdomen extensæ, pariter in lobos innumeros divisæ. Mares in hac specie, respectu foeminarum, admodum pauci sunt, quod ex dissectione earum satis expertus sum. Martio & Aprili cohznt.
15. Corpora duo oblonga, rubescencia, ab Ano ad medium corporis extensa, forte Renes.
16. *Hepar* magnum, simplex seu indivisum, ab una parte convexum, ab altera vero, seu dorsii vicina parte, parum concavum, in superiore sui parte, lateribus piscis & pericardio valide, membranarum ope, affixum, colore rubro-flavum.
Vesica fellis nulla hepati adnexa est, nec illam alias invenire potui, ut neque ullus Auctor gloriari potest se Vesicam fellis in hoc pisce unquam vidisse; omnes enim Ichthyologi Vesicam fellis in Lampreta negant, nisi forte sint Vesiculæ illæ quæ ad latera Ventriculi, de quibus infra.
17. Cor conicum cum auricula magna, in Pericardio duro, cartilagineo, albo & robusto reconditum.
18. *Vesica aërea* nulla distincta, sed membrana valida peritonæo communis, ab Hepate ad Anum toti spinæ dorsali adnectitur, quæ in medio secundum longitudinem spinæ dorsii, arcte adhæret, sed utrinque à lateribus spinæ, spatium seu ductum vacuum habet, qui tamen ductus, quando piscis nimium premittitur, sanguine repletur, & speciem vênæ exhibet.
19. *Ventriculus* magnus, robustus, ruber, admodum musculosus, & crassus oblongus, inter corpora pulmoniformia situs, nullis appendicibus præditus. Originem sumit ad infimum palati os. In antica parte à lateribus unam utrinque *vesiculam* ceruleo nigrescentem, in ipsis musculis sitam, obtinet, quas Vesiculas, primo pro Cystide fellea habebam, sed cultello incisæ liquorem quidem paucum continebant, ast, quantum gustu experiebar, non acerbum vel alcalinum. Interim tamen possunt esse Vesiculæ fellis; nam Lapreta, in qua hæc probavi, jam per diem mortua fuit.

20. *Branchiæ* nullæ, sed earum loco *corpora Septem* utrinque in interna parte, pulmonis formâ, quorum unumquodque, in interiore latere, quoque suam aperturam habet, quæ apertura antèrius quam externa, sita est, cui respondet, & cum qua communicat, ita ut ductus vel transitus à foraminibus externis ad interna obliquus sit. Foramina vel ductus singuli septem illorum corporum inter se invicem non communicant. Singulus Pulmo est sacculus ruber & subrotundus, à reliquis distinctus, membranâ propria parum rugosâ vel striatâ tectus, præter communem, quæ utrinque omnes investit. Per medium pulmonis, foramen seu ductus aperte procedit,

SQUALUS, G. Pisc. 44.

- I. *SQUALUS* pinna Ani nulla, corpore subrotundo.
Galeus acanthias sive *spinax*. Rondeletii, Ald. Gesneri, Raji.
1. Caput totum à rostro ad Pinnas Pectorales Plagioplateum, & antèrius subacutum est. Ipsum rostrum omnino pellucidum est.
2. Corpus oblongum, ambitu ferè subrotundo, vel à Pinnis Pectoralibus ad anum magis cathetoplateum, pars vero corporis à Pinna dorsi 2da ad caudam magis plagioplatea est.
3. *Naves* medio ferè inter rostrum & oculos, non omnino ad latera sed magis in Inferna capitis parte sitæ, duplici Foramine utrinque conspicuæ, per quæ mucus exprimi potest.
4. *Oculi* ad latera capitis, oblongi, Iride magna, alba & Pupilla exigua, nigra & transversa præditi.
5. *Foramen* utrinque unum, semilunare, pone oculos, magis in supèrna parte capitis, quam ad latera situm. Convexum latus, foraminum oculos utrinque spectat; non enim rotunda sed ferè semirotunda sunt.
6. *Os* in interna capitis parte seu subtus, transverse situm, longius paulo quam *Oculi* à rostro remotum, latum, semilunaris ferè figuræ, Triplici ordine *Dentium*, communi cuidam ossi affixorum, præditum.
7. *Foramina* duo subtilissima in supèrna capitis parte, medio inter oculos.
8. *Apertura Branchiarum* utrinque quinque, infra Oculos ad Pinnas Pectorales, transversim, sed parum obliquè, sitæ, ad inferiorem laterum Capitis partem.
9. *Linea lateralis* recta, dorso quam Ventri multo propior.
10. Totum Corpus & Pinnæ scabra sunt, quod optime sentitur, si ma-

- si manus antrorsum, à posteriore ad anteriorem corporis partem ducitur.
11. *Color* dorſi & ſupernæ partis ex cano & cæruleſcente mixtus, inferna pars alba & pulchra. Maculæ quædam raræ, 7. 8. 9 vel plures, ſubrotundæ, albeſcentes in dorſo.
 12. *Pinne Pectorales* ſatis magnæ, horizontaliter ſitz, in extremo quam ad exortum latiores, nullis radiis cartilagineis diſtinctæ, tenues ſed ſatis tenaces.
 13. *Pinne Ventræles* duæ diſtinctæ, una utrinque ad Anum, horizontaliter ſitz. Quarum ſingula, interiore ſui parte deſinit in Corpus oblongum, quod in extremitate complicatur & duos aculeos continet, unum rectum, alterum in extremo hamatum.
 14. *Anus* medio inter has Pinnaſ (13) ſitus eſt. *Penis* quoque eminebat (hic enim erat mas) qui compreſſus emittebat genituram.
 15. *Pinne in dorſo* duæ: *Prior* Pinnis Pectoralibus quam Ventralibus propior, perpendiculariter erecta cum adjuncto Aculeo, in antica parte. *Pinna poſterior* medio fere inter Anum & caudam, priori minor, ſed in antica parte Aculeum, quam prior majorem habens, *Aculei* hi ſubſtantia, colore & figura ungues avium repræſentant; Retrorſum parum ſpectant.
 16. *Cauda* magna, cathetoplatea, pars ſuperior magis quam duplo inferiore longior eſt, & perpendiculariter erecta.
 17. *Longitudo*, in deſcripto, ulnari paulo major.
 18. *Pelle* detracta, Anguillæ ſimilis erat, & muſculi tunc benè apparebant, atque ad ſingulum rubedo quædam muſculoſa externè aderat, intus vero caro albiſſima, & oſſium loco cartilago ſubdura.

R A J A, G. Piſc. 45.

- I. *RAJA aculeata, dentibus tuberculofis, cartilagine tranſverſo in ventre.*
Raja Clavata Auctorum. *The Thornback & Maids* Angliſ.
1. *Caput & corpus* totum admodum plana ſeu plagioplatea ſunt: *Figura* corporis, excepta cauda, fere quadrata eſt; Cauda longa, gracilis, ſed tamen plagioplatea.
Venter ſeu inferna pars omnino plana. Dorſum quoque planum, ſed in medio tantillum convexum.
- a. *Oculi* in ſuprema corporis parte, ſatis longe à roſtro, parum extuberantes, & ſuperne cute nuda tantum reſti. Pupilla & Iris non ſurſum, ſed directè ad latera, ſeu horizontem ſpectant. Pupilla

pilla nigro-viridescens. Iris argenteo-alba. Pupillæ à superiori sui parte operculum albicans, & in ambitu pulchre fimbriatum, sub tunica cornea habent, quod pressione digiti & sursum premi & deprimi potest, dum totam ferè pupillam tegit. Humor crystallinus sphaericus, pellucidissimus, & ante coctionem subdurus.

3. *Foramen* utrinque oblongiusculum, immediate à postica parte oculorum, transverse ferè situm, cuius latus *Anterior* in ambitu leviter striatum est, & ipsum foramen valvulæ instar subinde tegit; Postica vero foraminis pars intus glabra est. Hæc foramina intus duplicem ductum habent: nam 1^o. anteriori parte, directe, magno hiatus in Os aperiuntur, & 2^o. posteriore sui parte ad branchias pertingunt, & aperturis branchiarum internis communes sunt. Horum *Usus* est in attrahenda & expellenda aqua; & sic unus idemque cum aperturis branchiarum, ad promovendum sc. motum branchiarum & circulationem sanguinis.
4. *Nares* magnæ, subtus paulo ante os sitæ, unico sed magno foramine utrinque præditæ. Inferiore parte cum ipso ore communicant & cute quadam ab interiore latere teguntur. Anteriori vero apertæ sunt & ad latus exterius valvula exigua adest. Interius *Nares* hæc cavitate magna & oblongo rotunda præditæ, cuius Fundus membrana striata seu lineis transversis pertusa, per quarum interstitia mucus transcolatur.
5. *Os* subtus, transversum situm: eadem cum oculis à rostro distantia; satis amplum; Tuberculis granulosis & rhomboides, in utraque maxilla dense stipatum. Palatum glabrum. Lingua brevis, admodum lata & glabra. *Valvula* quasi duæ interius sub maxilla superiore seu anteriore, quarum partes introrsum reclinatæ seu palatum attingentes, liberæ sunt.
6. *Foramina Branchiarum* utrinque quinque, exigua, ad latera pectoris, longe infra Os in linea fere recta, sita, quorum infimum cartilagineum pectoris transversam immediate tangit. Figura seu apertura foraminum non rotunda, sed ad longitudinem corporis transversa est.
7. *Dorsum* seu superna pars, tota subfusca seu fusco-canescens est maculis albidis, rotundis & crebris varia, interdum vero superna pars albescens est, maculis nigris, & mucosa. *Venter* totus albus.
8. *Dorsum* seu tota superna pars aculeis minimis innumerabilibus, retrorsum versis, aspera est. Inferna pars plerumque glabra.
9. Latus in pinnam maximam utrinque definit, quæ loco Pectoralium est, respectu ad alios pisces; extremitas harum pinnarum in angulum subacutum definit. Radii cartilaginei harum Pinnarum tam in pisce recenti, quam inprimis cunctis suis libe-

liberato bene conspiciuntur, & nodis transversis malefcentibus pulchre insigniti sunt.

10. *Pinna Ventralis* utrinque unica, ad Anum seu initium caudæ, horizontaliter, adinstar pinnarum Pectoralium, sita. Figura harum pinnarum singularis est, nam superiore sui parte seu pinnis Lateralibus proxima, in magnam apophysin, radiis cartilagineis intus fœtam, definit, in infima vero ad initium Caudæ duæ apophyses breves, molles & cartilaginum expertes adfunt. Interior pars harum pinnarum membrana tenui, caudæ initio, jungitur.
11. *Pinna Ani* nulla, respectu ad pisces Osteopterygios habito.
12. *Cauda* aliquanto longior quam totum corpus, gracilis, sed non teres, at plagioplatea, & subtus ferè plana. *Pinnula* duæ supernè in extremitate caudæ, inter quas sæpe duo aculei sunt.
13. *Aculei* duo tam subtus, quam superne ad apicem rostri, qui tamen in junioribus, præsertim fœminis, plerumque deficiunt.
14. *Aculeorum recurvorum* 1°. *unicus ordo* ab initio, & interdum medio dorfi, ad extremum ferè caudæ, in linea recta dispositum, 30 aculeis constans: 2°. *Aculei* ejusmodi duo ab antica, & Tres plerumque à postica oculorum parte; 3°. *Aculei* sæpe quatuor magni, in anteriore dorfi parte, situ quadrato dispositi, interdum vero duæ posteriores tantum, præsertim in junioribus. 4°. *Aculeorum minorum* unicus ordo, utrinque à lateribus caudæ, qui in majoribus imprimis in conspectum veniunt.
5°. *Rostrum* subtus, à lateribus & in medio subasperum, aculeis minimis. *Aculei* hi (14) ad figuram, spinis fruticis Rosæ similissimi sunt.
15. *Venter* seu prona pars in duas velut regiones seu semicirculos divisa, superior est Pectus, inferior vero abdomen. Periphæria horum semicirculorum, in quibusdam hujus speciei, aculeis exiguis circumvallata. *Cartilago* dura & transversa inter hos semicirculos, Pectus scilicet ab abdomine distinguens, externè bene conspicua.
16. *Anus* inter Pinnas Ventrâles, paulo supra initium caudæ, longitudinaliter situs, figuræ ovatæ propemodum. *Foramina* duo, exigua, immediate ad inferiorem Ani partem, quæ cum Vesciculis feminalibus Marium, vel Ovariis fœminarum, procul dubio, ductum communem habent.
17. *Branchiæ* utrinque quinque, quarum foramina exteriora (6) cum interioribus multo majoribus, oblongis & transversis communicant. Concava seu interior branchiarum pars utrinque à lateribus, parum spinulis minimis aspera; *Convexa* pars vero in 4 branchiis inferioribus ex duplici ordine foliorum.

Arredi Descriptiones.

O

fupre-

suprema & ubi seu oculis proxima, ex simplici ejusmodi folio seu vasorum sanguiferorum ordine constat.

18. *Cor* planum, non magnum, in infima parte pectoris, a faucibus per cartilaginem distinctum, in cavitate singulari situm.

Diaphragma robustum inter Pectus & abdomen.

19. *Hepar* magnum in suprema abdominis parte, in tres lobos divisum, quorum medius minimus est, & duo laterales admodum longi.

Lien saturate rubens, oblongo-triangularis, sub medio hepatis lobo situs, & Ventriculo affixus.

20. *Ventriculus* oblongus & satis amplus, ad sinistrum abdominis latus situs: Pars Ventriculi inferior supra Pylorum angusta est, & sursum reflectitur: Pylorus angustus nullis appendicibus præditus. *Intestinum* vero infra Pylorum multo amplius, recta quidem ad Anum tendit, sed paulo tortuosum est; Appendix oblonga, exigua, ad intestinum rectum parte dorso proxima, non pervia.

21. *Renes* duo, oblongi, obscure rubentes, utrinque unus, à lateribus spinæ dorsalis ad inferiorem abdominis partem.

22. *Viscera* duo alba, oblonga, plana, in superiore abdominis parte, unum utrinque à lateribus spinæ dorsalis, quæ vel ovaria vel Vesiculæ feminales sunt.

23. Inferior Spinæ dorsalis pars & cartilago interna caudæ in Vertebrae exiguas divisa sunt.

24. Per superiorem spinæ dorsalis partem medulla transit ut in piscibus Osteopterygiis, sed tamen continuo foramine. Cranium oblongum ex unica seu continua cartilagine constat.

ORDO V.

P L A G I U R I.

BALÆNA, G. Pisc. 48.

1. *BALÆNA* fistula in medio capite, dorso caudam versus acuminato.

1. *Caput* parum plagioplateum.

2. *Mandibula* Inferior Superiore multo latior, cujus partes laterales Mandibulam Superiorem, magnam partem à lateribus tegunt, Mandibula superior angusta & oblonga est.

3. *Lia*.

3. *Lingua* maxima. Dentes nulli, sed eorum loco Laminæ cor-
nez, in palato adultiorum.
4. *Pinna* in dorso nulla.
5. *Pinnae Pectorales* duæ à lateribus, magisque ad eorundem in-
feriorem partem, non longe infra regionem Oculorum, exi-
guae pro corporis mole.
6. *Oculi* admodum exigui, respectu ad molem corporis, longe à se
invicem distantes, ad latera Capitis fere siti.
7. *Fistulae* duæ sibi contiguae, in media superiore capitis parte, inter
rostrum & oculos, vel oculis paulo propiores.
8. *Mammæ* duæ in fœminis sibi vicinæ, non in Pectore, sed in
infimo ventre supra Pudenda. Anus infra partes Genitales
situs.
9. *Cauda horizontaliter* fita & parum bifurca ac lata, fere ut in
Scombro.
10. *Angulus* quidam subacutus, a media caudæ parte, secundum
dorsi medium extensus, sed brevis & non longe continuatus.
11. *Ambitus* corporis subrotundus fere est.
12. *Visa* a me Londini anno 1734.

A P P E N D I X.

S I L U R U S.

L. SILURUS cirro unico in mento,
Lake, Suecorum.

Longitudo tota;

unc. 25. lin.

ad Narem 1m 8 lin. 2dam.
medium Oculi.
finem Operculorum branchiarum.
Pinnae Ventræles.
Laterales seu Pectorales,
Pinnam dorsi primam.
Ejusdem finem.
Pinnam dorsi secundam.
Anum.
Foramen Penis vel cunni.
Pinnam Ani vel pudendi.
Ejusdem finem.

1.	2. circ.
1.	9½.
5.	3.
5.	2.
5.	4. circ.
8.	
10.	1. circ.
10.	3.
10.	6.
11.	
11.	3. à 4.
21.	3. à 4.

finem

finem Pinnae dorfi secundae.	unc. 21.	lin. 5.
initium Caudae à lateribus.	21.	7. vel 8.
Ejusdem initium in medio.	23.	3. à 4.
Latitudo Transversa juxta medium Oculi.	2.	4.
Perpendicularis ibidem.	1.	7. circ.
Perp. juxta Pinnae Pectorales & Ventr.	3.	9. f.
Latitudo Transversa ibidem.	4.	1. à 2.
Perp. juxta Pinnam dorfi primam.	4.	5. à 6.
Transversa ibidem.	4.	4. à 5.
Perp. inter initium Pinnae dorfi 2da & Anum.	4.	1. circ.
Transversa ibidem.	3.	4. à 5.
Perp. juxta initium Pinnae Ani.	3.	7. à 8.
Transversa ibidem.	2.	7. à 8.
Perp. juxta finem Pinnarum Ani & dorfi		
2da seu quod idem est, ad initium Caudae.	1.	5.
Transversa ibidem.		4. à 5.
Perp. in medio Caudae diductae ad finem spinæ dorsalis.	3.	3.

1. *Caput* Plagioplateum, medio corpore paulo angustius.
2. *Corpus* à capite ad Anum teres ferme, cum ventre parum prominente; inter Pinnae Pectorales & Anum, crassissimum; ab Ano vero ad extremum caudae à lateribus compressum est.
4. *Dorsum* à capite ad Pinnam dorfi primam satis planum & latum est.
5. *Cirrus* unicus in Mandibula inferiore, albescens, 9 lineas vel unciam fere longus.
6. *Nares* duplicem Aperturam utrinque habentes, cum longa distantia inter Aperturas vel foramina, ad inferius Foramen Valvula oblonga & propendens, foramenque tegens utrinque adest, quam scriptores Ichthyologici pro Cirro habuerunt.
7. *Oculi* à lateribus capitis siti, quorum Pupilla subrotunda vel parum ovalis & caerulea, cum Iride flavicante.
8. *Color* totius corporis in recens captis obscurus & nigrescens est, propter mucum adhaerentem, qui facile detergitur, tumque totum Caput & dorsum obscure cana sunt cum maculis & lituris nullo ordine sitis, quæ in capite crebriores & minores, in dorso vero pauciores & majores existunt. Latera canescencia & albescencia sunt cum paucis lituris nigris & interdum flavo admixto. *Venter* plerumque albescens.
9. *Squamæ* exiguae quidem: sed oculis nudis benè visibiles, ovales & albæ, quæ totum corpus, caput, Opercula branchiarum & initia pinnarum quarundam vestiunt; ordine reticulato sitæ, sed se invicem non tangunt, seu non contiguae sunt.

10. *Opercula branchiarum* ex tribus laminis & septem spinis robustis, membranâ crassâ conjunctis & vestitis, utrinque constant, quorum infimus minimus, supremus vero latiusculus & curvatus.
11. *Lingua* magna, crassa, alba, glabra, infernè soluta.
12. *Branchia* utrinque quatuor, quarum tres superiores duplici Tuberculorum subasperorum ordine donantur, quarum infima seu minima unico tantum, à parte sc. inferiore. Tubercula exteriora in branchia suprema, interioribus longiora sunt.
13. *α. Mandibulae* ambæ Denticellis plurimis introrsum vergentibus limæ instar stipatæ, qui denticuli ossi cuidam communi utrinque innascuntur; *β.* Os semicirculare vel lunatum in antica parte palati, denticulis ejusmodi dense stipatum, qui introrsum quoque vergunt & parum mobiles sunt, alias totum Palatum glabrum est. *γ.* Ad Fauces vel in initio Gulæ Oſto areolæ vel Tubercula, dentibus obſita, conſpiciuntur, sc. infernè duo oblonga, juxta branchiarum minimam, & supernè sex, quorum tria utrinque adeo vicina sibi invicem sunt, ut unum subrotundum formare videantur. Totum os interius album est.
14. *Pinnae Pectorales* vel Laterales subrotundæ fermè, quando diducuntur; longitudine in pisce mihi descripto 2 unciarum & 7 à 8 linearum, coloris interna parte cœrulescentis, externâ vero ex albescente & nigrescente variegati; radiorum viginti & unius, quorum duo primi indivisi, ut & ultimus, cæteri ad exortum fere ramosi.
15. *Pinnae Ventrals* exiguæ, albæ, exterius punctulis nigris irroratæ; radiorum septem, quorum duo primi & ultimus indivisi, cæteri in apice ramosi; secundus longissimus est, & in apophyſin longam, mollissimam & gracilem, Cirri instar, desinit, quod & in primo fit, sed ejus cirrus minor est.
16. *Pinna dorsi prima* exigua, in ambitu maculis nigris notata, radiorum tredecim, quorum primus & ultimi minimi sunt, medii longiores & in apice bifidi.
17. *Pinna dorsi secunda* admodum longa, unciam unam & 3 lineas circiter alta; in ambitu maculis nigris 17 vel 18 distincta; radiorum septuaginta & sex, numeratu difficilium ob membranam crassam, quorum medii, præter primos, in apice bifidi sunt; Primi minimi.
18. *Pinna Ani* longa, albo - canescens, cum ambitu vel margine nigro, ad inferiorem partem, unam unciam alta seu lata, radiorum quinquaginta quinque, quorum omnes ferè in apice bifidi, primi & ultimi minimi sunt.
19. *Cauda* canescens & in ambitu nigra, in expansione subrotunda vel ovalis, radiorum ultra triginta, numeratu difficilium.

20. *Linea lateralis* lata & recta, dorso quam ventri propior, in parte corporis anteriori.
21. *Clavicula* ex duobus ossibus constant, quorum superius ab Operculis branchiarum absconditur.
21. *Locus*: Lacus, stagna, fluvii & Sinus maris Baltici.
22. *Hepar* maximum, à sinistro latere situm, longum infernè in duos lobos inæquales divisum, & protuberantiam in medio habens, undecim uncias longum; coloris albescentis tantillo rubore admixto, diaphragmati ad ejus sinistrum latus, adnatum.
- Vesica fellis* satis magna, subtus adnata.
23. *Lactes* seu *Vesiculæ seminales*, in maribus, maximæ, una utrinque à lateribus *Vesicæ aëreæ*, coloris albiissimi, nec ejusdem formæ, nec magnitudinis, nam dextra multo major erat in subiecto mihi descripto; circa Anum coeunt in unum & proprium ductum, seu urethram infra Anum habent. Longitudo erat 6 unciarum & 5, 6 vel 7 Linearum.
24. *Cor conico-triangulatum* unica cavitatè præditum, cum Aorta alba, magna & ovata.
25. *Diaphragma* robustum & crassum.
26. *Ventriculus* cum intestinis à sinistro latere *vesicæ aëreæ*, maximam partem situs, robustus, intus rugosus; ab initio Gula ad sui finem sex uncias & 6 circiter lineas longus. In eo Pericam fluviatilem Bellonii uncias quatuor & 2 lineas longam, omnimode intactam & duos Eperlarios exiguos inveni.
27. *Appendices* infra Pylorum incipiunt & intestinum in initio coronæ instar circumdant. Sunt autem longi, subduri, lumbricis similes, sed albi, numero in pisce mihi descripto triginta novem, pinguedine circumsepti.
28. *Intestinum* infra Ventriculū, longitudinem piscis longè superans, & varie tortum, licet semel tantum reflectatur.
29. *Peritonæum* totum argenteo-album.
30. *Vesica aërea* ampla, octo uncias ferè longa, alba, formæ singularis; in medio enim coarctatur & angustior fit, ad superiorem partem amplissima & in duas protuberantias protensa, seu superiori parti Cordis Piscium similis, inferior pars amplior quoque quam media est, sed simplex; à dorso separari non potest, sed saltem quoad partem in parte antica: ratio est, quod membrana ex qua constant; continua & eadem est cum Peritonæo, unde oritur, ut nulla membrana intermedia sit inter spinam dorsī, & aërem.
- Nota: Nervis plurimis Ventriculo juncta est.
31. *Lien* obscurè ruber & oblongus, ad inferiorem partem intestini situs.
32. *Vesica urinaria* unam unc. & 6 lineas ferè longa, infra Lactes ad Anum sita, quæ in urethram infra Anum exoneratur.

33. Sub

33. Sub hac (32.) Viscus quoddam situm est in pelvi, crassum, rubrum, simplex, subdum & sanguine refertum, quod pro Renibus inservire videtur. Compages autem compacta non est, quod notandum.

LEPTURUS.

I. LEPTURUS.

1. *Caput* cathetoplateum, oblongum, postica parte in eminentiam oblongam producitur, inter oculos latum est.
Corpus longum, angustum, cathetoplateum & admodum tenue, fasciæ instar. *Cauda* longa, gracilis, acuta & apterygia.
2. *Dorsum* & *Venter* tenuia & acuta.
Anus capiti quam caudæ multo propior.
3. *Os* magnum & satis profunde incisum, quod tamen ad magnam aperturam dilatare non potest.
Mandibula inferior subacuta, angustior & superiore longior.
Cirrus nullus. Prominentia subacuta exigua in ipso apice maxillæ inferioris, subdura.
4. *Narium* foramen tantummodo unicum utrinque, subrotundum & satis amplum cernitur, directe ante oculos, longe à rostro.
5. *Oculi* ad Latera capitis, subrotundi, satis magni, rostro quam extremitati Operculorum paulo propiores, cute capitis communi non tecti esse videntur. *Iris* magna, argentei coloris.
6. *Membrana Branchioflegma* septem officula gracilia, latiuscula & numeratu difficilia utrinque continet, quæ apertis operculis Branchiæ tantum conspiciuntur. Opercula Branchiarum Officia, levissime striata, oblonga.
7. *Apertura Branchiarum* amplissima & ad apicem fere maxillæ inferioris incisæ.
8. *Dentium* magnitudine admodum inæqualium unus ordo in utraque maxilla. Totum palatum & Lingua glabra.
In Apice maxillæ superioris sunt α . duo dentes maximi primores; hos β . utrinque Dentes duo robusti & primoribus majores seu omnium maximi sequuntur, ad interiorem maxillæ partem affixi; γ . à Primoribus vero 9 vel 10 utrinque denticuli, in ipso maxillæ limbo siti extenduntur; quos demum δ . dentes sex, magnitudine mediocres, utrinque excipiunt.
Maxilla inferior primo in apice duos Dentes primores magnos, minores tamen quam in superiore, continet, qui ore clauso
P 2 extra

extra superiorem cadunt; hos utrinque in limbo maxillæ dentes septem vel octo, magnitudine inæquales & satis robusti excipiunt.

Secundo ad Fauces superne duo officula oblonga & angusta, denticulis confita, adsunt.

9. *Squamis* videtur carere, sed totum omnino corpus & caput cute splendida, tenui & argentei coloris contegitur.
10. *Linea lateralis* latiuscula, ad superiorem operculorum Branchiarum partem, juxta dorsum, initium sumit, sed supra pinnas Pectorales ad ventrem imum flexa, quem deinde parallelus ad extremum usque caudæ sequitur; ex squamulis exiguis, angustis & oblongis videtur componi.
11. *Pinnae* tres tantum in toto corpore, sc. duæ Pectorales & dorsalis.
Pinnae Pectorales exiguae, albæ, ad Opercula Branchiarum horizontaliter fere sitæ, imo Ventri quam dorso multo propiores, officulorum undecim, gracilium, præter primum, in apice parum bifidorum.
12. *Pinna dorsæ* longissima, alba, à cervice ad extremum caudæ fere extensa, officulorum vix numerabilium & longe ultra centum, mollium, in apice non divisorum; Ante apicem omnino definit, & ipsum apicem seu extremitatem caudæ non ambit.
13. *Pinna Ani* nulla, sed ejus loco, ab Ano ad extremum fere caudæ, Aculei quidam exigui brevissimi & acuti, nulla membrana conjuncti disponuntur, numero in universum 105 circiter, quorum qui caudæ proximi, antrorsum vergunt, superiores vero 60 &c. retrorsum flectuntur.
14. *Cauda* longa, gracilis & angusta, in apice admodum acuta, cathetoplatea & apterygia.
15. *Branchiæ* utrinque quatuor, omnes unico ordine apophysium exiguarum, brevium, ossæarum & aculeatarum, donatæ in concava parte, quæ tamen in Branchia minima vix conspiciuntur; raræ sunt hæ apophyses, albæ, graciles & acutæ.



